5637 Celler

300105

5637 er en blærekarsinomcellelinje isolert fra urinblæren til en 68 år gammel mann med karsinom av grad II. 5637-cellene produserer og utskiller flere vekstfaktorer, som SCF, IL-1, IL-6, G-CSF og GM-CSF. Disse cytokinene er funksjonelt aktive og kan være en verdifull kilde til dyrking av vekstfaktorresponsive eller -avhengige hematopoietiske primærceller og cellelinjer.

Karyotypens modale kromosomnummer for 5637 celler er 67, med en variasjon fra 59 til 71. Det modale kromosomantallet i stamlinjen er 67 på 36 % og polyploidi på 0,6 %. Fjorten markørkromosomer er felles for disse cellene, inkludert 3q+, 11q+, i(13q), t(9q21q), i(17q), i(21q). Andre markører, som der(5)t(5;7)(q31;p11) og 1p, ble bare funnet spesifikt for en mindre subpopulasjon, i tillegg til mikrokromosomer og dobbeltminutter (DM). Noen celler inneholder ett eller av og til to Y-kromosomer.

5637-celler er tumorogene og har vist seg å indusere svulster i nakenmus som inokuleres subkutant. Fordoblingstiden for 5637-celler er omtrent 24 timer. Isoenzymprofilen til 5637-celler består av isoform 1 av AK-1, ES-D, Me-2 og PGM1, isoform 1 og 2 av GLO-I, isoform B av G6PD, samt isoform 2 av PGM3.

Når det gjelder onkogener, er 5637-cellene positive for FGFR3, PIK3CA, HRAS, KRAS, NRAS, TERT og CDKN2A, men negative for TP53, og de tilhører den molekylære blærekreftsubtypen l5637 er en blærekarsinomcellelinje isolert fra urinblæren til en 68 år gammel mann med karsinom av grad II. 5637-cellene produserer og utskiller flere vekstfaktorer, som SCF, IL-1, IL-6, G-CSF og GM-CSF. Disse cytokinene er funksjonelt aktive og kan være en verdifull kilde til dyrking av vekstfaktorresponsive eller -avhengige hematopoietiske primærceller og cellelinjer.

Karyotypens modale kromosomnummer for 5637 celler er 67, med en variasjon fra 59 til 71. Det modale kromosomantallet i stamlinjen er 67 på 36 % og polyploidi på 0,6 %. Fjorten markørkromosomer er felles for disse cellene, inkludert 3q+, 11q+, i(13q), t(9q21q), i(17q), i(21q). Andre markører, som der(5)t(5;7)(q31;p11) og 1p, ble bare funnet spesifikt for en mindre subpopulasjon, i tillegg til mikrokromosomer og dobbeltminutter (DM). Noen celler inneholder ett eller av og til to Y-kromosomer.

5637-celler er tumorogene og har vist seg å indusere svulster i nakenmus som inokuleres subkutant. Fordoblingstiden for 5637-celler er omtrent 24 timer. Isoenzymprofilen til 5637-celler består av isoform 1 av AK-1, ES-D, Me-2 og PGM1, isoform 1 og 2 av GLO-I, isoform B av G6PD, samt isoform 2 av PGM3.

Når det gjelder onkogener, er 5637-cellene positive for FGFR3, PIK3CA, HRAS, KRAS, NRAS, TERT og CDKN2A, men negative for TP53, og de tilhører den molekylære subtypen luminal blærekreft.

5637-celler er et verdifullt verktøy for kreftforskning, særlig når det gjelder studier av vekstfaktorer, celledeling, onkogener og blærekreft.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

5637 er en blærekarsinomcellelinje isolert fra urinblæren til en 68 år gammel mann med karsinom av grad II. 5637-cellene produserer og utskiller flere vekstfaktorer, som SCF, IL-1, IL-6, G-CSF og GM-CSF. Disse cytokinene er funksjonelt aktive og kan være en verdifull kilde til dyrking av vekstfaktorresponsive eller -avhengige hematopoietiske primærceller og cellelinjer.
Karyotypens modale kromosomnummer for 5637 celler er 67, med en variasjon fra 59 til 71. Det modale kromosomantallet i stamlinjen er 67 på 36 % og polyploidi på 0,6 %. Fjorten markørkromosomer er felles for disse cellene, inkludert 3q+, 11q+, i(13q), t(9q21q), i(17q), i(21q). Andre markører, som der(5)t(5;7)(q31;p11) og 1p, ble bare funnet spesifikt for en mindre subpopulasjon, i tillegg til mikrokromosomer og dobbeltminutter (DM). Noen celler inneholder ett eller av og til to Y-kromosomer.
5637-celler er tumorogene og har vist seg å indusere svulster i nakenmus som inokuleres subkutant. Fordoblingstiden for 5637-celler er omtrent 24 timer. Isoenzymprofilen til 5637-celler består av isoform 1 av AK-1, ES-D, Me-2 og PGM1, isoform 1 og 2 av GLO-I, isoform B av G6PD, samt isoform 2 av PGM3.
Når det gjelder onkogener, er 5637-cellene positive for FGFR3, PIK3CA, HRAS, KRAS, NRAS, TERT og CDKN2A, men negative for TP53, og de tilhører den molekylære blærekreftsubtypen l5637 er en blærekarsinomcellelinje isolert fra urinblæren til en 68 år gammel mann med karsinom av grad II. 5637-cellene produserer og utskiller flere vekstfaktorer, som SCF, IL-1, IL-6, G-CSF og GM-CSF. Disse cytokinene er funksjonelt aktive og kan være en verdifull kilde til dyrking av vekstfaktorresponsive eller -avhengige hematopoietiske primærceller og cellelinjer.
Karyotypens modale kromosomnummer for 5637 celler er 67, med en variasjon fra 59 til 71. Det modale kromosomantallet i stamlinjen er 67 på 36 % og polyploidi på 0,6 %. Fjorten markørkromosomer er felles for disse cellene, inkludert 3q+, 11q+, i(13q), t(9q21q), i(17q), i(21q). Andre markører, som der(5)t(5;7)(q31;p11) og 1p, ble bare funnet spesifikt for en mindre subpopulasjon, i tillegg til mikrokromosomer og dobbeltminutter (DM). Noen celler inneholder ett eller av og til to Y-kromosomer.
5637-celler er tumorogene og har vist seg å indusere svulster i nakenmus som inokuleres subkutant. Fordoblingstiden for 5637-celler er omtrent 24 timer. Isoenzymprofilen til 5637-celler består av isoform 1 av AK-1, ES-D, Me-2 og PGM1, isoform 1 og 2 av GLO-I, isoform B av G6PD, samt isoform 2 av PGM3.
Når det gjelder onkogener, er 5637-cellene positive for FGFR3, PIK3CA, HRAS, KRAS, NRAS, TERT og CDKN2A, men negative for TP53, og de tilhører den molekylære subtypen luminal blærekreft.
5637-celler er et verdifullt verktøy for kreftforskning, særlig når det gjelder studier av vekstfaktorer, celledeling, onkogener og blærekreft.

Vev	Blære
Sykdom	Karsinom
Metastaseområde	Primærsvulstens lokalisasjon (urinblæren)

Søknader

Forskning på blærekreft; produksjon av hematopoietiske vekstfaktorer (SCF, IL-1, IL-6, G-CSF, GM-CSF); studier av onkogener (FGFR3, PIK3CA, HRAS, KRAS, TERT); medikamentfølsomhet; transfeksjonsvert; feederceller for hematopoietiske kulturer

KLASSIFISERING

Organisme	Menneske
Sex	Mann
Vekstegenskaper	Tilhenger
GMO-status	Uten GMO

Detaljer om GMO-status

No genetic modification; wildtype bladder carcinoma cell line

Biosikkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Epitel-lignende
Celletype	Epitelceller
Tumorinduserende	Ja, i nakne mus.

Ploidistatus	Det modale kromosomantallet i stamlinjecellene er 67, noe som utgjør 36 % av det totale antallet. Polyploidi forekommer i 0,6 % av disse cellene. Hver celle hadde vanligvis ett eller av og til to Y-kromosomer.

Karyotype

Fenotypefrekvensprodukt: 0.0056.

Fordoblingstid	24 timer

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

5637 (Cytion-katalognummer 300105)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_0126

UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

Isoenzymer

Me-2, 1, PGM3, 2, PGM1, 1, ES-D, 1, AK-1, 1, GLO-1, 1-2, G6PD, B

Produkter

IL-1, IL-6, G-CFS, GM-CSF, SCF

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikkelnummer 820700a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 10 % FBS

Dissosiasjonsmiddel	Accutase

Subkultivering

Fjern først det gamle mediet fra de adherente cellene, og vask dem med PBS uten kalsium og magnesium. Bruk 3-5 ml PBS for T25-kolber og 5-10 ml for T75-kolber. Dekk deretter cellene helt med Accutase, med 1-2 ml for T25-kolber og 2,5 ml for T75-kolber. La cellene inkubere i romtemperatur i 8-10 minutter for å løsne dem. Etter inkubasjon blandes cellene forsiktig med 10 ml medium for å resuspendere dem, og sentrifuger deretter ved 300xg i 3 minutter. Kast supernatanten, resuspender cellene i nytt medium, og overfør dem til nye kolber som allerede inneholder nytt medium.

Oppdelingsforhold	1 til 5
Såtetthet	1 x 10^4 celler/cm^2 vil resultere i et sammenflytende monolag innen 3 dager.
Væskefornyelse	2 til 3 ganger per uke
Gjenoppretting etter tining	Etter tining, plasser cellene på 5 x 10^4 celler/cm^2 og la cellene komme seg etter fryseprosessen og feste seg i minst 24 timer.

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Donorens alder	68 år
Etnisitet	Kaukasisk

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes