5637 Células

300105

a 5637 é uma linha celular de carcinoma da bexiga isolada da bexiga urinária de um homem de 68 anos com carcinoma de grau II. as células 5637 produzem e segregam vários factores de crescimento, tais como SCF, IL-1, IL-6, G-CSF e GM-CSF. Estas citocinas são funcionalmente activas e podem ser uma fonte valiosa para a cultura de células primárias e linhas celulares hematopoiéticas dependentes ou sensíveis a factores de crescimento.

O número cromossómico modal do cariótipo das 5637 células é 67, variando entre 59 e 71. O número modal de cromossomas da linha estaminal é 67 em 36% e a poliploidia em 0,6%. Catorze cromossomas marcadores são comuns a estas células, incluindo 3q+, 11q+, i(13q), t(9q21q), i(17q), i(21q). Outros marcadores, como der(5)t(5;7)(q31;p11) e 1p, só foram encontrados especificamente numa subpopulação menor, bem como microcromossomas e minutos duplos (DM). Algumas células incluem um ou, ocasionalmente, dois cromossomas Y.

as células 5637 são tumorigénicas e demonstraram induzir tumores em ratinhos nus inoculados por via subcutânea. O tempo de duplicação das células 5637 é de aproximadamente 24 horas. O perfil isoenzimático das células 5637 consiste na isoforma 1 de AK-1, ES-D, Me-2 e PGM1, nas isoformas 1 e 2 de GLO-I, na isoforma B de G6PD, bem como na isoforma 2 de PGM3.

Em termos de oncogenes, as células 5637 são positivas para FGFR3, PIK3CA, HRAS, KRAS, NRAS, TERT e CDKN2A, mas negativas para TP53, e pertencem ao subtipo molecular de cancro da bexiga l5637 é uma linha celular de carcinoma da bexiga isolada da bexiga urinária de um homem de 68 anos com carcinoma de grau II. as células 5637 produzem e segregam vários factores de crescimento, tais como SCF, IL-1, IL-6, G-CSF e GM-CSF. Estas citocinas são funcionalmente activas e podem ser uma fonte valiosa para a cultura de células primárias e linhas celulares hematopoiéticas dependentes ou sensíveis a factores de crescimento.

O número cromossómico modal do cariótipo das 5637 células é 67, variando entre 59 e 71. O número modal de cromossomas da linha estaminal é 67 em 36% e a poliploidia em 0,6%. Catorze cromossomas marcadores são comuns a estas células, incluindo 3q+, 11q+, i(13q), t(9q21q), i(17q), i(21q). Outros marcadores, como der(5)t(5;7)(q31;p11) e 1p, só foram encontrados especificamente numa subpopulação menor, bem como microcromossomas e minutos duplos (DM). Algumas células incluem um ou, ocasionalmente, dois cromossomas Y.

as células 5637 são tumorigénicas e demonstraram induzir tumores em ratinhos nus inoculados por via subcutânea. O tempo de duplicação das células 5637 é de aproximadamente 24 horas. O perfil isoenzimático das células 5637 consiste na isoforma 1 de AK-1, ES-D, Me-2 e PGM1, nas isoformas 1 e 2 de GLO-I, na isoforma B de G6PD, bem como na isoforma 2 de PGM3.

Em termos de oncogenes, as células 5637 são positivas para FGFR3, PIK3CA, HRAS, KRAS, NRAS, TERT e CDKN2A, mas negativas para TP53 e pertencem ao subtipo molecular luminal de cancro da bexiga.

Em conclusão, as células 5637 são uma ferramenta valiosa para a investigação do cancro, especialmente no que diz respeito ao estudo dos factores de crescimento, da divisão celular, dos oncogenes e do cancro da bexiga.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição

a 5637 é uma linha celular de carcinoma da bexiga isolada da bexiga urinária de um homem de 68 anos com carcinoma de grau II. as células 5637 produzem e segregam vários factores de crescimento, tais como SCF, IL-1, IL-6, G-CSF e GM-CSF. Estas citocinas são funcionalmente activas e podem ser uma fonte valiosa para a cultura de células primárias e linhas celulares hematopoiéticas dependentes ou sensíveis a factores de crescimento.
O número cromossómico modal do cariótipo das 5637 células é 67, variando entre 59 e 71. O número modal de cromossomas da linha estaminal é 67 em 36% e a poliploidia em 0,6%. Catorze cromossomas marcadores são comuns a estas células, incluindo 3q+, 11q+, i(13q), t(9q21q), i(17q), i(21q). Outros marcadores, como der(5)t(5;7)(q31;p11) e 1p, só foram encontrados especificamente numa subpopulação menor, bem como microcromossomas e minutos duplos (DM). Algumas células incluem um ou, ocasionalmente, dois cromossomas Y.
as células 5637 são tumorigénicas e demonstraram induzir tumores em ratinhos nus inoculados por via subcutânea. O tempo de duplicação das células 5637 é de aproximadamente 24 horas. O perfil isoenzimático das células 5637 consiste na isoforma 1 de AK-1, ES-D, Me-2 e PGM1, nas isoformas 1 e 2 de GLO-I, na isoforma B de G6PD, bem como na isoforma 2 de PGM3.
Em termos de oncogenes, as células 5637 são positivas para FGFR3, PIK3CA, HRAS, KRAS, NRAS, TERT e CDKN2A, mas negativas para TP53, e pertencem ao subtipo molecular de cancro da bexiga l5637 é uma linha celular de carcinoma da bexiga isolada da bexiga urinária de um homem de 68 anos com carcinoma de grau II. as células 5637 produzem e segregam vários factores de crescimento, tais como SCF, IL-1, IL-6, G-CSF e GM-CSF. Estas citocinas são funcionalmente activas e podem ser uma fonte valiosa para a cultura de células primárias e linhas celulares hematopoiéticas dependentes ou sensíveis a factores de crescimento.
O número cromossómico modal do cariótipo das 5637 células é 67, variando entre 59 e 71. O número modal de cromossomas da linha estaminal é 67 em 36% e a poliploidia em 0,6%. Catorze cromossomas marcadores são comuns a estas células, incluindo 3q+, 11q+, i(13q), t(9q21q), i(17q), i(21q). Outros marcadores, como der(5)t(5;7)(q31;p11) e 1p, só foram encontrados especificamente numa subpopulação menor, bem como microcromossomas e minutos duplos (DM). Algumas células incluem um ou, ocasionalmente, dois cromossomas Y.
as células 5637 são tumorigénicas e demonstraram induzir tumores em ratinhos nus inoculados por via subcutânea. O tempo de duplicação das células 5637 é de aproximadamente 24 horas. O perfil isoenzimático das células 5637 consiste na isoforma 1 de AK-1, ES-D, Me-2 e PGM1, nas isoformas 1 e 2 de GLO-I, na isoforma B de G6PD, bem como na isoforma 2 de PGM3.
Em termos de oncogenes, as células 5637 são positivas para FGFR3, PIK3CA, HRAS, KRAS, NRAS, TERT e CDKN2A, mas negativas para TP53 e pertencem ao subtipo molecular luminal de cancro da bexiga.
Em conclusão, as células 5637 são uma ferramenta valiosa para a investigação do cancro, especialmente no que diz respeito ao estudo dos factores de crescimento, da divisão celular, dos oncogenes e do cancro da bexiga.

Tecido	Bexiga
Doença	Carcinoma
Local da metástase	Localização do tumor primário (bexiga)

Aplicações

Investigação sobre o cancro da bexiga; produção de fatores de crescimento hematopoiéticos (SCF, IL-1, IL-6, G-CSF, GM-CSF); estudos sobre oncogenes (FGFR3, PIK3CA, HRAS, KRAS, TERT); sensibilidade aos fármacos; hospedeiro de transfecção; células alimentadoras para culturas hematopoiéticas

CLASSIFICAÇÃO

Organismo	Humano
Sexo	Masculino
Propriedades de crescimento	Aderente
Estatuto em matéria de OGM	Sem OGM

Detalhes sobre o estatuto dos OGM

No genetic modification; wildtype bladder carcinoma cell line

Nível de biossegurança	1

CARACTERÍSTICAS

Morfologia	De tipo epitelial

Tipo de célula	Células epiteliais
Tumorigénico	Sim, em ratinhos nus.
Estado de ploidia	O número modal de cromossomas das células da linha estaminal é 67, compreendendo 36% do total. A poliploidia ocorre em 0,6% destas células. Cada célula tinha tipicamente um ou, ocasionalmente, dois cromossomas Y.

Cariótipo

Produto de frequência fenotípica: 0.0056.

Tempo de duplicação	24 horas

IDENTIFICADORES

Referência

5637 (número de catálogo Cytion 300105)

Número de identificação fiscal do NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0126

EXPRESSÃO E SUSCETIBILIDADE

Isoenzimas

Me-2, 1, PGM3, 2, PGM1, 1, ES-D, 1, AK-1, 1, GLO-1, 1-2, G6PD, B

Produtos

IL-1, IL-6, G-CFS, GM-CSF, SCF

MANUSEAMENTO E CULTURA

Meio de cultura

RPMI 1640, com: 2,0 mM de glutamina estável, com: 2,0 g/L NaHCO3 (número de artigo Cytion 820700a)

Atmosfera de incubação	37°C, 5%CO2, atmosfera humidificada.

Suplementos

Completar o meio com 10% de FBS

Reagente de dissociação	Accutase

Subcultura

Em primeiro lugar, remover o meio antigo das células aderentes e lavá-las com PBS sem cálcio e magnésio. Para os frascos T25, utilizar 3-5 ml de PBS e, para os frascos T75, utilizar 5-10 ml. Em seguida, cobrir completamente as células com Accutase, utilizando 1-2 ml para os frascos T25 e 2,5 ml para os frascos T75. Deixar as células incubar à temperatura ambiente durante 8-10 minutos para as destacar. Após a incubação, misturar suavemente as células com 10 ml de meio para as ressuspender e, em seguida, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Deitar fora o sobrenadante, ressuspender as células em meio fresco e transferi-las para novos frascos que já contenham meio fresco.

Rácio de divisão	1 a 5
Densidade de sementeira	1 x 10^4 células/cm^2 resultará numa monocamada confluente em 3 dias.
Renovação de fluidos	2 a 3 vezes por semana
Recuperação após o descongelamento	Após o descongelamento, coloque as células em placas a uma densidade de 5 x 10^4 células/cm^2 e deixe-as recuperar do processo de congelamento e aderir durante pelo menos 24 horas.

Descongelamento e cultura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLO DE QUALIDADE E CRIOPRESERVAÇÃO

Esterilidade

A contaminação por micoplasma é excluída utilizando ensaios baseados em PCR e métodos de deteção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não há contaminação bacteriana, fúngica ou de leveduras, as culturas de células são sujeitas a inspecções visuais diárias.

Meio de congelação	Como meio de criopreservação, utilizamos um meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% DMSO para uma viabilidade pós-descongelamento adequada, ou CM-1 (número de catálogo Cytion 800100), que inclui osmoprotectores optimizados e estabilizadores metabólicos para melhorar a recuperação e reduzir o stress induzido pela crio.

Condições de armazenamento

Para conservação a longo prazo, colocar os frascos em azoto líquido em fase de vapor a uma temperatura entre -150 e -196 °C. O armazenamento a -80 °C é aceitável apenas como um curto passo intermédio antes da transferência para azoto líquido.

Condições de envio

As linhas celulares criopreservadas são expedidas em gelo seco em embalagens validadas e isoladas com refrigerante suficiente para manter aproximadamente -78 °C durante o transporte. Aquando da receção, inspecionar imediatamente o recipiente e transferir sem demora os frascos para um local de armazenamento adequado.

DOADOR

Idade do dador	68 anos
Etnia	Caucasiano

ASPECTOS LEGAIS E DE SEGURANÇA

Precauções de segurança

Quando se planeia armazenar um criovial em nitrogénio líquido para descongelação futura, é obrigatório aderir a medidas de segurança rigorosas. Luvas e vestuário de proteção adequados são essenciais, e a utilização de uma máscara facial ou óculos de segurança é necessária durante a transferência de amostras congeladas para ou do tanque de nitrogénio líquido. Isto destina-se a mitigar o risco de ferimentos provocados por potenciais explosões de crioviais após a remoção, que podem resultar na projeção de fragmentos afiados.

Garantia

Na Cytion, nós garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células serão viáveis no início da cultura por 60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no Certificado de Análise e/ou Folha de Produto
Para mais informações, consulte a nossa <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Declaração de Garantia

É necessário um Acordo de Transferência de Material	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB