769-P Kennot

300106

769-P-solulinja on ihmisen munuaissolusyövän (RCC) solulinja, joka on peräisin 63-vuotiaan naispotilaan, jolla oli munuaissolujen adenokarsinooma, vuonna 1975 tehdystä nefrektomiasta. Sitä käytetään laajalti munuaissolusyöpätutkimuksissa, erityisesti kirkassoluisen munuaissolusyövän (ccRCC) tutkimuksessa, joka on yleisin ja tappavin munuaissyövän muoto aikuisilla.
Solulinjassa 769-P on monia primaarisen RCC:n ominaisuuksia, ja siinä on useita munuaissolusyövän kannalta merkityksellisiä mutaatioita. Niillä on toimintakato von Hippel-Lindau (VHL) -kasvainsuppressorigeenissä, joka on tärkeä munuaissyöpägeeni ccRCC:ssä ja joka voi aktivoida erilaisia onkogeenisiä reittejä, kuten angiogeneesiä, solujen proliferaatiota ja aineenvaihdunnan uudelleenohjelmointia.
Solulinjaa 769-P käytetään munuaissyövän patogeneesin molekyylimekanismien ymmärtämiseen, syöpälääkkeiden tehokkuuden tutkimiseen ja lääkeresistenssin mekanismien tutkimiseen. Nämä solut ovat erityisen käyttökelpoisia tutkittaessa vastetta tyrosiinikinaasin estäjille (TKI), jotka ovat RCC:n ja RCC:n alatyyppien hoidossa käytettävien kohdennettujen hoitojen luokka.
Munuaissyöpäsolulinjaa 769-P käytetään lisäksi kasvaimen mikroympäristön roolin tutkimiseen munuaissyövässä ja soluprosessien, kuten apoptoosin, solusyklin säätelyn ja metastaattisen potentiaalin, tutkimiseen. Koska ne reagoivat herkästi hypoksisiin olosuhteisiin, ne soveltuvat tutkimukseen, jossa selvitetään, miten syöpäsolusyöpä sopeutuu ja menestyy kiinteissä kasvaimissa esiintyvässä vähähappisessa ympäristössä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että 769-P-solulinja ja muut RCC-solulinjat ovat korvaamattomia välineitä munuaissyöpätutkimuksessa, sillä ne tarjoavat tietoa ccRCC:n patogeneesistä, lääkkeiden tehosta ja resistenssimekanismeista.

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

769-P-solulinja on ihmisen munuaissolusyövän (RCC) solulinja, joka on peräisin 63-vuotiaan naispotilaan, jolla oli munuaissolujen adenokarsinooma, vuonna 1975 tehdystä nefrektomiasta. Sitä käytetään laajalti munuaissolusyöpätutkimuksissa, erityisesti kirkassoluisen munuaissolusyövän (ccRCC) tutkimuksessa, joka on yleisin ja tappavin munuaissyövän muoto aikuisilla.
Solulinjassa 769-P on monia primaarisen RCC:n ominaisuuksia, ja siinä on useita munuaissolusyövän kannalta merkityksellisiä mutaatioita. Niillä on toimintakato von Hippel-Lindau (VHL) -kasvainsuppressorigeenissä, joka on tärkeä munuaissyöpägeeni ccRCC:ssä ja joka voi aktivoida erilaisia onkogeenisiä reittejä, kuten angiogeneesiä, solujen proliferaatiota ja aineenvaihdunnan uudelleenohjelmointia.
Solulinjaa 769-P käytetään munuaissyövän patogeneesin molekyylimekanismien ymmärtämiseen, syöpälääkkeiden tehokkuuden tutkimiseen ja lääkeresistenssin mekanismien tutkimiseen. Nämä solut ovat erityisen käyttökelpoisia tutkittaessa vastetta tyrosiinikinaasin estäjille (TKI), jotka ovat RCC:n ja RCC:n alatyyppien hoidossa käytettävien kohdennettujen hoitojen luokka.
Munuaissyöpäsolulinjaa 769-P käytetään lisäksi kasvaimen mikroympäristön roolin tutkimiseen munuaissyövässä ja soluprosessien, kuten apoptoosin, solusyklin säätelyn ja metastaattisen potentiaalin, tutkimiseen. Koska ne reagoivat herkästi hypoksisiin olosuhteisiin, ne soveltuvat tutkimukseen, jossa selvitetään, miten syöpäsolusyöpä sopeutuu ja menestyy kiinteissä kasvaimissa esiintyvässä vähähappisessa ympäristössä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että 769-P-solulinja ja muut RCC-solulinjat ovat korvaamattomia välineitä munuaissyöpätutkimuksessa, sillä ne tarjoavat tietoa ccRCC:n patogeneesistä, lääkkeiden tehosta ja resistenssimekanismeista.

Kudos	Munuaiset
Sairaus	Munuaissolusyöpä

Synonyymit

- 769P
- 769-p

LUOKITTELU

Organismi	Ihminen
Sukupuoli	Nainen
Kasvuominaisuudet	Kiinnittynyt
Bioturvallisuustaso	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

OMINAISUUDET

Morfologia	Epiteelin kaltainen
Kasvaimia aiheuttava	Muodostaa kasvaimia immunosuppressoiduissa hamstereissa ja nude-hiirissä
Ploidisuus	Tässä solulinjassa oli runsaasti tetra-, heksa- ja korkeampiploidisia soluja (2s-populaatioita). Yleisimmän solupopulaation (32 % soluista) pseudodiploidinen karyotyyppi oli 46,xx,-3,-18,del(7) (q21.12,q22.3), ?t(3q?18q).

Karyotyyppi

Hypodiploidi. Modaaliluku = 45. Kaikissa soluissa oli suuri submetasentrinen kromosomi.

Kaksinkertaistumisaika	35 tuntia

TUNNISTEET

Lähdeviite

769-P (Cytionin luettelonumero 300106)

NCBI-verotunnus	9606
Cellosaurus	CVCL_1050

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilia glutamiinia, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytionin artikkelinumero 820700a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 %:lla FBS:llä

Dissosiaatioreagenssi	Accutase

Soluviljely

Poista vanha väliaine tarttuneista soluista ja pese ne PBS:llä, josta puuttuu kalsiumia ja magnesiumia. Käytä T25-pulloissa 3-5 ml PBS:ää ja T75-pulloissa 5-10 ml. Peitä sitten solut kokonaan Accutase-valmisteella, käyttäen 1-2 ml T25-pulloissa ja 2,5 ml T75-pulloissa. Anna solujen inkuboitua huoneenlämmössä 8-10 minuuttia solujen irtoamiseksi. Inkuboinnin jälkeen solut sekoitetaan varovasti 10 ml:n väliaineella niiden resuspendoimiseksi ja sentrifugoidaan sitten 300xg:n nopeudella 3 minuutin ajan. Hävitä supernatantti, suspendoi solut uudelleen tuoreeseen väliaineeseen ja siirrä ne uusiin pulloihin, jotka sisältävät jo tuoretta väliaineita.

Kylvötiheys	3 x 10^4 solua/cm^2 tuottaa yhtenäisen yksikerroksen 4 päivän kuluessa.
Nesteen uusiminen	2-3 kertaa viikossa
Sulamisen jälkeinen palautuminen	Sulattamisen jälkeen levitä solut 5 x 10^4 solua/cm^2 ja anna solujen toipua jäädyttämisprosessista ja kiinnittyä vähintään 48 tunnin ajan.

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Luovuttajan ikä	63 vuotta
Etnisyys	Kaukasialainen

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB