769 תאים-P

300106

769 שהופק מדגימת נפרקטומיה של מטופלת בת 63 עם אדנוקרצינומה של תאי (RCC) הוא קו תאים של קרצינומה של תאי כליה אנושיים P-קו התאים (ccRCC), כליה בשנת 1975. הוא נמצא בשימוש נרחב במחקר על סרטן תאי כליה, ובפרט קרצינומה של תאי כליה שקופים שהוא הסוג הנפוץ והקטלני ביותר של סרטן כליה בקרב מבוגרים.

769 ראשוני ומכיל מספר מוטציות הרלוונטיות לסרטן תאי הכליה. תאים אלה מפגינים אובדן תפקוד בגן RCC שומר על מאפיינים רבים של P-קו התאים ccRCC-שהוא גן חשוב בסרטן הכליה ב ,(VHL) von Hippel-Lindau מדכא הגידול שיכול להפעיל מסלולים אונקוגניים שונים, כולל אנגיוגנזה, התרבות תאים ותכונות מחדש של חילוף החומרים.

769 משמש להבנת המנגנונים המולקולריים של פתוגנזה של סרטן הכליה, לחקר היעילות של תרופות נגד סרטן ולחקר המנגנונים של עמידות P-קו התאים ובסוגים RCC-שהם סוג של טיפולים ממוקדים המשמשים לטיפול ב ,(TKIs) לתרופות. תאים אלה שימושיים במיוחד לחקר התגובה למעכבי טירוזין קינאז משניים של RCC.

769 של סרטן הכליה משמש גם לחקר תפקידה של הסביבה המיקרו-סביבתית של הגידול בסרטן הכליה ולחקר תהליכים תאיים כגון P-קו התאים מסתגל ומשגשג ccRCC אפופטוזיס, ויסות מחזור התא ופוטנציאל גרורתי. תגובתם לתנאים היפוקסיים הופכת אותם למתאימים למחקר על האופן שבו בסביבות דלות חמצן הנמצאות בגידולים מוצקים.

769 הם כלים חיוניים במחקר על קרצינומה של הכליה, המספקים תובנות על הפתוגנזה של RCC וקווי תאים אחרים של P-לסיכום, קו התאים ccRCC, יעילות התרופות ומנגנוני העמידות.

GENERAL INFORMATION

Description

769 שהופק מדגימת נפרקטומיה של מטופלת בת 63 עם אדנוקרצינומה של תאי (RCC) הוא קו תאים של קרצינומה של תאי כליה אנושיים P-קו התאים (ccRCC), כליה בשנת 1975. הוא נמצא בשימוש נרחב במחקר על סרטן תאי כליה, ובפרט קרצינומה של תאי כליה שקופים שהוא הסוג הנפוץ והקטלני ביותר של סרטן כליה בקרב מבוגרים.

769 ראשוני ומכיל מספר מוטציות הרלוונטיות לסרטן תאי הכליה. תאים אלה מפגינים אובדן תפקוד בגן RCC שומר על מאפיינים רבים של P-קו התאים ccRCC-שהוא גן חשוב בסרטן הכליה ב ,(VHL) von Hippel-Lindau מדכא הגידול שיכול להפעיל מסלולים אונקוגניים שונים, כולל אנגיוגנזה, התרבות תאים ותכונות מחדש של חילוף החומרים.

769 משמש להבנת המנגנונים המולקולריים של פתוגנזה של סרטן הכליה, לחקר היעילות של תרופות נגד סרטן ולחקר המנגנונים של עמידות P-קו התאים ובסוגים RCC-שהם סוג של טיפולים ממוקדים המשמשים לטיפול ב ,(TKIs) לתרופות. תאים אלה שימושיים במיוחד לחקר התגובה למעכבי טירוזין קינאז משניים של RCC.

769 של סרטן הכליה משמש גם לחקר תפקידה של הסביבה המיקרו-סביבתית של הגידול בסרטן הכליה ולחקר תהליכים תאיים כגון P-קו התאים מסתגל ומשגשג ccRCC אפופטוזיס, ויסות מחזור התא ופוטנציאל גרורתי. תגובתם לתנאים היפוקסיים הופכת אותם למתאימים למחקר על האופן שבו בסביבות דלות חמצן הנמצאות בגידולים מוצקים.

769 הם כלים חיוניים במחקר על קרצינומה של הכליה, המספקים תובנות על הפתוגנזה של RCC וקווי תאים אחרים של P-לסיכום, קו התאים ccRCC, יעילות התרופות ומנגנוני העמידות.

Tissue	כליה
Disease	קרצינומה של תאי הכליה

Synonyms

- 769P
- 769-p

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

CHARACTERISTICS

Morphology	דמוי אפיתל
Tumourigenic	יוצר גידולים בחולדות עם דיכוי חיסוני ובעכברים עירומים
Ploidy status	קו תאים זה הכיל מספר גבוה של תאים טטרה-, הקסה- ופלואידים גבוהים יותר (אוכלוסיות 2). האוכלוסייה הנפוצה ביותר (32% מהתאים) הייתה בעלת קריוטיפ פסאודו-דיפלואידי של 46,xx,-3,-18,del(7) (q21.12,q22.3), ?t(3q?18q).

Karyotype

היפודיפלואידי. מספר מודאלי = 45. כרומוזום תת-מרכזתי גדול היה נוכח בכל התאים.

Doubling time	35 שעות

IDENTIFIERS

Citation

769-P (מספר קטלוגי Cytion 300106)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1050

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, w: 2.0 mM גלוטמין יציב, w: 2.0 g/L NaHCO3 (מספר קטלוגי Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, אווירה לחה.

Supplements

10% הוסף לתווך FBS

Dissociation reagent	אקוטאז

Subculturing

T75, ועבור בקבוקי PBS, השתמש ב-3-5 מ"ל T25, ללא סידן ומגנזיום. עבור בקבוקי PBS-הסר את המדיום הישן מהתאים הדבוקים ושטוף אותם ב השאר את T75. ו-2.5 מ"ל עבור בקבוקי T25 תוך שימוש ב-1-2 מ"ל עבור בקבוקי Accutase-השתמש ב-5-10 מ"ל. לאחר מכן, כסה את התאים לחלוטין ב התאים לדגירה בטמפרטורת החדר למשך 8-10 דקות כדי לנתק אותם. לאחר הדגירה, ערבב בעדינות את התאים עם 10 מ"ל של מדיום כדי להחזיר אותם למשך 3 דקות. השלך את הנוזל העליון, החזר את התאים לתמיסה במדיום טרי והעבר אותם לצלחות חדשות xgלתמיסה, ואז סובב בצנטריפוגה ב-300 שכבר מכילות מדיום טרי.

Seeding density	3×10^4 תאים/סמ"ר יניבו שכבה חד-תאית מלוכדת תוך 4 ימים.
Fluid renewal	עד 3 פעמים בשבוע 2
Post-thaw recovery	10^4 x תאים/סמ"ר והניחו לתאים להתאושש מתהליך ההקפאה לאחר ההפשרה, צלחו את התאים ב-5 ולהידבק למשך 48 שעות לפחות.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

ושיטות זיהוי מיקופלסמה מבוססות לומניסצנציה PCR זיהום במיקופלסמה נשלל באמצעות בדיקות מבוססות.
כדי להבטיח שאין זיהום חיידקי, פטרייתי או שמרי, תרבויות התאים עוברות בדיקות ויזואליות יומיות.

Freeze medium	כדי להבטיח 10% DMSO + (FBS כולל) כמדיום לשימור בקירור, אנו משתמשים במדיום גידול מלא הכולל חומרים אוסמו- (Cytion 800100 מספר קטלוגי) CM-1 חיוניות נאותה לאחר ההפשרה, או מגנים ומייצבי מטבוליזם משופרים כדי לשפר את ההתאוששות ולהפחית את הלחץ הנגרם מהקפאה.

Storage conditions

לשימור לטווח ארוך, יש להניח את הבקבוקונים בחנקן נוזלי במצב של אדי בטמפרטורה של כ-150 עד 196 מעלות צלזיוס. אחסון בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס מקובל רק כצעד ביניים קצר לפני העברה לחנקן נוזלי.

Shipping conditions

במהלך -Cשורות תאים שהוקפאו נשלחות בקרח יבש באריזה מאושרת ומבודדת עם כמות מספקת של חומר קירור כדי לשמור על טמפרטורה של כ-78°. ההובלה. עם קבלת המשלוח, יש לבדוק את המכל מיד ולהעביר את הבקבוקונים ללא דיחוי לאחסון מתאים.

DONOR

Donor age	63 שנים
Ethnicity	קווקזי

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

כאשר מתכננים לאחסן קריוביאל בחנקן נוזלי להפשרה עתידית, חובה להקפיד על אמצעי בטיחות מחמירים. יש להקפיד על שימוש בכפפות ובבגדים מגנים מתאימים, וכן על שימוש במסכת פנים או משקפי מגן בעת העברת דגימות קפואות אל מיכל החנקן הנוזלי או ממנו. זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מפיצוץ אפשרי של הקריוביאל בעת הוצאתו, העלול לגרום להתזת רסיסים חדים.

Warranty

אנו עומדים מאחורי האיכות והכדאיות של המוצרים שלנו, ב-Cytion.
אנו מבטיחים שתאינו יהיו קיימים בתחילת התרבית למשך
60 יום לאחר המשלוח מהמתקנים שלנו.
אנו מבטיחים שכל החומרים תואמים למפרטים המתוארים
בתעודת הניתוח ו/או בדף המוצר.
לפרטים מלאים, אנא עיינו ב
<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">הצהרת האחריות שלנו

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB