A204 Celler

300109

A204-celler er humane epitelceller, der stammer fra musklerne hos en 1-årig kvindelig patient med rhabdomyosarkom. Med anvendelser i 3D-cellekultur og tumorigeniske egenskaber giver A-204-celler mulighed for at studere tumorbiologi og potentielle terapeutiske indgreb. A-204-cellerne stammer fra muskelvæv og ligner meget det ydre lag af celler, der findes i organer og væv.
A204-cellelinjen er kendetegnet ved sin aggressive udifferentierede fænotype, hvilket gør den til en værdifuld model til undersøgelse af de molekylære mekanismer for tumorigenese og metastase i bløddelssarkomer.
Tilstedeværelsen af specifikke isoenzymer, herunder AK-1, ES-D, G6PD, GLO-I, Me-2, PGM1 og PGM3, i A-204-celler giver indsigt i deres metaboliske egenskaber. Disse isoenzymer kan spille en rolle i forståelsen af cellulære processer, der er involveret i kræftprogression og behandlingsrespons.
Disse celler udviser robust vækst in vitro og er blevet brugt til at studere celleproliferation, apoptose og mekanismer for lægemiddelresistens. A204-cellelinjen er også afgørende for evalueringen af nye kemoterapeutiske midler og for forståelsen af samspillet mellem rhabdomyosarkomceller og terapeutiske forbindelser.
Denne cellelinje er et vigtigt værktøj for kræftforskere, der ønsker at udvikle mere effektive behandlinger af sarkomer og andre beslægtede maligne sygdomme.

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

A204-celler er humane epitelceller, der stammer fra musklerne hos en 1-årig kvindelig patient med rhabdomyosarkom. Med anvendelser i 3D-cellekultur og tumorigeniske egenskaber giver A-204-celler mulighed for at studere tumorbiologi og potentielle terapeutiske indgreb. A-204-cellerne stammer fra muskelvæv og ligner meget det ydre lag af celler, der findes i organer og væv.
A204-cellelinjen er kendetegnet ved sin aggressive udifferentierede fænotype, hvilket gør den til en værdifuld model til undersøgelse af de molekylære mekanismer for tumorigenese og metastase i bløddelssarkomer.
Tilstedeværelsen af specifikke isoenzymer, herunder AK-1, ES-D, G6PD, GLO-I, Me-2, PGM1 og PGM3, i A-204-celler giver indsigt i deres metaboliske egenskaber. Disse isoenzymer kan spille en rolle i forståelsen af cellulære processer, der er involveret i kræftprogression og behandlingsrespons.
Disse celler udviser robust vækst in vitro og er blevet brugt til at studere celleproliferation, apoptose og mekanismer for lægemiddelresistens. A204-cellelinjen er også afgørende for evalueringen af nye kemoterapeutiske midler og for forståelsen af samspillet mellem rhabdomyosarkomceller og terapeutiske forbindelser.
Denne cellelinje er et vigtigt værktøj for kræftforskere, der ønsker at udvikle mere effektive behandlinger af sarkomer og andre beslægtede maligne sygdomme.

Væv	Muskler
Sygdom	Rhabdomyosarkom
Metastasested	Primær tumorlokalisation (muskel)

Anvendelser

Forskning i rabdomyosarkom; biologi ved sarkomer hos børn; undersøgelser af muskeldifferentiering; lægemiddelfølsomhed; prækliniske sarkommodeller

Synonymer

- A-204

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Kvinde
Vækstegenskaber	Tilhænger
GMO-status	GMO-fri

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Oplysninger om GMO-status

No genetic modification; wildtype rhabdomyosarcoma cell line

Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Morfologi	Epitel-lignende
Celletype	Rhabdomyosarkomceller
Tumorfremkaldende	I nøgne mus. Danner små ondartede tumorer, som er i overensstemmelse med embryonalt rhabdomyosarkom.
Ploidistatus	Diploid og tetraploid
MSI-status	Stabil (MSS)
Fordoblingstid	26 til 36 timer

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

A204 (Cytion katalognummer 300109)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1058

UDTRYK OG MODTAGELIGHED

Isoenzymer

PGM3, 1, PGM1, 1, ES-D, 1, Me-2, 1, AK-1, 1, GLO-1, 1, G6PD, B

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

DMEM, w: 4,5 g/L glukose, w: 4 mM L-glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM natriumpyruvat (Cytion artikelnummer 820300a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS

Dissociationsreagens	Accutase

Oddyrkning

Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspender cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.

Opdelingsforhold	1 til 5
Såtæthed	0,5 til 1 x 10^4 celler/cm^2
Væskeudskiftning	2 til 3 gange om ugen
Genopretning efter optøning	Efter optøning skal cellerne udplades med 2 x 10^4 celler/cm^2, og cellerne skal have lov til at komme sig efter frysningsprocessen og hæfte sig fast i mindst 24 til 48 timer.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	1 år

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes