Cellules A204

300109

Les cellules A-204 sont des cellules épithéliales humaines issues des muscles d'une patiente âgée d'un an atteinte d'un rhabdomyosarcome. Grâce à leurs applications en culture cellulaire 3D et à leurs propriétés tumorigènes, les cellules A-204 offrent la possibilité d'étudier la biologie des tumeurs et les interventions thérapeutiques potentielles. Dérivées du tissu musculaire, les cellules A-204 ressemblent étroitement à la couche externe de cellules que l'on retrouve dans les organes et les tissus.
La lignée cellulaire A204 se caractérise par son phénotype agressif et indifférencié, ce qui en fait un modèle précieux pour l'étude des mécanismes moléculaires de la tumorigenèse et des métastases dans les sarcomes des tissus mous.
La présence d'isoenzymes spécifiques, notamment AK-1, ES-D, G6PD, GLO-I, Me-2, PGM1 et PGM3, dans les cellules A-204 permet de mieux comprendre leurs caractéristiques métaboliques. Ces isoenzymes pourraient jouer un rôle dans la compréhension des processus cellulaires impliqués dans la progression du cancer et la réponse au traitement.
Ces cellules présentent une croissance vigoureuse in vitro et ont été utilisées pour étudier la prolifération cellulaire, l'apoptose et les mécanismes de résistance aux médicaments. La lignée cellulaire A204 joue également un rôle déterminant dans l'évaluation de nouveaux agents chimiothérapeutiques et dans la compréhension de l'interaction entre les cellules de rhabdomyosarcome et les composés thérapeutiques.
Cette lignée cellulaire constitue un outil essentiel pour les chercheurs en cancérologie qui cherchent à mettre au point des traitements plus efficaces contre les sarcomes et d'autres tumeurs malignes apparentées.

GENERAL INFORMATION

Description

Les cellules A-204 sont des cellules épithéliales humaines issues des muscles d'une patiente âgée d'un an atteinte d'un rhabdomyosarcome. Grâce à leurs applications en culture cellulaire 3D et à leurs propriétés tumorigènes, les cellules A-204 offrent la possibilité d'étudier la biologie des tumeurs et les interventions thérapeutiques potentielles. Dérivées du tissu musculaire, les cellules A-204 ressemblent étroitement à la couche externe de cellules que l'on retrouve dans les organes et les tissus.
La lignée cellulaire A204 se caractérise par son phénotype agressif et indifférencié, ce qui en fait un modèle précieux pour l'étude des mécanismes moléculaires de la tumorigenèse et des métastases dans les sarcomes des tissus mous.
La présence d'isoenzymes spécifiques, notamment AK-1, ES-D, G6PD, GLO-I, Me-2, PGM1 et PGM3, dans les cellules A-204 permet de mieux comprendre leurs caractéristiques métaboliques. Ces isoenzymes pourraient jouer un rôle dans la compréhension des processus cellulaires impliqués dans la progression du cancer et la réponse au traitement.
Ces cellules présentent une croissance vigoureuse in vitro et ont été utilisées pour étudier la prolifération cellulaire, l'apoptose et les mécanismes de résistance aux médicaments. La lignée cellulaire A204 joue également un rôle déterminant dans l'évaluation de nouveaux agents chimiothérapeutiques et dans la compréhension de l'interaction entre les cellules de rhabdomyosarcome et les composés thérapeutiques.
Cette lignée cellulaire constitue un outil essentiel pour les chercheurs en cancérologie qui cherchent à mettre au point des traitements plus efficaces contre les sarcomes et d'autres tumeurs malignes apparentées.

Tissue	Muscle
Disease	Rhabdomyosarcome
Metastatic site	Site de la tumeur primaire (muscle)

Applications

Recherche sur le rhabdomyosarcome; biologie des sarcomes pédiatriques; études sur la différenciation musculaire; sensibilité aux médicaments; modèles précliniques de sarcome

Synonyms

- A-204

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Growth properties	Adherent
GMO status	Non-GMO

GMO status details

No genetic modification; wildtype rhabdomyosarcoma cell line

Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	De type épithélial
Cell type	Cellules de rhabdomyosarcome
Tumourigenic	Chez la souris nude. Provoque l'apparition de petites tumeurs malignes qui correspondent à un rhabdomyosarcome embryonnaire.
Ploidy status	Diploïde et tétraploïde
MSI status	Stable (MSS)
Doubling time	de 26 à 36 heures

IDENTIFIERS

Citation

A204 (numéro de catalogue Cytion 300109)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1058

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Isoenzymes

PGM3, 1, PGM1, 1, ES-D, 1, Me-2, 1, AK-1, 1, GLO-1, 1, G6PD, B

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM, p/v : 4,5 g/L de glucose, p/v : 4 mM de L-glutamine, p/v : 3,7 g/L de $NaHCO_3$, p/v : 1,0 mM de pyruvate de sodium (référence Cytion 820300a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmosphère humidifiée.

Supplements

Ajouter 10 % de FBS au milieu de culture

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Retirez l'ancien milieu des cellules adhérentes et lavez-les avec du PBS sans calcium ni magnésium. Pour les flacons T25, utilisez 3 à 5 ml de PBS, et pour les flacons T75, utilisez 5 à 10 ml. Ensuite, recouvrez complètement les cellules d'Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laissez les cellules incuber à température ambiante pendant 8 à 10 minutes afin de les détacher. Après l'incubation, mélangez délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifugez à 300 x g pendant 3 minutes. Éliminez le surnageant, remettez les cellules en suspension dans du milieu frais, puis transférez-les dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais.

Split ratio	1 à 5

Seeding density	de 0,5 à 1 × 10^4 cellules/cm^2
Fluid renewal	2 à 3 fois par semaine
Post-thaw recovery	Après la décongélation, ensemencer les cellules à une densité de 2 × 10^4 cellules/cm^2 et laisser les cellules se remettre du processus de congélation et adhérer pendant au moins 24 à 48 heures.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes par luminescence.
Afin de s’assurer qu’il n’y a aucune contamination bactérienne, fongique ou par des levures, les cultures cellulaires font l’objet d’inspections visuelles quotidiennes.

Freeze medium	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (contenant du sérum fœtal bovin) + 10 % de DMSO pour assurer une viabilité adéquate après décongélation, ou du CM-1 (référence Cytion 800100), qui contient des osmoprotecteurs et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryoconservation.

Storage conditions

Pour une conservation à long terme, placez les flacons dans de l’azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre environ −150 et −196 °C. L’entreposage à −80 °C n’est acceptable qu’à titre d’étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l’azote liquide.

Shipping conditions

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées dans de la glace sèche, dans un emballage isotherme validé contenant suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d’environ −78 °C pendant tout le transport. À la réception, inspectez immédiatement le conteneur et transférez sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONOR

Donor age	1 an

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Lorsqu’on prévoit entreposer un cryotube dans de l’azote liquide en vue d’une décongélation ultérieure, il est impératif de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Le port de gants et de vêtements de protection appropriés est essentiel, et l’utilisation d’un masque facial ou de lunettes de protection est obligatoire lors du transfert d’échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d’azote liquide. Cette précaution vise à réduire le risque de blessure causé par d’éventuelles explosions de cryotubes lors de leur retrait, pouvant entraîner la projection de fragments coupants.

Warranty

Chez Cytion, nous garantissons la qualité et la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours à compter de leur expédition depuis nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche technique du produit.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre déclaration de garantie.

Material Transfer Agreement required	Yes