A204 Šūnas

300109

A204 šūnas ir cilvēka epitēlija šūnas, kas iegūtas no 1 gadu vecas sievietes, kura bija saslimusi ar rabdomiosarkomu, muskuļiem. A-204 šūnas, ko var izmantot 3D šūnu kultūrā un kurām piemīt audzēja īpašības, sniedz iespēju pētīt audzēju bioloģiju un iespējamās terapeitiskās iejaukšanās iespējas. A-204 šūnas, kas iegūtas no muskuļu audiem, ir ļoti līdzīgas orgānu un audu šūnu ārējam slānim.
A204 šūnu līnijai ir raksturīgs agresīvs nediferencēts fenotips, tāpēc tā ir vērtīgs modelis mīksto audu sarkomu audzēju rašanās un metastāžu molekulāro mehānismu izpētei.
Konkrētu izoenzīmu, tostarp AK-1, ES-D, G6PD, GLO-I, Me-2, PGM1 un PGM3, klātbūtne A-204 šūnās sniedz ieskatu to metaboliskajās īpašībās. Šiem izoenzīmiem var būt nozīme, lai izprastu vēža progresēšanu un atbildes reakciju uz ārstēšanu veicinošos šūnu procesus.
Šīm šūnām piemīt spēcīga augšana in vitro, un tās ir izmantotas šūnu proliferācijas, apoptozes un rezistences pret zālēm mehānismu izpētei.
A204 šūnu līnija ir noderīga arī jaunu ķīmijterapeitisko līdzekļu novērtēšanā un rabdomiosarkomu šūnu un terapeitisko savienojumu mijiedarbības izpratnē.
Šī šūnu līnija kalpo kā būtisks rīks vēža pētniekiem, kuru mērķis ir izstrādāt efektīvāku ārstēšanu sarkomu un citu radniecīgu ļaundabīgu audzēju gadījumā.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Apraksts

A204 šūnas ir cilvēka epitēlija šūnas, kas iegūtas no 1 gadu vecas sievietes, kura bija saslimusi ar rabdomiosarkomu, muskuļiem. A-204 šūnas, ko var izmantot 3D šūnu kultūrā un kurām piemīt audzēja īpašības, sniedz iespēju pētīt audzēju bioloģiju un iespējamās terapeitiskās iejaukšanās iespējas. A-204 šūnas, kas iegūtas no muskuļu audiem, ir ļoti līdzīgas orgānu un audu šūnu ārējam slānim.
A204 šūnu līnijai ir raksturīgs agresīvs nediferencēts fenotips, tāpēc tā ir vērtīgs modelis mīksto audu sarkomu audzēju rašanās un metastāžu molekulāro mehānismu izpētei.
Konkrētu izoenzīmu, tostarp AK-1, ES-D, G6PD, GLO-I, Me-2, PGM1 un PGM3, klātbūtne A-204 šūnās sniedz ieskatu to metaboliskajās īpašībās. Šiem izoenzīmiem var būt nozīme, lai izprastu vēža progresēšanu un atbildes reakciju uz ārstēšanu veicinošos šūnu procesus.
Šīm šūnām piemīt spēcīga augšana in vitro, un tās ir izmantotas šūnu proliferācijas, apoptozes un rezistences pret zālēm mehānismu izpētei.
A204 šūnu līnija ir noderīga arī jaunu ķīmijterapeitisko līdzekļu novērtēšanā un rabdomiosarkomu šūnu un terapeitisko savienojumu mijiedarbības izpratnē.
Šī šūnu līnija kalpo kā būtisks rīks vēža pētniekiem, kuru mērķis ir izstrādāt efektīvāku ārstēšanu sarkomu un citu radniecīgu ļaundabīgu audzēju gadījumā.

Audums	Muskuļi
Slimība	Rabdomiosarkoma
Metastāžu vieta	Primārā audzēja lokalizācija (muskuļi)

Pieteikumi

Rabdomiosarkomas pētījumi; bērnu sarkomu bioloģija; muskuļu diferenciācijas pētījumi; jutība pret zālēm; sarkomu pirmsklīniskie modeļi

Sinonīmi

- A-204

KLASIFIKĀCIJA

Organisms	Cilvēks
Sekss	Sieviete
Augšanas īpašības	Atbalstītājs
ĢMO statuss	Bez ĢMO

Sīkāka informācija par ĢMO statusu

No genetic modification; wildtype rhabdomyosarcoma cell line

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Bioloģiskās drošības līmenis	1

RAKSTURLIELUMI

Morfoloģija	Epitēlijveidīgs
Šūnu tips	Rabdomiosarkomas šūnas
Tumorogēns	Plikām pelēm. Veido nelielus ļaundabīgus audzējus, kas atbilst embrionālajai rabdomiosarkomai.
Ploidijas statuss	Diploīdi un tetraploīdi
MSI statuss	Stabils (MSS)
Laiks, kas nepieciešams, lai skaits dubultojās	26 līdz 36 stundas

IDENTIFIKATORI

Atsauce

A204 (Cytion kataloga numurs 300109)

NCBI nodokļu identifikācijas numurs	9606
Cellosaurus	CVCL_1058

PAZĪMES UN UZŅĒMĪBA

Izoenzīmi

PGM3, 1, PGM1, 1, ES-D, 1, Me-2, 1, AK-1, 1, GLO-1, 1, G6PD, B

APSTRĀDE UN AUDZĒŠANA

Barotne

DMEM, w: 4,5 g/l glikozes, w: 4 mM L-glutamīna, w: 3,7 g/l NaHCO3, w: 1,0 mM nātrija piruvāta (Cytion izstrādājuma numurs 820300a)

Inkubācijas vide	37°C, 5%CO2, mitrināta atmosfēra.

Papildinājumi

Papildināt barotni ar 10% FBS

Disociācijas reaģents	Accutase

Pārstādīšana

Noņemt veco barotni no pielipušajām šūnām un mazgāt tās ar PBS, kurā nav kalcija un magnija. T25 kolbām izmantojiet 3-5 ml PBS, bet T75 kolbām - 5-10 ml. Pēc tam pilnībā pārklājiet šūnas ar Accutase, izmantojot 1-2 ml T25 kolbām un 2,5 ml T75 kolbām. Ļaujiet šūnām inkubēties istabas temperatūrā 8-10 minūtes, lai tās atdalītos. Pēc inkubācijas uzmanīgi samaisiet šūnas ar 10 ml barotnes, lai tās atkārtoti suspendētu, pēc tam centrifugējiet 3 minūtes ar 300xg. Izmetiet supernatantu, atkārtoti suspendējiet šūnas svaigā barotnē un pārvietojiet tās jaunās kolbās, kurās jau ir svaiga barotne.

Sadalījuma attiecība	no 1 līdz 5
Sēšanas blīvums	0,5 līdz 1 x 10^4 šūnas/cm^2
Šķidruma atjaunošana	2 līdz 3 reizes nedēļā
Atgūšanās pēc atkusņa	Pēc atkausēšanas izkliedējiet šūnas 2 x 10^4 šūnas/cm^2 un ļaujiet šūnām atgūties no sasaldēšanas procesa un pielipt vismaz 24 līdz 48 stundas.

Atkausēšana un kultivēšana

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITĀTES KONTROLE UN KRIOKONSERVĀCIJA

Sterilitāte

Mikoplazmas piesārņojums tiek izslēgts, izmantojot gan uz PCR balstītus testus, gan uz luminiscenci balstītas mikoplazmas noteikšanas metodes.
Lai pārliecinātos, ka nav baktēriju, sēnīšu vai rauga piesārņojuma, šūnu kultūras katru dienu vizuāli pārbauda.

Saldēšanas barotne	Kā kriokonservēšanas barotni mēs izmantojam pilnvērtīgu augšanas barotni (ieskaitot FBS) + 10 % DMSO, lai nodrošinātu pietiekamu dzīvotspēju pēc atkausēšanas, vai CM-1 (Cytion kataloga numurs 800100), kas ietver optimizētus osmoprotektorus un metaboliskos stabilizatorus, lai uzlabotu atveseļošanos un samazinātu krioinducēto stresu.

Uzglabāšanas nosacījumi

Ilgstošai uzglabāšanai flakonus ievietojiet šķidrā slāpeklī ar tvaika fāzi aptuveni -150 līdz -196 °C temperatūrā. Uzglabāšana -80 °C temperatūrā ir pieļaujama tikai kā īss starpposms pirms pārvietošanas uz šķidro slāpekli.

Piegādes nosacījumi

Kriokonservētas šūnu līnijas tiek sūtītas uz sausā ledus apstiprinātā, izolētā iepakojumā ar pietiekamu dzesēšanas šķidruma daudzumu, lai visā transportēšanas laikā uzturētu aptuveni -78 °C temperatūru. Pēc saņemšanas nekavējoties pārbaudiet iepakojumu un nekavējoties pārvietojiet flakonus uz atbilstošu uzglabāšanas vietu.

ZIEDOTĀJS

Donora vecums	1 gads

JURIDISKIE JAUTĀJUMI UN DROŠĪBA

Drošības pasākumi

Plānojot uzglabāt kriokviālu šķidrā slāpeklī turpmākai atkausēšanai, obligāti jāievēro stingri drošības pasākumi. Ir nepieciešami piemēroti aizsargcimdi un apģērbs, un, pārvietojot sasaldētos paraugus uz šķidrā slāpekļa tvertni vai no tās, ir jālieto sejas maska vai aizsargbrilles. Tas jādara, lai mazinātu traumu risku, ko var radīt iespējamas kriokrioviālu eksplozijas, kas var izraisīt asu fragmentu izmešanu.

Garantija

Uzņēmumā Cytion mēs atbalstām savu produktu kvalitāti un dzīvotspēju.
Mēs garantējam, ka mūsu šūnas būs dzīvotspējīgas kultivēšanas sākumā 60 dienas pēc nosūtīšanas no mūsu ražotnēm.
Mēs nodrošinām, ka visi materiāli atbilst analīzes sertifikātā un/vai produkta lapā aprakstītajām specifikācijām
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu <a href=""/"/Kas mēs esam/garantija/"" hreflang=""x-default"">Garantijas paziņojumu

Nepieciešams materiālu nodošanas līgums	Yes