A204 Cellen

300109

A204 cellen zijn menselijke epitheelcellen afkomstig uit de spieren van een 1-jarige vrouwelijke patiënt met rhabdomyosarcoom. Met toepassingen in 3D-celkweek en tumorigene eigenschappen bieden A-204 cellen een mogelijkheid voor het bestuderen van tumorbiologie en potentiële therapeutische interventies. De A-204 cellen zijn afkomstig uit spierweefsel en lijken sterk op de buitenste cellaag van organen en weefsels.
De A204 cellijn wordt gekenmerkt door zijn agressieve ongedifferentieerde fenotype, waardoor het een waardevol model is voor het onderzoeken van de moleculaire mechanismen van tumorigenese en metastase in weke delen sarcomen.
De aanwezigheid van specifieke iso-enzymen, waaronder AK-1, ES-D, G6PD, GLO-I, Me-2, PGM1 en PGM3, in A-204 cellen geeft inzicht in hun metabole eigenschappen. Deze iso-enzymen kunnen een rol spelen bij het begrijpen van cellulaire processen die betrokken zijn bij kankerprogressie en de respons op behandelingen.
Deze cellen vertonen een robuuste groei in vitro en zijn gebruikt om celproliferatie, apoptose en resistentiemechanismen tegen medicijnen te bestuderen. De A204 cellijn is ook belangrijk bij de evaluatie van nieuwe chemotherapeutische middelen en bij het begrijpen van de interactie tussen rhabdomyosarcoomcellen en therapeutische verbindingen.
Deze cellijn is een essentieel hulpmiddel voor kankeronderzoekers die effectievere behandelingen willen ontwikkelen voor sarcomen en andere gerelateerde maligniteiten.

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

A204 cellen zijn menselijke epitheelcellen afkomstig uit de spieren van een 1-jarige vrouwelijke patiënt met rhabdomyosarcoom. Met toepassingen in 3D-celkweek en tumorigene eigenschappen bieden A-204 cellen een mogelijkheid voor het bestuderen van tumorbiologie en potentiële therapeutische interventies. De A-204 cellen zijn afkomstig uit spierweefsel en lijken sterk op de buitenste cellaag van organen en weefsels.
De A204 cellijn wordt gekenmerkt door zijn agressieve ongedifferentieerde fenotype, waardoor het een waardevol model is voor het onderzoeken van de moleculaire mechanismen van tumorigenese en metastase in weke delen sarcomen.
De aanwezigheid van specifieke iso-enzymen, waaronder AK-1, ES-D, G6PD, GLO-I, Me-2, PGM1 en PGM3, in A-204 cellen geeft inzicht in hun metabole eigenschappen. Deze iso-enzymen kunnen een rol spelen bij het begrijpen van cellulaire processen die betrokken zijn bij kankerprogressie en de respons op behandelingen.
Deze cellen vertonen een robuuste groei in vitro en zijn gebruikt om celproliferatie, apoptose en resistentiemechanismen tegen medicijnen te bestuderen. De A204 cellijn is ook belangrijk bij de evaluatie van nieuwe chemotherapeutische middelen en bij het begrijpen van de interactie tussen rhabdomyosarcoomcellen en therapeutische verbindingen.
Deze cellijn is een essentieel hulpmiddel voor kankeronderzoekers die effectievere behandelingen willen ontwikkelen voor sarcomen en andere gerelateerde maligniteiten.

Weefsel	Spier
Ziekte	Rhabdomyosarcoom
Plaats van uitzaaiingen	Locatie van de primaire tumor (spier)

Toepassingen

Onderzoek naar rhabdomyosarcoom; biologie van sarcomen bij kinderen; onderzoek naar spierdifferentiatie; gevoeligheid voor geneesmiddelen; preklinische sarcoommodellen

Synoniemen

- A-204

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Vrouw
Groei-eigenschappen	Aanhanger

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

GGO-status	Zonder genetisch gemodificeerde organismen

Details over de GGO-status

No genetic modification; wildtype rhabdomyosarcoma cell line

Bioveiligheidsniveau	1

KENMERKEN

Morfologie	Epitheelachtig
Celtype	Rhabdomyosarcoomcellen
Tumorverwekkend	In naakte muizen. Vormt kleine kwaadaardige tumoren die overeenkomen met embryonaal rhabdomyosarcoom.
Ploïdie	Diploïd en tetraploïd
MSI-status	Stabiel (MSS)
Verdubbelingstijd	26 tot 36 uur

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

A204 (Cytion catalogusnummer 300109)

NCBI-belastingnummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1058

EXPRESSIE EN VATBAARHEID

Iso-enzymen

PGM3, 1, PGM1, 1, ES-D, 1, Me-2, 1, AK-1, 1, GLO-1, 1, G6PD, B

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

DMEM, w: 4,5 g/L Glucose, w: 4 mM L-Glutamine, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM Natriumpyruvaat (Cytion artikelnummer 820300a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 10% FBS

Dissociatiereagens	Accutase

Heruitplanten

Verwijder het oude medium van de adherente cellen en was ze met PBS zonder calcium en magnesium. Gebruik voor T25-flesjes 3-5 ml PBS en voor T75-flesjes 5-10 ml. Bedek de cellen vervolgens volledig met Accutase, met 1-2 ml voor T25-flesjes en 2,5 ml voor T75-flesjes. Laat de cellen gedurende 8-10 minuten bij kamertemperatuur incuberen om ze los te maken. Na incubatie de cellen voorzichtig mengen met 10 ml medium om ze te resuspenderen en vervolgens centrifugeren bij 300xg gedurende 3 minuten. Gooi het supernatant weg, resuspendeer de cellen in vers medium en breng ze over in nieuwe kolven die al vers medium bevatten.

Splitsingsverhouding	1 tot en met 5
Zaaidichtheid	0,5 tot 1 x 10^4 cellen/cm^2
Vloeistofverversing	2 tot 3 keer per week

Herstel na ontdooiing	Na ontdooien, de cellen op een plaat aanbrengen met een dichtheid van 2 x 10^4 cellen/cm^2 en de cellen minstens 24 tot 48 uur laten herstellen van het invriesproces en zich hechten.

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	1 jaar

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes