Cellules A375

300110

La lignée cellulaire A375 de mélanome humain, isolée à partir de la peau d'une patiente de 54 ans atteinte d'un mélanome malin, constitue une ressource importante pour la recherche sur le cancer, en particulier pour l'étude du mélanome humain, l'une des formes les plus agressives de cancer de la peau. La lignée cellulaire A375 est connue pour son taux de croissance rapide et son potentiel tumorigène élevé, ce qui la rend adaptée à diverses applications expérimentales, notamment les études in vitro sur la prolifération, la migration et l'invasion cellulaires, ainsi que les tests de tumorigénèse in vivo.
Les cellules A375 présentent un potentiel tumorigène élevé chez les souris immunodéprimées, formant des mélanomes amélanotiques à croissance rapide. La présence de la mutation BRAFV600E dans les cellules A375 les rend très sensibles à l'inhibition de la MEK, ce qui en fait un outil précieux pour étudier les thérapies ciblées dans le traitement du mélanome. Le traitement des cellules A375 avec le vemurafenib, par exemple, s'est avéré améliorer l'induction des molécules MHC de classe I et de classe II, ce qui permet de mieux comprendre les interactions entre les cellules mélanomateuses et le système immunitaire.
Outre leur rôle dans la recherche fondamentale sur le mélanome, les cellules A375 sont utilisées dans le criblage de médicaments et dans l'étude des voies de signalisation impliquées dans la survie, la prolifération et la métastase des cellules cancéreuses. Les cellules A375 ont également été utilisées dans des études sur l'apoptose, et les lignées cellulaires isogéniques A375 et l'introduction de protéines rapporteuses telles que Luc (luc2) permettent d'étudier la fonction des gènes et de surveiller les réponses cellulaires en temps réel. L'aptitude des cellules A375 à servir d'hôte de transfection et leur utilisation dans des lignées cellulaires rapporteuses stables contribuent également à leur polyvalence dans les applications de recherche.
En résumé, la lignée cellulaire humaine de mélanome A375 est un outil essentiel dans l'étude du mélanome humain, offrant un modèle complet pour étudier les mécanismes moléculaires et cellulaires sous-jacents à la progression du mélanome, l'efficacité des agents thérapeutiques et l'interaction entre les cellules cancéreuses et le système immunitaire.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description

La lignée cellulaire A375 de mélanome humain, isolée à partir de la peau d'une patiente de 54 ans atteinte d'un mélanome malin, constitue une ressource importante pour la recherche sur le cancer, en particulier pour l'étude du mélanome humain, l'une des formes les plus agressives de cancer de la peau. La lignée cellulaire A375 est connue pour son taux de croissance rapide et son potentiel tumorigène élevé, ce qui la rend adaptée à diverses applications expérimentales, notamment les études in vitro sur la prolifération, la migration et l'invasion cellulaires, ainsi que les tests de tumorigénèse in vivo.
Les cellules A375 présentent un potentiel tumorigène élevé chez les souris immunodéprimées, formant des mélanomes amélanotiques à croissance rapide. La présence de la mutation BRAFV600E dans les cellules A375 les rend très sensibles à l'inhibition de la MEK, ce qui en fait un outil précieux pour étudier les thérapies ciblées dans le traitement du mélanome. Le traitement des cellules A375 avec le vemurafenib, par exemple, s'est avéré améliorer l'induction des molécules MHC de classe I et de classe II, ce qui permet de mieux comprendre les interactions entre les cellules mélanomateuses et le système immunitaire.
Outre leur rôle dans la recherche fondamentale sur le mélanome, les cellules A375 sont utilisées dans le criblage de médicaments et dans l'étude des voies de signalisation impliquées dans la survie, la prolifération et la métastase des cellules cancéreuses. Les cellules A375 ont également été utilisées dans des études sur l'apoptose, et les lignées cellulaires isogéniques A375 et l'introduction de protéines rapporteuses telles que Luc (luc2) permettent d'étudier la fonction des gènes et de surveiller les réponses cellulaires en temps réel. L'aptitude des cellules A375 à servir d'hôte de transfection et leur utilisation dans des lignées cellulaires rapporteuses stables contribuent également à leur polyvalence dans les applications de recherche.
En résumé, la lignée cellulaire humaine de mélanome A375 est un outil essentiel dans l'étude du mélanome humain, offrant un modèle complet pour étudier les mécanismes moléculaires et cellulaires sous-jacents à la progression du mélanome, l'efficacité des agents thérapeutiques et l'interaction entre les cellules cancéreuses et le système immunitaire.

Tissu	Peau
Maladie	Mélanome

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Synonymes

- A 375
- A-375
- A375-MEL
- A375-mel
- A375mel

CLASSIFICATION

Organisme	Humain
Sexe	Femme
Propriétés de croissance	Adepte
Niveau de biosécurité	1

CARACTÉRISTIQUES

Morphologie	De type épithélial
Tumorigène	Oui, sur des souris nues

Caryotype

Les cellules A375 se caractérisent par leur caryotype hypotriploïde, avec un nombre modal de chromosomes de 62, et la présence de neuf chromosomes marqueurs dans chaque cellule, mettant en évidence les altérations génétiques associées au mélanome malin.

Temps de doublement	20 heures

IDENTIFIANTS

Référence

A375 (numéro de catalogue Cytion 300110)

Numéro d'identification fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0132

EXPRESSION ET SENSIBILITÉ

Expression des antigènes

P53 positif

Profil mutationnel

BRAF V600Emut

MANIPULATION ET CULTURE

Milieu de culture

DMEM, w : 4.5 g/L Glucose, w : 4 mM L-Glutamine, w : 3.7 g/L NaHCO3, w : 1.0 mM Pyruvate de sodium (numéro d'article Cytion 820300a)

Atmosphère d'incubation	37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée.

Compléments alimentaires

Compléter le milieu avec 10% de FBS

Réactif de dissociation	Accutase

Repiquage

Retirer l'ancien milieu des cellules adhérentes et les laver avec du PBS dépourvu de calcium et de magnésium. Pour les flacons T25, utiliser 3-5 ml de PBS, et pour les flacons T75, 5-10 ml. Ensuite, recouvrir complètement les cellules avec Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laisser les cellules incuber à température ambiante pendant 8-10 minutes pour les détacher. Après incubation, mélanger délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifuger à 300xg pendant 3 minutes. Jeter le surnageant, remettre les cellules en suspension dans du milieu frais et les transférer dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais.

Densité de semis	1 x 10^4 cellules/cm^2 donnera lieu à une monocouche confluente en 4 jours.
Renouvellement des fluides	2 à 3 fois par semaine
Récupération après le dégel	Après décongélation, ensemencer les cellules à raison de 4 x 10^4 cellules/cm^2 et laisser les cellules se remettre du processus de congélation et adhérer pendant au moins 24 heures.

Décongélation et mise en culture

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTRÔLE QUALITÉ ET CRYOCONSERVATION

Stérilité

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.
Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Milieu de congélation	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation.

Conditions de stockage

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Conditions de livraison

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONATEUR

Âge du donneur	54 ans

ASPECTS JURIDIQUES ET SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lorsque l'on envisage de stocker un cryovial dans l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est obligatoire de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Des gants et des vêtements de protection appropriés sont indispensables, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de sécurité est requise pendant le transfert des échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Ceci afin de réduire le risque de blessures dues à l'explosion potentielle des cryoviaux lors de leur retrait, qui peut entraîner la projection de fragments tranchants.

Garantie

Chez Cytion, nous nous portons garants de la qualité et de la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours après l'expédition de nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche produit
Pour plus de détails, veuillez consulter notre <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default""> Déclaration de garantie

Un accord de transfert de matériel est requis	Yes