Cellules A427

300111

Les cellules A427 proviennent de tissus pulmonaires, en particulier d'un carcinome, présentent une morphologie épithéliale et se développent de manière adhérente. Les cellules A427 ont un temps de doublement d'environ 28 heures dans un milieu RPMI 1640 additionné de 10 % de sérum bovin fœtal (FBS).
Dans le milieu ACL-3, le temps de doublement est légèrement prolongé à 38 heures, tandis que dans le milieu ACL-3 supplémenté en sérum-albumine bovine (BSA), il atteint 42 heures. Ces variations du temps de doublement fournissent des informations précieuses sur le comportement des cellules dans différentes conditions expérimentales.
Au passage 60, les cellules A427 présentent un caryotype hypotriploïde à hypertriploïde. Cela signifie que les cellules possèdent des chromosomes anormaux, y compris des dicentriques, des minutes et un grand marqueur subtélocentrique. De telles anomalies caryotypiques sont souvent associées aux cellules cancéreuses et contribuent aux caractéristiques uniques de cette lignée cellulaire. Les cellules A427 présentent des propriétés tumorigènes qui leur permettent de former des tumeurs lorsqu'elles sont injectées dans des souris nude.
Ces tumeurs ressemblent à des adénocarcinomes indifférenciés, ce qui souligne encore l'intérêt de cette lignée cellulaire pour l'étude du cancer du poumon et de sa progression. Grâce à leurs caractéristiques exceptionnelles, les cellules A427 trouvent leur utilité dans diverses applications, en particulier dans la recherche sur le cancer. Leur morphologie épithéliale et leur origine pulmonaire en font un modèle idéal pour l'étude du cancer du poumon et des maladies associées. En outre, les cellules A427 sont bien adaptées aux techniques de culture cellulaire en 3D, ce qui permet d'explorer le comportement des cellules cancéreuses du poumon dans un environnement physiologiquement plus pertinent.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description

Les cellules A427 proviennent de tissus pulmonaires, en particulier d'un carcinome, présentent une morphologie épithéliale et se développent de manière adhérente. Les cellules A427 ont un temps de doublement d'environ 28 heures dans un milieu RPMI 1640 additionné de 10 % de sérum bovin fœtal (FBS).
Dans le milieu ACL-3, le temps de doublement est légèrement prolongé à 38 heures, tandis que dans le milieu ACL-3 supplémenté en sérum-albumine bovine (BSA), il atteint 42 heures. Ces variations du temps de doublement fournissent des informations précieuses sur le comportement des cellules dans différentes conditions expérimentales.
Au passage 60, les cellules A427 présentent un caryotype hypotriploïde à hypertriploïde. Cela signifie que les cellules possèdent des chromosomes anormaux, y compris des dicentriques, des minutes et un grand marqueur subtélocentrique. De telles anomalies caryotypiques sont souvent associées aux cellules cancéreuses et contribuent aux caractéristiques uniques de cette lignée cellulaire. Les cellules A427 présentent des propriétés tumorigènes qui leur permettent de former des tumeurs lorsqu'elles sont injectées dans des souris nude.
Ces tumeurs ressemblent à des adénocarcinomes indifférenciés, ce qui souligne encore l'intérêt de cette lignée cellulaire pour l'étude du cancer du poumon et de sa progression. Grâce à leurs caractéristiques exceptionnelles, les cellules A427 trouvent leur utilité dans diverses applications, en particulier dans la recherche sur le cancer. Leur morphologie épithéliale et leur origine pulmonaire en font un modèle idéal pour l'étude du cancer du poumon et des maladies associées. En outre, les cellules A427 sont bien adaptées aux techniques de culture cellulaire en 3D, ce qui permet d'explorer le comportement des cellules cancéreuses du poumon dans un environnement physiologiquement plus pertinent.

Tissu	Poumon
Maladie	Carcinome

Synonymes

- A-427
- A427N

CLASSIFICATION

Organisme	Humain
Sexe	Homme
Propriétés de croissance	Adepte

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Niveau de biosécurité	1

CARACTÉRISTIQUES

Morphologie	De type épithélial
Tumorigène	Oui, chez la souris nude. Forme une tumeur indifférenciée évoquant un adénocarcinome.

Caryotype

P60) hypotriploïde à hypertriploïde avec des anomalies incluant des dicentriques, des minutes et un grand marqueur subtélocentrique

IDENTIFIANTS

Référence

A427 (numéro de catalogue Cytion 300111)

Numéro d'identification fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1055

EXPRESSION ET SENSIBILITÉ

Expression des protéines

P53 positif

MANIPULATION ET CULTURE

Milieu de culture

EMEM (MEM Eagle), w : 2 mM L-Glutamine, w : 2.2 g/L NaHCO3, w : EBSS (numéro d'article Cytion 820100a)

Atmosphère d'incubation	37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée.

Compléments alimentaires

Compléter le milieu avec 10 % de FBS et 1 % de NEAA

Réactif de dissociation	Accutase

Repiquage

Retirer l'ancien milieu des cellules adhérentes et les laver avec du PBS dépourvu de calcium et de magnésium. Pour les flacons T25, utiliser 3-5 ml de PBS, et pour les flacons T75, 5-10 ml. Ensuite, recouvrir complètement les cellules avec Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laisser les cellules incuber à température ambiante pendant 8-10 minutes pour les détacher. Après incubation, mélanger délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifuger à 300xg pendant 3 minutes. Jeter le surnageant, remettre les cellules en suspension dans du milieu frais et les transférer dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais.

Densité de semis	1 x 10^4 cellules/cm^2 donnera lieu à une monocouche confluente en 3 jours.
Renouvellement des fluides	2 à 3 fois par semaine
Récupération après le dégel	Après décongélation, ensemencer les cellules à raison de 4 x 10^4 cellules/cm^2 et laisser les cellules se remettre du processus de congélation et adhérer pendant au moins 24 heures.

Décongélation et mise en culture

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTRÔLE QUALITÉ ET CRYOCONSERVATION

Stérilité

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.
Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Milieu de congélation	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation.

Conditions de stockage

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Conditions de livraison

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONATEUR

Âge du donneur	52 ans
Origine ethnique	Caucasien

ASPECTS JURIDIQUES ET SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lorsque l'on envisage de stocker un cryovial dans l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est obligatoire de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Des gants et des vêtements de protection appropriés sont indispensables, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de sécurité est requise pendant le transfert des échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Ceci afin de réduire le risque de blessures dues à l'explosion potentielle des cryoviaux lors de leur retrait, qui peut entraîner la projection de fragments tranchants.

Garantie

Chez Cytion, nous nous portons garants de la qualité et de la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours après l'expédition de nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche produit
Pour plus de détails, veuillez consulter notre <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default""> Déclaration de garantie

Un accord de transfert de matériel est requis	Yes