# Sel A427

300111

Sel A427 berasal dari jaringan paru-paru, khususnya karsinoma, menunjukkan morfologi epitel dan tumbuh melekat. Sel A427 memiliki waktu penggandaan sekitar 28 jam dalam medium RPMI 1640 yang dilengkapi dengan 10% fetal bovine serum (FBS).
Dalam medium ACL-3, waktu penggandaan sedikit diperpanjang hingga 38 jam, sedangkan dalam ACL-3 yang dilengkapi dengan bovine serum albumin (BSA), waktu penggandaan mencapai 42 jam. Variasi waktu penggandaan ini memberikan wawasan yang berharga ke dalam perilaku sel dalam kondisi eksperimental yang berbeda.
Pada bagian 60, sel A427 menampilkan kariotipe hipotriploid hingga hipertriploid. Ini berarti sel memiliki kromosom abnormal, termasuk disentrik, menit, dan penanda subtelosentrik yang besar. Kelainan kariotipe seperti itu sering dikaitkan dengan sel kanker dan berkontribusi pada karakteristik unik dari garis sel ini. Sel A427 menunjukkan sifat tumorigenik, yang memungkinkannya membentuk tumor ketika disuntikkan ke tikus telanjang.
Tumor ini menyerupai adenokarsinoma yang tidak berdiferensiasi, yang semakin menekankan relevansi garis sel ini dalam mempelajari kanker paru-paru dan perkembangannya. Dengan fitur-fiturnya yang luar biasa, sel A427 memiliki kegunaan dalam berbagai aplikasi, terutama dalam penelitian kanker. Morfologi epitel dan asal paru-paru menjadikannya model yang ideal untuk mempelajari kanker paru-paru dan penyakit terkait. Selain itu, sel A427 sangat cocok untuk teknik kultur sel 3D, menyediakan lingkungan yang lebih relevan secara fisiologis untuk mengeksplorasi perilaku sel kanker paru-paru.

## INFORMASI UMUM

### Deskripsi

Sel A427 berasal dari jaringan paru-paru, khususnya karsinoma, menunjukkan morfologi epitel dan tumbuh melekat. Sel A427 memiliki waktu penggandaan sekitar 28 jam dalam medium RPMI 1640 yang dilengkapi dengan 10% fetal bovine serum (FBS).
Dalam medium ACL-3, waktu penggandaan sedikit diperpanjang hingga 38 jam, sedangkan dalam ACL-3 yang dilengkapi dengan bovine serum albumin (BSA), waktu penggandaan mencapai 42 jam. Variasi waktu penggandaan ini memberikan wawasan yang berharga ke dalam perilaku sel dalam kondisi eksperimental yang berbeda.
Pada bagian 60, sel A427 menampilkan kariotipe hipotriploid hingga hipertriploid. Ini berarti sel memiliki kromosom abnormal, termasuk disentrik, menit, dan penanda subtelosentrik yang besar. Kelainan kariotipe seperti itu sering dikaitkan dengan sel kanker dan berkontribusi pada karakteristik unik dari garis sel ini. Sel A427 menunjukkan sifat tumorigenik, yang memungkinkannya membentuk tumor ketika disuntikkan ke tikus telanjang.
Tumor ini menyerupai adenokarsinoma yang tidak berdiferensiasi, yang semakin menekankan relevansi garis sel ini dalam mempelajari kanker paru-paru dan perkembangannya. Dengan fitur-fiturnya yang luar biasa, sel A427 memiliki kegunaan dalam berbagai aplikasi, terutama dalam penelitian kanker. Morfologi epitel dan asal paru-paru menjadikannya model yang ideal untuk mempelajari kanker paru-paru dan penyakit terkait. Selain itu, sel A427 sangat cocok untuk teknik kultur sel 3D, menyediakan lingkungan yang lebih relevan secara fisiologis untuk mengeksplorasi perilaku sel kanker paru-paru.

| | |
|---|---|
| **Tisu** | Paru-paru |
| **Penyakit** | Karsinoma |

### Sinonim

- A-427
- A427N

## KLASIFIKASI

| | |
|---|---|
| **Organisme** | Manusia |
| **Seks** | Laki-laki |
| **Sifat-sifat pertumbuhan** | Pengikut |
| **Tingkat keamanan hayati** | 1 |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

## KARAKTERISTIK

| | |
|---|---|
| **Morfologi** | Seperti epitel |
| **Tumorigenik** | Ya, pada tikus telanjang. Membentuk tumor yang tidak berdiferensiasi yang menyerupai adenokarsinoma. |

**Kariotipe**

P60) hipotriploid hingga hipertriploid dengan kelainan termasuk dikotomis, menit, dan penanda subtelosentris besar

## PENGIDENTIFIKASI

**Referensi**

A427 (Nomor katalog Cytion 300111)

| | |
|---|---|
| **Nomor Identifikasi Pajak NCBI** | 9606 |
| **Cellosaurus** | CVCL_1055 |

## EKSPRESI DAN KERENTANAN

**Ekspresi protein**

P53 positif

## PENANGANAN DAN BUDIDAYA

**Media kultur**

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamine, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (nomor artikel Cytion 820100a)

| | |
|---|---|
| **Suasana inkubasi** | 37°C, 5%CO2, atmosfer yang dilembabkan. |

**Suplemen**

Lengkapi media dengan 10% FBS dan 1% NEAA

| | |
|---|---|
| **Reagen disosiasi** | Accutase |

**Perbanyakan sel**

Buang media lama dari sel yang melekat dan cuci dengan PBS yang tidak mengandung kalsium dan magnesium. Untuk labu T25, gunakan 3-5 ml PBS, dan untuk labu T75, gunakan 5-10 ml. Kemudian, tutupi sel sepenuhnya dengan Accutase, menggunakan 1-2 ml untuk labu T25 dan 2,5 ml untuk labu T75. Biarkan sel diinkubasi pada suhu kamar selama 8-10 menit untuk melepaskannya. Setelah inkubasi, campurkan sel secara perlahan dengan 10 ml medium untuk meresuspensi sel, kemudian sentrifugasi pada 300xg selama 3 menit. Buang supernatan, resuspensi sel dalam medium segar, dan pindahkan ke dalam labu baru yang sudah berisi medium segar.

| | |
|---|---|
| **Kepadatan penanaman** | 1 x $10^4$ sel/$cm^2$ akan menghasilkan lapisan tunggal yang padat dalam waktu 3 hari. |
| **Pergantian cairan** | 2 hingga 3 kali per minggu |
| **Pemulihan pasca-pencairan** | Setelah dicairkan, tanam sel pada kepadatan 4 x $10^4$ sel/$cm^2$ dan biarkan sel pulih dari proses pembekuan serta menempel setidaknya selama 24 jam. |

### Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

### Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran.
Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

| | |
|---|---|
| **Media pembekuan** | Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan media pertumbuhan lengkap (termasuk FBS) + 10% DMSO untuk viabilitas pasca-pencairan yang memadai, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi. |

### Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

### Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

## DONATUR

| | |
|---|---|
| **Usia donor** | 52 tahun |
| **Etnis** | Kaukasia |

## HUKUM DAN KESELAMATAN

### Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

### Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

| | |
|---|---|
| **Diperlukan Perjanjian Transfer Material** | Yes |