# A498 Cellen

300113

A498 cellen zijn een menselijke niercelcarcinoom cellijn afkomstig uit het nierweefsel van een 58-jarige Kaukasische man. Deze cellen worden veel gebruikt in onderzoek naar nierkanker, met name voor het bestuderen van heldercellig niercelcarcinoom, de meest voorkomende vorm van nierkanker bij volwassenen.
De A498 cellijn wordt gekenmerkt door zijn epitheliale morfologie en is een waardevol model voor het onderzoeken van de moleculaire en cellulaire mechanismen van niercarcinogenese. Deze cellen vertonen verschillende kenmerken die typerend zijn voor nierkanker, waaronder veranderingen in de expressie van genen die betrokken zijn bij celcyclusregulatie, apoptose en angiogenese.
A498 cellen zijn vooral nuttig voor het onderzoeken van de metabole routes die bij nierkanker veranderen, omdat ze een duidelijk metabool profiel vertonen dat veranderingen in het vet- en glucosemetabolisme omvat. Dit aspect maakt ze geschikt voor onderzoeken naar metabole targeting, waarbij onderzocht wordt hoe het veranderen van metabole routes tumorgroei kan remmen.
Bovendien worden A498-cellen gebruikt in onderzoeken naar de ontdekking van geneesmiddelen en toxicologie om de werkzaamheid van nieuwe chemotherapeutische middelen en gerichte therapieën te testen. Ze worden ook gebruikt om de reactie van nierkankercellen op hypoxische omstandigheden te bestuderen - een veelvoorkomend kenmerk van vaste tumoren dat het tumorgedrag en de respons op behandelingen aanzienlijk beïnvloedt.
In het algemeen dient de A498 cellijn als een essentieel hulpmiddel in het onderzoek naar nierkanker, waardoor de ontwikkeling van effectievere therapeutische strategieën wordt vergemakkelijkt en ons begrip van de biologie van nierkanker wordt verbeterd.

## ALGEMENE INFORMATIE

### Beschrijving

A498 cellen zijn een menselijke niercelcarcinoom cellijn afkomstig uit het nierweefsel van een 58-jarige Kaukasische man. Deze cellen worden veel gebruikt in onderzoek naar nierkanker, met name voor het bestuderen van heldercellig niercelcarcinoom, de meest voorkomende vorm van nierkanker bij volwassenen.
De A498 cellijn wordt gekenmerkt door zijn epitheliale morfologie en is een waardevol model voor het onderzoeken van de moleculaire en cellulaire mechanismen van niercarcinogenese. Deze cellen vertonen verschillende kenmerken die typerend zijn voor nierkanker, waaronder veranderingen in de expressie van genen die betrokken zijn bij celcyclusregulatie, apoptose en angiogenese.
A498 cellen zijn vooral nuttig voor het onderzoeken van de metabole routes die bij nierkanker veranderen, omdat ze een duidelijk metabool profiel vertonen dat veranderingen in het vet- en glucosemetabolisme omvat. Dit aspect maakt ze geschikt voor onderzoeken naar metabole targeting, waarbij onderzocht wordt hoe het veranderen van metabole routes tumorgroei kan remmen.
Bovendien worden A498-cellen gebruikt in onderzoeken naar de ontdekking van geneesmiddelen en toxicologie om de werkzaamheid van nieuwe chemotherapeutische middelen en gerichte therapieën te testen. Ze worden ook gebruikt om de reactie van nierkankercellen op hypoxische omstandigheden te bestuderen - een veelvoorkomend kenmerk van vaste tumoren dat het tumorgedrag en de respons op behandelingen aanzienlijk beïnvloedt.
In het algemeen dient de A498 cellijn als een essentieel hulpmiddel in het onderzoek naar nierkanker, waardoor de ontwikkeling van effectievere therapeutische strategieën wordt vergemakkelijkt en ons begrip van de biologie van nierkanker wordt verbeterd.

| | |
|---|---|
| **Weefsel** | Nieren |
| **Ziekte** | Niercelcarcinoom |

### Synoniemen

- A-498

## CLASSIFICATIE

| | |
|---|---|
| **Organisme** | Mens |
| **Seks** | Man |
| **Groei-eigenschappen** | Aanhanger |
| **Bioveiligheidsniveau** | 1 |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

## KENMERKEN

| | |
|---|---|
| **Morfologie** | Epitheelachtig |
| **Tumorverwekkend** | Ja, in naakte muizen. Vormt ongedifferentieerd carcinoom, vormt ook tumoren in met antithymocytenserum behandelde pasgeboren muizen |
| **Ploïdie** | Bimodaal, tetraploïd |
| **MSI-status** | Stabiel (MSS) |
| **Verdubbelingstijd** | 62 uur |

## IDENTIFICATIEGEGEVENS

**Bronvermelding**

A498 (Cytion catalogusnummer 300113)

| | |
|---|---|
| **NCBI-belastingnummer** | 9606 |
| **Cellosaurus** | CVCL_1056 |

## EXPRESSIE EN VATBAARHEID

**Iso-enzymen**

PGM3, 1, PGM1, 1-2, ES-D, 2, Me-2, 1, AK-1, 1, GLO-1, 2, G6PD, B

## BEHANDELING EN KWEEK

**Kweekmedium**

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamine, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytion artikelnummer 820100a)

| | |
|---|---|
| **Incubatieomgeving** | 37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer. |

**Supplementen**

Vul het medium aan met 10% FBS en 1% NEAA

| | |
|---|---|
| **Dissociatiereagens** | Accutase |

**Heruitplanten**

Verwijder het oude medium van de adherente cellen en was ze met PBS zonder calcium en magnesium. Gebruik voor T25-flesjes 3-5 ml PBS en voor T75-flesjes 5-10 ml. Bedek de cellen vervolgens volledig met Accutase, met 1-2 ml voor T25-flesjes en 2,5 ml voor T75-flesjes. Laat de cellen gedurende 8-10 minuten bij kamertemperatuur incuberen om ze los te maken. Na incubatie de cellen voorzichtig mengen met 10 ml medium om ze te resuspenderen en vervolgens centrifugeren bij 300xg gedurende 3 minuten. Gooi het supernatant weg, resuspendeer de cellen in vers medium en breng ze over in nieuwe kolven die al vers medium bevatten.

| | |
|---|---|
| **Zaaidichtheid** | 1 x $10^4$ cellen/$cm^2$ resulteert binnen 4 dagen in een confluente monolaag. |
| **Vloeistofverversing** | Om de 3 dagen |
| **Herstel na ontdooiing** | Na ontdooien, de cellen op een plaat aanbrengen met een dichtheid van 2 x $10^4$ cellen/$cm^2$ en de cellen minstens 24 tot 48 uur laten herstellen van het invriesproces en zich hechten. |

### Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

### Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

| | |
|---|---|
| **Kweekmedium invriezen** | Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen. |

### Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

### Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

## DONATEUR

| | |
|---|---|
| **Leeftijd van de donor** | 52 jaar |
| **Etnische afkomst** | Kaukasisch |

## JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

### Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

### Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

| | |
|---|---|
| **Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist** | Yes |