Células A498

300113

As células A498 são uma linhagem celular de carcinoma de células renais humanas derivada do tecido renal de um homem caucasiano de 58 anos. Essas células são amplamente utilizadas em pesquisas relacionadas ao câncer de rim, particularmente para o estudo do carcinoma de células claras, que é o tipo mais comum de câncer de rim em adultos.
A linhagem celular A498 é caracterizada por sua morfologia de tipo epitelial e tem sido um modelo valioso para a investigação dos mecanismos moleculares e celulares da carcinogênese renal. Essas células apresentam várias características típicas do câncer renal, incluindo alterações na expressão de genes envolvidos na regulação do ciclo celular, na apoptose e na angiogênese.
As células A498 são particularmente úteis para examinar as vias metabólicas alteradas no câncer renal, pois apresentam um perfil metabólico distinto que inclui alterações no metabolismo lipídico e da glicose. Esse aspecto as torna adequadas para estudos de alvos metabólicos, que exploram como a alteração das vias metabólicas pode inibir o crescimento tumoral.
Além disso, as células A498 são empregadas em estudos de descoberta de medicamentos e toxicologia para testar a eficácia de novos agentes quimioterápicos e terapias direcionadas. Elas também são utilizadas para estudar a resposta das células cancerosas renais a condições hipóxicas — uma característica comum dos tumores sólidos que influencia significativamente o comportamento tumoral e a resposta ao tratamento.
De modo geral, a linhagem celular A498 serve como uma ferramenta essencial na pesquisa do câncer renal, facilitando o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes e aprofundando nossa compreensão da biologia do câncer renal.

GENERAL INFORMATION

Description

As células A498 são uma linhagem celular de carcinoma de células renais humanas derivada do tecido renal de um homem caucasiano de 58 anos. Essas células são amplamente utilizadas em pesquisas relacionadas ao câncer de rim, particularmente para o estudo do carcinoma de células claras, que é o tipo mais comum de câncer de rim em adultos.
A linhagem celular A498 é caracterizada por sua morfologia de tipo epitelial e tem sido um modelo valioso para a investigação dos mecanismos moleculares e celulares da carcinogênese renal. Essas células apresentam várias características típicas do câncer renal, incluindo alterações na expressão de genes envolvidos na regulação do ciclo celular, na apoptose e na angiogênese.
As células A498 são particularmente úteis para examinar as vias metabólicas alteradas no câncer renal, pois apresentam um perfil metabólico distinto que inclui alterações no metabolismo lipídico e da glicose. Esse aspecto as torna adequadas para estudos de alvos metabólicos, que exploram como a alteração das vias metabólicas pode inibir o crescimento tumoral.
Além disso, as células A498 são empregadas em estudos de descoberta de medicamentos e toxicologia para testar a eficácia de novos agentes quimioterápicos e terapias direcionadas. Elas também são utilizadas para estudar a resposta das células cancerosas renais a condições hipóxicas — uma característica comum dos tumores sólidos que influencia significativamente o comportamento tumoral e a resposta ao tratamento.
De modo geral, a linhagem celular A498 serve como uma ferramenta essencial na pesquisa do câncer renal, facilitando o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes e aprofundando nossa compreensão da biologia do câncer renal.

Tissue	Rim
Disease	Carcinoma de células renais

Synonyms

- A-498

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

CHARACTERISTICS

Morphology	De tipo epitelial
Tumourigenic	Sim, em camundongos nude. Provoca carcinoma indiferenciado e também forma tumores em camundongos recém-nascidos tratados com soro anti-timócito.
Ploidy status	Bimodal, tetraplóide
MSI status	Estável (MSS)
Doubling time	62 horas

IDENTIFIERS

Citation

A498 (número de catálogo da Cytion 300113)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1056

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Isoenzymes

PGM3, 1, PGM1, 1-2, ES-D, 2, Me-2, 1, AK-1, 1, GLO-1, 2, G6PD, B

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

EMEM (MEM Eagle), contendo: 2 mM de L-glutamina, contendo: 2,2 g/L de $NaHCO_3$, contendo: EBSS (número de artigo da Cytion 820100a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5% de CO_2, atmosfera umidificada.

Supplements

Adicione ao meio 10% de FBS e 1% de NEAA

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Remova o meio antigo das células aderentes e lave-as com PBS sem cálcio nem magnésio. Para frascos T25, use 3 a 5 ml de PBS; para frascos T75, use 5 a 10 ml. Em seguida, cubra as células completamente com Accutase, utilizando 1 a 2 ml para frascos T25 e 2,5 ml para frascos T75. Deixe as células incubarem à temperatura ambiente por 8 a 10 minutos para que se desprendam. Após a incubação, misture delicadamente as células com 10 ml de meio para ressuspender, depois centrifugue a 300xg por 3 minutos. Descarte o sobrenadante, ressuspenda as células em meio fresco e transfira-as para novos frascos que já contenham meio fresco.

Seeding density	1 x 10^4 células/cm^2 resultará em uma monocamada confluente em 4 dias.
Fluid renewal	A cada 3 dias
Post-thaw recovery	Após o descongelamento, semeie as células a uma densidade de 2 x 10^4 células/cm^2 e deixe que elas se recuperem do processo de congelamento e se adiram por pelo menos 24 a 48 horas.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

A contaminação por micoplasma é descartada por meio de ensaios baseados em PCR e de métodos de detecção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não haja contaminação por bactérias, fungos ou leveduras, as culturas celulares são submetidas a inspeções visuais diárias.

Freeze medium	Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% de DMSO para garantir viabilidade adequada após o descongelamento, ou CM-1 (número de catálogo da Cytion 800100), que inclui osmoprotetores e estabilizadores metabólicos otimizados para melhorar a recuperação e reduzir o estresse induzido pela criopreservação.

Storage conditions

Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido.

Shipping conditions

As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado.

DONOR

Donor age	52 anos
Ethnicity	caucasiano

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Ao planejar o armazenamento de um criotubo em nitrogênio líquido para descongelamento futuro, é obrigatório seguir medidas de segurança rigorosas. É essencial o uso de luvas e roupas de proteção adequadas, além do uso obrigatório de máscara facial ou óculos de proteção durante a transferência de amostras congeladas para dentro ou para fora do tanque de nitrogênio líquido. Isso visa mitigar o risco de ferimentos decorrentes de possíveis explosões dos criotubos durante a remoção, o que pode resultar na projeção de fragmentos pontiagudos.

Warranty

Na Cytion, garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células permanecerão viáveis no início da cultura por
60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no
Certificado de Análise e/ou na Ficha Técnica do Produto.
Para obter todos os detalhes, consulte nossa
Declaração de Garantia.

Material Transfer Agreement required	Yes