Cellules A549

300114

Les cellules A549, dérivées de tissus d'adénocarcinome pulmonaire, sont un modèle primaire utilisé dans la recherche sur le cancer, en particulier dans les laboratoires biomédicaux qui se concentrent sur les cancers liés au poumon. Les cellules A549 sont couramment utilisées comme modèle in vitro pour étudier la biologie du cancer du poumon, le dépistage des médicaments et les effets des composés toxiques.
Dans la recherche toxicologique, les cellules A549 offrent un modèle expérimental contrôlé qui permet aux scientifiques d'explorer les mécanismes qui sous-tendent les effets toxiques et les réponses cellulaires. En comprenant ces mécanismes, les chercheurs peuvent mieux évaluer la sécurité des substances et potentiellement atténuer leurs effets nocifs.
Les cellules de carcinome A549 ont été largement utilisées comme modèle in vitro pour étudier la pathogenèse du cancer du poumon et comme modèle alternatif de culture de tissus pour diverses études de recherche liées aux poumons dans les laboratoires biomédicaux. Ces cellules conservent les caractéristiques des cellules épithéliales alvéolaires de type II et sont utilisées pour examiner les réponses épithéliales à diverses infections et stimuli inflammatoires, y compris l'inflammation pulmonaire.
En outre, la lignée cellulaire humaine A549 est un outil précieux pour le développement d'anticorps spécifiques ciblant des protéines ou des marqueurs liés au cancer du poumon. En exposant ces cellules à des substances d'intérêt, les chercheurs peuvent étudier comment elles affectent la viabilité cellulaire, la prolifération, l'apoptose et d'autres processus cellulaires. Ces informations permettent d'identifier des cibles thérapeutiques potentielles et de développer de nouveaux traitements pour le cancer du poumon.
En résumé, les cellules de carcinome A549 jouent un rôle essentiel dans la recherche sur le cancer, en particulier sur les cancers du poumon, en servant de modèle in vitro pour la recherche sur le cancer et la toxicologie, le développement de traitements efficaces et le criblage de médicaments.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description

Les cellules A549, dérivées de tissus d'adénocarcinome pulmonaire, sont un modèle primaire utilisé dans la recherche sur le cancer, en particulier dans les laboratoires biomédicaux qui se concentrent sur les cancers liés au poumon. Les cellules A549 sont couramment utilisées comme modèle in vitro pour étudier la biologie du cancer du poumon, le dépistage des médicaments et les effets des composés toxiques.
Dans la recherche toxicologique, les cellules A549 offrent un modèle expérimental contrôlé qui permet aux scientifiques d'explorer les mécanismes qui sous-tendent les effets toxiques et les réponses cellulaires. En comprenant ces mécanismes, les chercheurs peuvent mieux évaluer la sécurité des substances et potentiellement atténuer leurs effets nocifs.
Les cellules de carcinome A549 ont été largement utilisées comme modèle in vitro pour étudier la pathogenèse du cancer du poumon et comme modèle alternatif de culture de tissus pour diverses études de recherche liées aux poumons dans les laboratoires biomédicaux. Ces cellules conservent les caractéristiques des cellules épithéliales alvéolaires de type II et sont utilisées pour examiner les réponses épithéliales à diverses infections et stimuli inflammatoires, y compris l'inflammation pulmonaire.
En outre, la lignée cellulaire humaine A549 est un outil précieux pour le développement d'anticorps spécifiques ciblant des protéines ou des marqueurs liés au cancer du poumon. En exposant ces cellules à des substances d'intérêt, les chercheurs peuvent étudier comment elles affectent la viabilité cellulaire, la prolifération, l'apoptose et d'autres processus cellulaires. Ces informations permettent d'identifier des cibles thérapeutiques potentielles et de développer de nouveaux traitements pour le cancer du poumon.
En résumé, les cellules de carcinome A549 jouent un rôle essentiel dans la recherche sur le cancer, en particulier sur les cancers du poumon, en servant de modèle in vitro pour la recherche sur le cancer et la toxicologie, le développement de traitements efficaces et le criblage de médicaments.

Tissu	Poumon
Maladie	Carcinome

Synonymes

- A 549
- A-549
- NCI-A549
- hA54

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

CLASSIFICATION

Organisme	Humain
Sexe	Homme
Propriétés de croissance	Adepte
Niveau de biosécurité	1

CARACTÉRISTIQUES

Morphologie	De type épithélial

Caryotype

Les cellules A549 ont un nombre modal de chromosomes n2, certaines cellules ayant 64 chromosomes.

Temps de doublement	28 heures

IDENTIFIANTS

Référence

A549 (numéro de catalogue Cytion 300114)

Numéro d'identification fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0023

EXPRESSION ET SENSIBILITÉ

Expression des protéines

P53 positif

Isoenzymes

G6PD, type B

Transcriptase inverse	Négatif

MANIPULATION ET CULTURE

Milieu de culture

DMEM:Ham's F12 (1:1), w : 3.1 g/L Glucose, w : 2.5 mM L-Glutamine, w : 15 mM HEPES, w : 0.5 mM Sodium pyruvate, w : 1.2 g/L NaHCO3 (numéro d'article Cytion 820400a)

Atmosphère d'incubation	37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée.

Compléments alimentaires

Compléter le milieu avec 10% de FBS

Réactif de dissociation	Accutase

Repiquage

Retirer l'ancien milieu des cellules adhérentes et les laver avec du PBS dépourvu de calcium et de magnésium. Pour les flacons T25, utiliser 3-5 ml de PBS, et pour les flacons T75, 5-10 ml. Ensuite, recouvrir complètement les cellules avec Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laisser les cellules incuber à température ambiante pendant 8-10 minutes pour les détacher. Après incubation, mélanger délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifuger à 300xg pendant 3 minutes. Jeter le surnageant, remettre les cellules en suspension dans du milieu frais et les transférer dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais.

Densité de semis	1 x 10^4 cellules/cm^2
Renouvellement des fluides	2 à 3 fois par semaine
Récupération après le dégel	Après décongélation, ensemencer les cellules à raison de 5 x 10^4 cellules/cm^2 et laisser les cellules se remettre du processus de congélation et adhérer pendant au moins 24 heures.

Décongélation et mise en culture

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTRÔLE QUALITÉ ET CRYOCONSERVATION

Stérilité

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.
Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Milieu de congélation	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation.

Conditions de stockage

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Conditions de livraison

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONATEUR

Âge du donneur	58 ans
Origine ethnique	Caucasien

ASPECTS JURIDIQUES ET SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lorsque l'on envisage de stocker un cryovial dans l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est obligatoire de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Des gants et des vêtements de protection appropriés sont indispensables, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de sécurité est requise pendant le transfert des échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Ceci afin de réduire le risque de blessures dues à l'explosion potentielle des cryoviaux lors de leur retrait, qui peut entraîner la projection de fragments tranchants.

Garantie

Chez Cytion, nous nous portons garants de la qualité et de la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours après l'expédition de nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche produit
Pour plus de détails, veuillez consulter notre <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default""> Déclaration de garantie

Un accord de transfert de matériel est requis	Yes