A549-celler

300114

A549-celler, som härrör från lungadenokarcinomvävnad, är en primär modell som används inom cancerforskning, särskilt i biomedicinska laboratorier som fokuserar på lungrelaterade cancerformer. A549-celler används ofta som en in vitro-modell för att studera lungcancerbiologi, läkemedelsscreening och effekterna av toxiska föreningar.
Inom toxikologisk forskning erbjuder A549-celler en kontrollerad experimentell modell som gör det möjligt för forskare att utforska de mekanismer som ligger bakom toxiska effekter och cellulära reaktioner. Genom att förstå dessa mekanismer kan forskarna bättre bedöma säkerheten hos ämnen och potentiellt mildra deras skadliga effekter.
A549 carcinomceller har använts flitigt som in vitro-modell för att studera patogenesen vid lungcancer och som en alternativ vävnadskulturmodell för olika lungrelaterade forskningsstudier i biomedicinska laboratorier. Dessa celler har samma egenskaper som alveolära epitelceller av typ II och används för att undersöka epitelets respons på olika infektioner och inflammatoriska stimuli, inklusive lunginflammation.
Den humana cellinjen A549 är dessutom ett värdefullt verktyg för utveckling av specifika antikroppar riktade mot lungcancerrelaterade proteiner eller markörer. Genom att exponera dessa celler för intressanta substanser kan forskarna undersöka hur de påverkar cellernas livskraft, proliferation, apoptos och andra cellulära processer. Denna information underlättar identifieringen av potentiella terapeutiska mål och utvecklingen av nya behandlingar för lungcancer.
Sammanfattningsvis är A549 carcinomceller centrala inom cancerforskningen, särskilt när det gäller lungrelaterade cancerformer, och fungerar som en in vitro-modell för cancer- och toxikologiforskning, utveckling av effektiva behandlingar och läkemedelsscreening.

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

A549-celler, som härrör från lungadenokarcinomvävnad, är en primär modell som används inom cancerforskning, särskilt i biomedicinska laboratorier som fokuserar på lungrelaterade cancerformer. A549-celler används ofta som en in vitro-modell för att studera lungcancerbiologi, läkemedelsscreening och effekterna av toxiska föreningar.
Inom toxikologisk forskning erbjuder A549-celler en kontrollerad experimentell modell som gör det möjligt för forskare att utforska de mekanismer som ligger bakom toxiska effekter och cellulära reaktioner. Genom att förstå dessa mekanismer kan forskarna bättre bedöma säkerheten hos ämnen och potentiellt mildra deras skadliga effekter.
A549 carcinomceller har använts flitigt som in vitro-modell för att studera patogenesen vid lungcancer och som en alternativ vävnadskulturmodell för olika lungrelaterade forskningsstudier i biomedicinska laboratorier. Dessa celler har samma egenskaper som alveolära epitelceller av typ II och används för att undersöka epitelets respons på olika infektioner och inflammatoriska stimuli, inklusive lunginflammation.
Den humana cellinjen A549 är dessutom ett värdefullt verktyg för utveckling av specifika antikroppar riktade mot lungcancerrelaterade proteiner eller markörer. Genom att exponera dessa celler för intressanta substanser kan forskarna undersöka hur de påverkar cellernas livskraft, proliferation, apoptos och andra cellulära processer. Denna information underlättar identifieringen av potentiella terapeutiska mål och utvecklingen av nya behandlingar för lungcancer.
Sammanfattningsvis är A549 carcinomceller centrala inom cancerforskningen, särskilt när det gäller lungrelaterade cancerformer, och fungerar som en in vitro-modell för cancer- och toxikologiforskning, utveckling av effektiva behandlingar och läkemedelsscreening.

Vävnad	Lungan
Sjukdom	Carcinom

Synonymer

- A 549
- A-549
- NCI-A549
- hA54

KLASSIFICERING

Organism	Människa
Kön	Man

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Tillväxtegenskaper	Följsam
Biosäkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Epitelliknande

Karyotyp

A549-celler har det modala kromosomantalet n2, med vissa celler med 64 kromosomer.

Fördubblingstid	28 timmar

IDENTIFIERARE

Källa

A549 (Cytion katalognummer 300114)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_0023

UTTRYCK OCH MOTTAGLIGHET

Proteinexpression

P53-positiv

Isoenzymer

G6PD, typ B

Omvänt transkriptas	Negativt

HANTERING OCH ODLING

Odlingsmedium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L glukos, w: 2,5 mM L-glutamin, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM natriumpyruvat, w: 1,2 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820400a)

Inkubationsatmosfär	37°C, 5%CO2, befuktad atmosfär.

Kosttillskott

Komplettera mediet med 10% FBS

Dissociationsmedel	Accutase

Vidareodling

Ta bort det gamla mediet från de adherenta cellerna och tvätta dem med PBS som saknar kalcium och magnesium. Använd 3-5 ml PBS för T25-kolvar och 5-10 ml för T75-kolvar. Täck sedan cellerna helt med Accutase, använd 1-2 ml för T25-kolvar och 2,5 ml för T75-kolvar. Låt cellerna inkubera i rumstemperatur i 8-10 minuter så att de lossnar. Efter inkubationen, blanda cellerna försiktigt med 10 ml medium för att resuspendera dem och centrifugera sedan vid 300xg i 3 minuter. Kassera supernatanten, resuspendera cellerna i färskt medium och överför dem till nya kolvar som redan innehåller färskt medium.

Såtäthet	1 x 10^4 celler/cm^2
Vätskeförnyelse	2 till 3 gånger per vecka
Återhämtning efter upptining	Efter upptining, plattlägg cellerna med 5 x 10^4 celler/cm^2 och låt cellerna återhämta sig från frysprocessen och fästa i minst 24 timmar.

Upptining och odling

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OCH KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik. För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner.

Frysmedel	Som kryokonserveringsmedium använder vi komplett tillväxtmedium (inklusive FBS) + 10% DMSO för adekvat viabilitet efter upptining, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress.

Förvaringsförhållanden

För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve.

Leveransvillkor

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

DONATOR

Donatorns ålder	58 år
Etnicitet	Kaukasisk

JURIDISKA FRÅGOR OCH SÄKERHET

Säkerhetsföreskrifter

När man planerar att förvara en kryovial i flytande kväve för framtida upptining är det obligatoriskt att följa strikta säkerhetsåtgärder. Lämpliga skyddshandskar och skyddskläder är nödvändiga, och ansiktsmask eller skyddsglasögon måste användas vid överföring av frysta prover till eller från tanken med flytande kväve. Detta för att minska risken för skador på grund av eventuella explosioner i frysbehållaren vid borttagning, vilket kan leda till att vassa fragment projiceras.

Garanti

På Cytion står vi bakom våra produkters kvalitet och livskraft.
Vi garanterar att våra celler är livsdugliga vid odlingens början i 60 dagar efter leverans från våra anläggningar.
Vi försäkrar att allt material överensstämmer med de specifikationer som beskrivs i analyscertifikatet och/eller produktbladet
För fullständig information, se vår <a href="”/Who-we-are/Warranty/” hreflang=”x-default”>Garantiförklaring

Avtal om materialöverföring krävs	Yes