MOLT-4 rakud

300115

MOLT-4 on T-lümfoblastide rakuliin, mis on saadud 1971. aastal retsidiivse ägeda lümfoblastse leukeemiaga (ALL) 19-aastase meessoost patsiendi perifeersest verest. See on MOLT-3 sõsarrakkude liin, samas kui MOLT-4 näitab ebatavalist T-rakkude antigeeni retseptori gammaahela geeni (T-gamma) ümberpaiknemist. MOLT-4 rakkude kahekordistumisaeg on umbes 30 tundi, nad kasvavad suspensioonis ja on tuumorigeensed töötlemata alasti hiirtel, lümfotsüüdivastase seerumiga töödeldud hiirtel ja x-kiiritatud hiirtel.
MOLT-4 rakkudel on hüpertetraploidne kromosoomide arv, mille modaalne kromosoomide arv 95 esineb 24%-l rakkudest, kuid neil esineb stabiilseid ja korduvaid kromosoomide struktuurilisi kõrvalekaldeid ja pikemaid telomeeride pikkusi. MOLT-4 ekspresseerib mitmeid T-rakkude markereid, sealhulgas CD1, CD2, CD3A, CD3B, CD3C, CD4, CD5, CD6 ja CD7. Samuti ekspresseerivad nad suurel määral terminaalset desoksünukleotidüültransferaasi (TdT).
MOLT-4 rakuliin ei tooda immunoglobuliini ega Epstein-Barri viirust. Patsient, kellelt rakud saadi, oli eelnevalt saanud multiresistentset keemiaravi. P53 geeni koodonis 248 on G -> A mutatsioon ja P53 ei ekspresseeru. Algselt oli liin saastunud mükoplasmaga, kuid on vahepeal antibiootikumidega ravitud.

ÜLDINE TEAVE

Kirjeldus

MOLT-4 on T-lümfoblastide rakuliin, mis on saadud 1971. aastal retsidiivse ägeda lümfoblastse leukeemiaga (ALL) 19-aastase meessoost patsiendi perifeersest verest. See on MOLT-3 sõsarrakkude liin, samas kui MOLT-4 näitab ebatavalist T-rakkude antigeeni retseptori gammaahela geeni (T-gamma) ümberpaiknemist. MOLT-4 rakkude kahekordistumisaeg on umbes 30 tundi, nad kasvavad suspensioonis ja on tuumorigeensed töötlemata alasti hiirtel, lümfotsüüdivastase seerumiga töödeldud hiirtel ja x-kiiritatud hiirtel.
MOLT-4 rakkudel on hüpertetraploidne kromosoomide arv, mille modaalne kromosoomide arv 95 esineb 24%-l rakkudest, kuid neil esineb stabiilseid ja korduvaid kromosoomide struktuurilisi kõrvalekaldeid ja pikemaid telomeeride pikkusi. MOLT-4 ekspresseerib mitmeid T-rakkude markereid, sealhulgas CD1, CD2, CD3A, CD3B, CD3C, CD4, CD5, CD6 ja CD7. Samuti ekspresseerivad nad suurel määral terminaalset desoksünukleotidüültransferaasi (TdT).
MOLT-4 rakuliin ei tooda immunoglobuliini ega Epstein-Barri viirust. Patsient, kellelt rakud saadi, oli eelnevalt saanud multiresistentset keemiaravi. P53 geeni koodonis 248 on G -> A mutatsioon ja P53 ei ekspresseeru. Algselt oli liin saastunud mükoplasmaga, kuid on vahepeal antibiootikumidega ravitud.

Kude	Perifeerne veri
Haigus	Täiskasvanute T-akuutne lümfoblastileukeemia

Sünonüümid

- Molt-4
- MOLT 4
- Molt 4
- MOLT.4
- MOLT4
- Molt4
- GM02219
- GM02219C
- GM2219C
- GM02219D

KLASSIFIKATSIOON

Organism	Inimene
Sugu	Mees
Kasvuvõime	Vedrustus
Bioloogilise ohutuse tase	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

OMADUSED

Morfoloogia	Ümmargused rakud
Rakutüüp	T-lümfotsüüt

Karyotüüp

Hüpertetraploidne. Modaalnumber: 96. Kaks x- ja kaks Y-kromosoomi.

TUNNUSED

Viide

MOLT-4 (Cytioni kataloginumber 300115)

NCBI maksukood	9606
Cellosaurus	CVCL_0013

AVALDUMINE JA VASTUVÕTLIKKUS

Valgu ekspressioon

P53 positiivne

Antigeeni ekspressioon

CD1 (49%), CD2 (35%), CD3 A (26%) B (33%) C (34%), CD4 (55%), CD5 (72%), CD6 (22%), CD7 (77%)

Mutatsiooniprofiil

G -> A mutatsioon p53 geeni koodonis 248, P53 ei ekspresseeru (Rodrigues, 1990).

Viirused

Rakud ei tooda immunoglobuliini ega Epstein-Barri viirust (Minowada, 1972).

Tooted

Tekib suures koguses terminaalset desoksünukleotidüültransferaasi (TdT)

KÄSITLEMINE JA KASVATAMINE

Kasvatuskeskkond

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilne glutamiin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytioni artikli number 820700a)

Inkubatsiooni keskkond	37°C, 5%CO2, niisutatud atmosfäär.

Toidulisandid

Täiendada söötme 10% FBS-ga

Kultuuri edasikasvatamine

Säilitage kultuure, lisades või asendades perioodiliselt kasvukeskkonda. Alustage kultuuride kasvatamist tihedusega 5 x 10^5 rakku/ml ja hoidke rakkude kontsentratsioon vahemikus 3 x 10^5 kuni 1 x 10^6 rakku/ml optimaalse kasvu tagamiseks.

Külvitihedus	1 x 10^5 rakku/cm^2
Vedeliku vahetus	2 kuni 3 korda nädalas
Taastumine pärast sulamist	24 kuni 48 tundi

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Sulatamine ja kasvatamine

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITEEDIKONTROLL JA KRÜOKONSERVEERIMINE

Viljatus

Mükoplasmakontaminatsioon on välistatud nii PCR-põhiste analüüside kui ka luminestsentsil põhinevate mükoplasma tuvastamise meetodite abil.
Bakteriaalse, seene- või pärmsaaste puudumise tagamiseks kontrollitakse rakukultuure iga päev visuaalselt.

Külmutuskeskkond	Krüosäilitusvedelikusena kasutame täielikku kasvukeskkonda (sh FBS) + 10% DMSO, et tagada piisav elujõulisus pärast sulatamist, või CM-1 (Cytioni katalooginumber 800100), mis sisaldab optimeeritud osmoprotektante ja metaboolseid stabilisaatoreid, et parandada taastumist ja vähendada krüostressi.

Säilitamistingimused

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

Tarne- ja kohaletoimetamistingimused

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78 °C. Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige viaalid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

ANNETAJA

Doonori vanus	19 aastat
Etniline kuuluvus	Kaukaasia

ÕIGUSLIKUD JA OHUTUSALASED KÜSIMUSED

Ohutusnõuded

Kui plaanitakse krüoviaalide säilitamist vedelas lämmastikus tulevase sulatamise eesmärgil, on kohustuslik järgida rangeid ohutusmeetmeid. Asjakohased kaitsekindad ja -riietus on hädavajalikud ning külmutatud proovide vedela lämmastiku mahutisse või mahutist väljaviimisel tuleb kasutada näomaski või kaitseprille. See on vajalik selleks, et vähendada vigastuste ohtu, mis tuleneb võimalikest krüoviaalide plahvatustest eemaldamisel, mille tagajärjel võivad välja paiskuda teravad killud.

Garantii

Cytion seisab oma toodete kvaliteedi ja elujõulisuse eest.
Me garanteerime, et meie rakud on elujõulised kasvatamise alguses 60 päeva jooksul pärast meie rajatistest saatmist.
Tagame, et kõik materjalid vastavad analüüsisertifikaadis ja/või tootelehel kirjeldatud spetsifikatsioonidele
Täielikke üksikasju leiate meie <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Tagatise avaldusest

Vajalik on materjalide üleandmise leping	Yes