MOLT-4 ląstelės

300115

MOLT-4 yra T limfoblastų ląstelių linija, gauta iš 19 metų vyro, sergančio ūmine limfoblastine leukemija (ŪLL), kurios recidyvas įvyko 1971 m., periferinio kraujo. Tai MOLT-3 gimininga ląstelių linija, o MOLT-4 pasižymi neįprastu T ląstelių antigeno receptoriaus gama grandinės geno (T-gama) pertvarkymu. MOLT-4 ląstelių padvigubėjimo laikas yra apie 30 valandų, jos auga suspensijoje ir yra navikinės neapdorotose nuogose pelėse, antilimfocitų serumu apdorotose pelėse ir rentgeno spinduliuote apšvitintose pelėse.
MOLT-4 ląstelės turi hipertetraploidinį chromosomų skaičių, o modalinis chromosomų skaičius 95 pasitaiko 24 % ląstelių, tačiau joms būdingi stabilūs ir pasikartojantys struktūriniai chromosomų pakitimai ir ilgesnis telomerų ilgis. MOLT-4 išreiškia įvairius T ląstelių žymenis, įskaitant CD1, CD2, CD3A, CD3B, CD3C, CD4, CD5, CD6 ir CD7. Jie taip pat išreiškia didelį kiekį terminalinės deoksinukleotidiltransferazės (TdT).
MOLT-4 ląstelių linija negamina imunoglobulino ir Epšteino-Barro viruso. Pacientui, iš kurio buvo gautos ląstelės, prieš tai buvo taikyta chemoterapija daugeliu vaistų. P53 geno 248 kodone yra G -> A mutacija, ir P53 nėra išreikštas. Iš pradžių linija buvo užkrėsta mikoplazma, bet vėliau buvo išgydyta antibiotikais.

BENDRA INFORMACIJA

Aprašymas

MOLT-4 yra T limfoblastų ląstelių linija, gauta iš 19 metų vyro, sergančio ūmine limfoblastine leukemija (ŪLL), kurios recidyvas įvyko 1971 m., periferinio kraujo. Tai MOLT-3 gimininga ląstelių linija, o MOLT-4 pasižymi neįprastu T ląstelių antigeno receptoriaus gama grandinės geno (T-gama) pertvarkymu. MOLT-4 ląstelių padvigubėjimo laikas yra apie 30 valandų, jos auga suspensijoje ir yra navikinės neapdorotose nuogose pelėse, antilimfocitų serumu apdorotose pelėse ir rentgeno spinduliuote apšvitintose pelėse.
MOLT-4 ląstelės turi hipertetraploidinį chromosomų skaičių, o modalinis chromosomų skaičius 95 pasitaiko 24 % ląstelių, tačiau joms būdingi stabilūs ir pasikartojantys struktūriniai chromosomų pakitimai ir ilgesnis telomerų ilgis. MOLT-4 išreiškia įvairius T ląstelių žymenis, įskaitant CD1, CD2, CD3A, CD3B, CD3C, CD4, CD5, CD6 ir CD7. Jie taip pat išreiškia didelį kiekį terminalinės deoksinukleotidiltransferazės (TdT).
MOLT-4 ląstelių linija negamina imunoglobulino ir Epšteino-Barro viruso. Pacientui, iš kurio buvo gautos ląstelės, prieš tai buvo taikyta chemoterapija daugeliu vaistų. P53 geno 248 kodone yra G -> A mutacija, ir P53 nėra išreikštas. Iš pradžių linija buvo užkrėsta mikoplazma, bet vėliau buvo išgydyta antibiotikais.

Audinys	Periferinis kraujas
Liga	Suaugusiųjų T ūminė limfoblastinė leukemija

Sinonimai

- Molt-4
- MOLT 4
- Molt 4
- MOLT.4
- MOLT4
- Molt4
- GM02219
- GM02219C
- GM2219C
- GM02219D

KLASIFIKACIJA

Organizmas	Žmogus
Seksas	Vyras
Augimo savybės	Pakaba
Biologinio saugumo lygis	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

CHARAKTERISTIKOS

Morfologija	Apvalios ląstelės
Ląstelių tipas	T limfocitas

Kariotipas

Hipertetraploidai. Modalinis numeris: 96. Dvi x ir dvi Y chromosomos.

IDENTIFIKATORIAI

Nuoroda

MOLT-4 (Cytion katalogo numeris 300115)

NCBI mokesčių identifikavimo kodas	9606
Cellosaurus	CVCL_0013

IŠRAIŠKA IR JAUTRUMAS

Baltojų baltymų ekspresija

P53 teigiamas

Antigeno ekspresija

CD1 (49 %), CD2 (35 %), CD3 A (26 %) B (33 %) C (34 %), CD4 (55 %), CD5 (72 %), CD6 (22 %), CD7 (77 %)

Mutacijų profilis

G -> A mutacija p53 geno 248 kodone, P53 nėra išreikštas (Rodrigues, 1990).

Virusai

Ląstelės negamina imunoglobulino ir Epšteino-Barro viruso (Minowada, 1972).

Produktai

Susidaro didelis kiekis terminalinės deoksinukleotidiltransferazės (TdT)

LAIKYMAS IR AUGINIMAS

Maitinamoji terpė

RPMI 1640, š: 2,0 mM stabilus glutaminas, š: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion gaminio numeris 820700a)

Inkubacijos aplinka	37 °C, 5 %CO2, drėkintoje atmosferoje.

Maisto papildai

Papildykite terpę 10 % FBS

Subkultūrinis auginimas

Kultūras prižiūrėkite periodiškai papildydami arba keisdami terpę. Kultūras pradėkite su 5 x 10^5 ląstelių/ml tankiu ir, siekdami optimalaus augimo, palaikykite ląstelių koncentraciją nuo 3 x 10^5 iki 1 x 10^6 ląstelių/ml.

Sėjos tankis	1 x 10^5 ląstelių/cm^2
Skysčių atnaujinimas	2-3 kartus per savaitę
Atkūrimas po atšilimo	24-48 valandos

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Atšildymas ir auginimas

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KOKYBĖS KONTROLĖ IR KRIOKONSERVAVIMAS

Sterilumas

Mikoplazmos užterštumas atmetamas taikant PGR pagrįstus tyrimus ir liuminescencinius mikoplazmos aptikimo metodus.
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užteršimo bakterijomis, grybeliais ar mielėmis, ląstelių kultūros kasdien vizualiai tikrinamos.

Šaldymo terpė	Kaip kriokonservavimo terpę naudojame visišką augimo terpę (įskaitant FBS) + 10 % DMSO, kad būtų užtikrintas tinkamas gyvybingumas po atšildymo, arba CM-1 (Cytion katalogo numeris 800100), kurioje yra optimizuotų osmoprotektorių ir medžiagų apykaitos stabilizatorių, kad būtų pagerintas atsigavimas ir sumažintas kriokonservavimo sukeltas stresas.

Laikymo sąlygos

Norėdami ilgai saugoti, įdėkite buteliukus į garų fazės skystą azotą maždaug -150-196 °C temperatūroje. Laikymas -80 °C temperatūroje yra priimtinas tik kaip trumpas tarpinis etapas prieš perkeliant į skystąjį azotą.

Pristatymo sąlygos

Kriokonservuotos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje su pakankamu kiekiu šaldymo skysčio, kad pervežimo metu būtų palaikoma maždaug -78 °C temperatūra. Gavę pakuotę, nedelsdami ją apžiūrėkite ir nedelsdami perkelkite mėgintuvėlius į tinkamą saugyklą.

DONORAS

Donoro amžius	19 metų
Etninė priklausomybė	Kaukaziečių

TEISINIAI IR SAUGOS KLAUSIMAI

Saugos priemonės

Planuojant saugoti kriovaistinę skystame azote, kad ateityje ją būtų galima atšildyti, būtina laikytis griežtų saugos priemonių. Būtina mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir drabužius, o perkeliant užšaldytus mėginius į skystojo azoto talpyklą arba iš jos būtina naudoti veido kaukę arba apsauginius akinius. Taip siekiama sumažinti sužeidimų riziką dėl galimo kriokomponentų sprogimo išėmimo metu, kai gali išsiveržti aštrūs fragmentai.

Garantija

" Cytion" garantuoja savo produktų kokybę ir gyvybingumą.
Garantuojame, kad mūsų ląstelės bus gyvybingos kultūrų auginimo pradžioje 60 dienų po išsiuntimo iš mūsų gamyklos.
Užtikriname, kad visos medžiagos atitinka analizės sertifikate ir (arba) gaminio lape aprašytas specifikacijas
Išsamią informaciją rasite mūsų <a href=""/Kas mes esame/garantijos/" hreflang=""x-default"">Garantijos pareiškime

Reikalinga medžiagų perdavimo sutartis	Yes