Celice MOLT-4

300115

MOLT-4 je limfoblastna celična linija T, pridobljena iz periferne krvi 19-letnega bolnika z akutno limfoblastno levkemijo (ALL) v ponovitvi leta 1971. Je sestrska celična linija MOLT-3, medtem ko ima MOLT-4 nenavadno preureditev gena gama verige celičnega antigenskega receptorja T (T-gamma). Celice MOLT-4 imajo podvojitveni čas približno 30 ur, rastejo v suspenziji in so tumorogene pri neobdelanih golih miših, miših, obdelanih s serumom proti limfocitom, in miših, obsevanih z x-žarčenjem.
Celice MOLT-4 imajo hipertraploidno število kromosomov z modalnim številom kromosomov 95, ki se pojavlja pri 24 % celic, vendar kažejo stabilne in ponavljajoče se strukturne nepravilnosti kromosomov in daljšo dolžino telomer. MOLT-4 izraža različne označevalce celic T, vključno s CD1, CD2, CD3A, CD3B, CD3C, CD4, CD5, CD6 in CD7. Izražajo tudi visoko raven terminalne deoksinukleotidil transferaze (TdT). Celična linija MOLT-4 ne proizvaja imunoglobulina ali virusa Epstein-Barr. Bolnik, iz katerega so bile pridobljene celice, je predhodno prejel kemoterapijo z več zdravili. Na kodonu 248 gena p53 je mutacija G -> A in gen P53 ni izražen. Linija je bila sprva okužena z mikoplazmo, vendar je bila nato ozdravljena z antibiotiki.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Opis

MOLT-4 je limfoblastna celična linija T, pridobljena iz periferne krvi 19-letnega bolnika z akutno limfoblastno levkemijo (ALL) v ponovitvi leta 1971. Je sestrska celična linija MOLT-3, medtem ko ima MOLT-4 nenavadno preureditev gena gama verige celičnega antigenskega receptorja T (T-gamma). Celice MOLT-4 imajo podvojitveni čas približno 30 ur, rastejo v suspenziji in so tumorogene pri neobdelanih golih miših, miših, obdelanih s serumom proti limfocitom, in miših, obsevanih z x-žarčenjem.
Celice MOLT-4 imajo hipertraploidno število kromosomov z modalnim številom kromosomov 95, ki se pojavlja pri 24 % celic, vendar kažejo stabilne in ponavljajoče se strukturne nepravilnosti kromosomov in daljšo dolžino telomer. MOLT-4 izraža različne označevalce celic T, vključno s CD1, CD2, CD3A, CD3B, CD3C, CD4, CD5, CD6 in CD7. Izražajo tudi visoko raven terminalne deoksinukleotidil transferaze (TdT). Celična linija MOLT-4 ne proizvaja imunoglobulina ali virusa Epstein-Barr. Bolnik, iz katerega so bile pridobljene celice, je predhodno prejel kemoterapijo z več zdravili. Na kodonu 248 gena p53 je mutacija G -> A in gen P53 ni izražen. Linija je bila sprva okužena z mikoplazmo, vendar je bila nato ozdravljena z antibiotiki.

Tkivo	Periferna kri
Bolezen	Akutna limfoblastna levkemija T pri odraslih

Sinonimi

- Molt-4
- MOLT 4
- Molt 4
- MOLT.4
- MOLT4
- Molt4
- GM02219
- GM02219C
- GM2219C
- GM02219D

RAZVRSTITEV

Organizem	Človek
Seks	Moški
Lastnosti rasti	Vzmetenje
Stopnja biološke varnosti	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ZNAČILNOSTI

Morfologija	Okrogle celice
Vrsta celice	Limfocit T

Kariotip

Hipertetraploid. Modalna številka: 96. Dva kromosoma x in dva kromosoma Y.

IDENTIFIKATORJI

Navajanje vira

MOLT-4 (kataloška številka Cytion 300115)

Davčna identifikacijska številka NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0013

IZRAŽANJE IN DOVZETNOST

Ekspresija beljakovin

P53 pozitiven

Ekspresija antigena

CD1 (49 %), CD2 (35 %), CD3 A (26 %) B (33 %) C (34 %), CD4 (55 %), CD5 (72 %), CD6 (22 %), CD7 (77 %)

Profil mutacij

Mutacija G -> A na kodonu 248 gena p53 se ne izraža (Rodrigues, 1990).

Virusi

Celice ne proizvajajo imunoglobulinov ali virusa Epstein-Barr (Minowada, 1972).

Izdelki

Nastane velika količina terminalne deoksinukleotidiltransferaze (TdT)

RAVNANJE IN GOJENJE

Gojišče

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilnega glutamina, w: 2,0 g/L NaHCO3 (številka izdelka Cytion 820700a)

Inkubacijska atmosfera	37 °C, 5 %CO2, vlažno ozračje.

Prehranska dopolnila

Gojišče dopolnite z 10 % FBS

Preusmeritev v drugo kulturo

Kulture vzdržujte z rednim dodajanjem ali zamenjavo gojišča. Kulture začnite z gostoto 5 x 10^5 celic/ml in za optimalno rast ohranjajte koncentracijo celic v območju od 3 x 10^5 do 1 x 10^6 celic/ml.

Gostota setve	1 x 10^5 celic/cm^2
Obnova tekočine	2 do 3-krat na teden
Obnova po odtaljevanju	24 do 48 ur

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Odtaljevanje in gojenje

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KAKOVOSTI IN KRIOPREZERVACIJA

Sterilnost

Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence.
Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.

Medij za zamrzovanje	Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (kataloška številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročenega s kriom.

Pogoji shranjevanja

Za dolgotrajno shranjevanje viale postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196 °C. Shranjevanje pri -80 °C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

Pogoji dostave

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno -78 °C. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in viale nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

DONATOR

Starost darovalca	19 let
Etnična pripadnost	Kavkaški

PRAVNE ZADEVE IN VARNOST

Varnostni ukrepi

Pri načrtovanju shranjevanja kriovialov v tekočem dušiku za kasnejše odtaljevanje je treba obvezno upoštevati stroge varnostne ukrepe. Nujni so ustrezne zaščitne rokavice in oblačila, med prenosom zamrznjenih vzorcev v rezervoar s tekočim dušikom ali iz njega pa je potrebna uporaba obrazne maske ali zaščitnih očal. S tem se zmanjša tveganje poškodb zaradi morebitnih eksplozij kriovialov pri odstranjevanju, ki lahko povzročijo izstrelitev ostrih delcev.

Garancija

V podjetju Cytion stojimo za kakovostjo in uporabnostjo svojih izdelkov.
Zagotavljamo, da bodo naše celice ob začetku gojenja še 60 dni po odpremi iz naših obratov vitalne.
Zagotavljamo, da so vsi materiali skladni s specifikacijami, opisanimi v potrdilu o analizi in/ali listu izdelka
Za vse podrobnosti si oglejte našo <a href=""/Kdo smo/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garancijsko izjavo

Potreben je sporazum o prenosu materiala	Yes