MOLT-4-celler

300115

MOLT-4 är en T-lymfoblastcellinje som härrör från perifert blod från en 19-årig manlig patient med akut lymfatisk leukemi (ALL) i återfall 1971. Det är en systercellinje till MOLT-3, medan MOLT-4 uppvisar ett ovanligt omarrangemang av T-cellsantigenreceptorns gamma-kedjegen (T-gamma). MOLT-4-cellerna har en fördubblingstid på cirka 30 timmar, växer i suspension och är tumörframkallande i obehandlade nakna möss, möss som behandlats med anti-lymfocytserum och x-bestrålade möss.
MOLT-4-celler har ett hypertetraploid kromosomantal med det modala kromosomantalet 95 som förekommer i 24% av cellerna, men uppvisar stabila och återkommande strukturella avvikelser i kromosomerna och längre telomerlängd. MOLT-4 uttrycker en mängd olika T-cellsmarkörer, inklusive CD1, CD2, CD3A, CD3B, CD3C, CD4, CD5, CD6 och CD7. De uttrycker också höga nivåer av terminal deoxynukleotidyltransferas (TdT).
MOLT-4-cellinjen producerar inte immunglobulin eller Epstein-Barr-virus. Den patient från vilken cellerna härrörde hade tidigare fått kemoterapi med flera läkemedel. Det finns en G -> A-mutation vid kodon 248 i p53-genen, och P53 uttrycks inte. Linjen var ursprungligen kontaminerad med mykoplasma men har sedan dess botats med antibiotika.

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

MOLT-4 är en T-lymfoblastcellinje som härrör från perifert blod från en 19-årig manlig patient med akut lymfatisk leukemi (ALL) i återfall 1971. Det är en systercellinje till MOLT-3, medan MOLT-4 uppvisar ett ovanligt omarrangemang av T-cellsantigenreceptorns gamma-kedjegen (T-gamma). MOLT-4-cellerna har en fördubblingstid på cirka 30 timmar, växer i suspension och är tumörframkallande i obehandlade nakna möss, möss som behandlats med anti-lymfocytserum och x-bestrålade möss.
MOLT-4-celler har ett hypertetraploid kromosomantal med det modala kromosomantalet 95 som förekommer i 24% av cellerna, men uppvisar stabila och återkommande strukturella avvikelser i kromosomerna och längre telomerlängd. MOLT-4 uttrycker en mängd olika T-cellsmarkörer, inklusive CD1, CD2, CD3A, CD3B, CD3C, CD4, CD5, CD6 och CD7. De uttrycker också höga nivåer av terminal deoxynukleotidyltransferas (TdT).
MOLT-4-cellinjen producerar inte immunglobulin eller Epstein-Barr-virus. Den patient från vilken cellerna härrörde hade tidigare fått kemoterapi med flera läkemedel. Det finns en G -> A-mutation vid kodon 248 i p53-genen, och P53 uttrycks inte. Linjen var ursprungligen kontaminerad med mykoplasma men har sedan dess botats med antibiotika.

Vävnad	Perifert blod
Sjukdom	Akut lymfoblastisk leukemi hos vuxna T

Synonymer

- Molt-4
- MOLT 4
- Molt 4
- MOLT.4
- MOLT4
- Molt4
- GM02219
- GM02219C
- GM2219C
- GM02219D

KLASSIFICERING

Organism	Människa
Kön	Man
Tillväxtegenskaper	Upphängning
Biosäkerhetsnivå	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EGENSKAPER

Morfologi	Runda celler
Celltyp	T-lymfocyt

Karyotyp

Hypertetraploid. Modalt antal: 96. Två X- och två Y-kromosomer.

IDENTIFIERARE

Källa

MOLT-4 (Cytion katalognummer 300115)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_0013

UTTRYCK OCH MOTTAGLIGHET

Proteinexpression

P53-positiv

Antigenuttryck

CD1 (49 %), CD2 (35 %), CD3 A (26 %) B (33 %) C (34 %), CD4 (55 %), CD5 (72 %), CD6 (22 %), CD7 (77 %)

Mutationsprofil

G -> A-mutation vid kodon 248 i p53-genen, P53 uttrycks inte (Rodrigues, 1990).

Virus

Cellerna producerar inte immunoglobulin eller Epstein-Barr-virus (Minowada, 1972).

Produkter

Höga halter av terminalt deoxynukleotidyltransferas (TdT) produceras

HANTERING OCH ODLING

Odlingsmedium

RPMI 1640, med: 2,0 mM stabilt glutamin, med: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfär	37°C, 5%CO2, befuktad atmosfär.

Kosttillskott

Komplettera mediet med 10% FBS

Vidareodling

Underhåll odlingarna genom att regelbundet tillsätta eller byta ut odlingsmediet. Starta odlingarna med en densitet på 5 x 10^5 celler/ml och håll cellkoncentrationen inom intervallet 3 x 10^5 till 1 x 10^6 celler/ml för optimal tillväxt.

Såtäthet	1 x 10^5 celler/cm^2
Vätskeförnyelse	2 till 3 gånger per vecka
Återhämtning efter upptining	24 till 48 timmar

Upptining och odling

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OCH KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik. För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner.

Frysmedel	Som kryokonserveringsmedium använder vi komplett tillväxtmedium (inklusive FBS) + 10% DMSO för adekvat viabilitet efter upptining, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress.

Förvaringsförhållanden

För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve.

Leveransvillkor

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

DONATOR

Donatorns ålder	19 år
Etnicitet	Kaukasisk

JURIDISKA FRÅGOR OCH SÄKERHET

Säkerhetsföreskrifter

När man planerar att förvara en kryovial i flytande kväve för framtida upptining är det obligatoriskt att följa strikta säkerhetsåtgärder. Lämpliga skyddshandskar och skyddskläder är nödvändiga, och ansiktsmask eller skyddsglasögon måste användas vid överföring av frysta prover till eller från tanken med flytande kväve. Detta för att minska risken för skador på grund av eventuella explosioner i frysbehållaren vid borttagning, vilket kan leda till att vassa fragment projiceras.

Garanti

På Cytion står vi bakom våra produkters kvalitet och livskraft.
Vi garanterar att våra celler är livsdugliga vid odlingens början i 60 dagar efter leverans från våra anläggningar.
Vi försäkrar att allt material överensstämmer med de specifikationer som beskrivs i analyscertifikatet och/eller produktbladet
För fullständig information, se vår <a href="”/Who-we-are/Warranty/” hreflang=”x-default”>Garantiförklaring

Avtal om materialöverföring krävs	Yes