# Κύτταρα AN3 Ca

300119

Η κυτταρική σειρά An3 Ca προέρχεται από ένα ανθρώπινο αδενοκαρκίνωμα του ενδομητρίου, έναν τύπο καρκίνου που προέρχεται από την επένδυση της μήτρας. Η εν λόγω κυτταρική σειρά είναι αρνητική σε υποδοχείς οιστρογόνων (ER-) και παρουσιάζει επιθετικό καρκινικό δυναμικό όταν αξιολογείται in vivo. Τα κύτταρα An3 Ca χρησιμοποιούνται εκτενώς στην έρευνα που επικεντρώνεται στην κατανόηση των μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών που διέπουν την εξέλιξη του καρκίνου του ενδομητρίου, συμπεριλαμβανομένων μελετών σχετικά με τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, τη μετάσταση και την ανταπόκριση σε θεραπευτικούς παράγοντες.
Χαρακτηριστικά, τα κύτταρα An3 Ca εμφανίζουν επιθηλιακή μορφολογία και έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της επίδρασης διαφόρων γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στη συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων. Η έρευνα με τη χρήση αυτής της κυτταρικής σειράς έχει συμβάλει στον εντοπισμό πιθανών θεραπευτικών στόχων και στην κατανόηση των μηχανισμών αντίστασης έναντι των συμβατικών θεραπειών. Χρησιμεύουν ως πολύτιμο μοντέλο για την αξιολόγηση νέων φαρμάκων ή στρατηγικών θεραπείας που θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές κατά των επιθετικών μορφών καρκίνου του ενδομητρίου.
Συνολικά, η κυτταρική σειρά An3 Ca συμβάλλει καθοριστικά στην πρόοδο των επιστημονικών γνώσεων για το αδενοκαρκίνωμα του ενδομητρίου, προσφέροντας γνώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις για αυτή τη δύσκολη και συχνά θανατηφόρα ασθένεια.

## ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

### Περιγραφή

Η κυτταρική σειρά An3 Ca προέρχεται από ένα ανθρώπινο αδενοκαρκίνωμα του ενδομητρίου, έναν τύπο καρκίνου που προέρχεται από την επένδυση της μήτρας. Η εν λόγω κυτταρική σειρά είναι αρνητική σε υποδοχείς οιστρογόνων (ER-) και παρουσιάζει επιθετικό καρκινικό δυναμικό όταν αξιολογείται in vivo. Τα κύτταρα An3 Ca χρησιμοποιούνται εκτενώς στην έρευνα που επικεντρώνεται στην κατανόηση των μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών που διέπουν την εξέλιξη του καρκίνου του ενδομητρίου, συμπεριλαμβανομένων μελετών σχετικά με τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, τη μετάσταση και την ανταπόκριση σε θεραπευτικούς παράγοντες.
Χαρακτηριστικά, τα κύτταρα An3 Ca εμφανίζουν επιθηλιακή μορφολογία και έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της επίδρασης διαφόρων γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στη συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων. Η έρευνα με τη χρήση αυτής της κυτταρικής σειράς έχει συμβάλει στον εντοπισμό πιθανών θεραπευτικών στόχων και στην κατανόηση των μηχανισμών αντίστασης έναντι των συμβατικών θεραπειών. Χρησιμεύουν ως πολύτιμο μοντέλο για την αξιολόγηση νέων φαρμάκων ή στρατηγικών θεραπείας που θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές κατά των επιθετικών μορφών καρκίνου του ενδομητρίου.
Συνολικά, η κυτταρική σειρά An3 Ca συμβάλλει καθοριστικά στην πρόοδο των επιστημονικών γνώσεων για το αδενοκαρκίνωμα του ενδομητρίου, προσφέροντας γνώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις για αυτή τη δύσκολη και συχνά θανατηφόρα ασθένεια.

| | |
|---|---|
| **Ιστός** | Μήτρα, ενδομήτριο |
| **Ασθένεια** | Αδενοκαρκίνωμα |

### Συνώνυμα

- AN3_CA
- AN3-CA
- AN3 Ca
- AN3CA
- AN-3
- AN3
- Acanthosis Nigricans 3rd attempt-CArcinoma

## ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ

| | |
|---|---|
| **Οργανισμός** | Άνθρωπος |
| **Σεξ** | Γυναίκα |
| **Ιδιότητες ανάπτυξης** | Πιστός |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

| | |
|---|---|
| **Επίπεδο βιοασφάλειας** | 1 |

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

| | |
|---|---|
| **Μορφολογία** | Επιθηλιοειδής |
| **Τύπος κυττάρου** | Επιθηλιακό |
| **Ογκογόνος** | Ναι, σε γυμνά ποντίκια. Παράγει αδιαφοροποίητο κακοήθη όγκο, επίσης σε χαμηλή συχνότητα (22%) στον θύλακα του μάγουλου σε χάμστερ που έλαβαν θεραπεία με κορτιζόνη |
| **Πολυπλοειδής κατάσταση** | Ανευπλοειδές, Προϊόν συχνότητας φαινοτύπου: 0.0054 |
| **Χρόνος διπλασιασμού** | 45 έως 50 ώρες |

## ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΆ

**Παραπομπή**

AN3 Ca (αριθμός καταλόγου Cytion 300119)

| | |
|---|---|
| **Αριθμός φορολογικού μητρώου NCBI** | 9606 |
| **Κελλοσαύρος** | CVCL_0028 |

## ΈΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ

**Ισοένζυμα**

PGM3, 1-2, PGM1, 1, ES-D, 1, AK-1, 1-2, GLO-1, 2, G6PD, B,

## ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ

**Θρεπτικό μέσο**

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-γλουταμίνη, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (αριθμός άρθρου Cytion 820100a)

| | |
|---|---|
| **Ατμόσφαιρα επώασης** | 37°C, 5%CO2, υγροποιημένη ατμόσφαιρα. |

**Συμπληρώματα**

Συμπληρώστε το μέσο με 10% FBS και 1% NEAA

| | |
|---|---|
| **Αντιδραστήριο αποσύνδεσης** | Accutase |

**Αναπαραγωγή σε υποκαλλιέργεια**

Αφαιρέστε το παλιό μέσο από τα προσκολλημένα κύτταρα και πλύντε τα με PBS που δεν περιέχει ασβέστιο και μαγνήσιο. Για φιάλες T25, χρησιμοποιήστε 3-5 ml PBS και για φιάλες T75, χρησιμοποιήστε 5-10 ml. Στη συνέχεια, καλύψτε πλήρως τα κύτταρα με Accutase, χρησιμοποιώντας 1-2 ml για φιάλες T25 και 2,5 ml για φιάλες T75. Αφήστε τα κύτταρα να επωαστούν σε θερμοκρασία δωματίου για 8-10 λεπτά για να αποκολληθούν. Μετά την επώαση, αναμείξτε απαλά τα κύτταρα με 10 ml μέσου για να ανασυσταθούν και, στη συνέχεια, φυγοκεντρίστε στα 300xg για 3 λεπτά. Απορρίψτε το υπερκείμενο υγρό, ανασυστάστε τα κύτταρα σε φρέσκο μέσο και μεταφέρετέ τα σε νέες φιάλες που περιέχουν ήδη φρέσκο μέσο.

| | |
|---|---|
| **Πυκνότητα σποράς** | Συνιστάται αρχική πυκνότητα σποράς 3 έως 4 x $10^4$ κύτταρα/$cm^2$. Αργότερα, 2 x $10^4$ κύτταρα/$cm^2$ θα αποδώσουν ένα συγκλίνων στρώμα σε 4 έως 5 ημέρες. |
| **Ανανέωση υγρών** | 2 έως 3 φορές την εβδομάδα |
| **Ανάκαμψη μετά την απόψυξη** | Εντός 24 έως 48 ωρών |

**Απόψυξη και καλλιέργεια**

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

**Στειρότητα**

Η μόλυνση από μυκόπλασμα αποκλείεται με τη χρήση τόσο των δοκιμασιών που βασίζονται στην PCR όσο και των μεθόδων ανίχνευσης μυκοπλάσματος με βάση τη φωταύγεια.
Για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει μόλυνση από βακτήρια, μύκητες ή ζύμες, οι κυτταροκαλλιέργειες υποβάλλονται σε καθημερινές οπτικές επιθεωρήσεις.

| | |
|---|---|
| **Μέσο κατάψυξης** | Ως μέσο κρυοσυντήρησης, χρησιμοποιούμε πλήρες μέσο ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένου του FBS) + 10% DMSO για επαρκή βιωσιμότητα μετά την απόψυξη, ή CM-1 (αριθμός καταλόγου Cytion 800100), το οποίο περιλαμβάνει βελτιστοποιημένα ωσμοπροστατευτικά και μεταβολικούς σταθεροποιητές για την ενίσχυση της ανάκαμψης και τη μείωση του στρες που προκαλείται από την κρυοσυντήρηση. |

**Συνθήκες αποθήκευσης**

Για μακροχρόνια συντήρηση, τοποθετήστε τα φιαλίδια σε υγρό άζωτο σε φάση ατμών σε θερμοκρασία περίπου -150 έως -196 °C. Η αποθήκευση στους -80 °C είναι αποδεκτή μόνο ως σύντομο ενδιάμεσο βήμα πριν από τη μεταφορά σε υγρό άζωτο.

**Όροι αποστολής**

Οι κρυοσυντηρημένες κυτταρικές σειρές αποστέλλονται σε ξηρό πάγο σε επικυρωμένη, μονωμένη συσκευασία με επαρκές ψυκτικό μέσο για τη διατήρηση περίπου των -78 °C καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατά την παραλαβή, επιθεωρήστε αμέσως τον περιέκτη και μεταφέρετε τα φιαλίδια χωρίς καθυστέρηση στην κατάλληλη αποθήκη.

## ΔΩΡΗΤΉΣ

| | |
|---|---|
| **Ηλικία δωρητή** | 55 χρόνια |
| **Εθνικότητα** | Καυκάσιος |

## ΝΟΜΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

**Μέτρα ασφαλείας**

Όταν σχεδιάζετε να αποθηκεύσετε ένα κρυοφιαλίδιο σε υγρό άζωτο για μελλοντική απόψυξη, είναι υποχρεωτικό να τηρείτε αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Τα κατάλληλα προστατευτικά γάντια και ο κατάλληλος προστατευτικός ρουχισμός είναι απαραίτητα, ενώ απαιτείται η χρήση μάσκας προσώπου ή γυαλιών ασφαλείας κατά τη μεταφορά κατεψυγμένων δειγμάτων προς ή από τη δεξαμενή υγρού αζώτου. Αυτό γίνεται για να μετριαστεί ο κίνδυνος τραυματισμού από πιθανές εκρήξεις κρυοσωλήνων κατά την απομάκρυνση, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην προβολή αιχμηρών θραυσμάτων.

**Εγγύηση**

Στην Cytion, υποστηρίζουμε την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων μας.
Εγγυόμαστε ότι τα κύτταρά μας θα είναι βιώσιμα κατά την έναρξη της καλλιέργειας για 60 ημέρες μετά την αποστολή από τις εγκαταστάσεις μας.
Διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα υλικά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Πιστοποιητικό Ανάλυσης ή/και στο Φύλλο Προϊόντος
Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Δήλωση εγγύησης

| | |
|---|---|
| **Απαιτείται συμφωνία μεταφοράς υλικού** | Yes |