Клетки NCH690

300120

Клетъчната линия NCH640 е клетъчен модел, подобен на стволовите клетки на глиобластома, който се използва в научните изследвания за изследване на механизмите на туморната резистентност, клетъчното оцеляване при стрес и терапевтичните реакции. Глиобластомът, една от най-агресивните форми на мозъчни тумори, е труден за лечение поради своята устойчивост към терапия и адаптация към враждебна микросреда. NCH640 се култивира в специализирани среди като Neurobasal A с добавки като B27, а растежът му се подпомага от основни растежни фактори като EGF и FGF-2. Той често се използва заедно с други модели на глиомни стволови клетки, като NCH690 и NCH644, за изследване на тези биологични явления.
Изследванията на NCH640 са силно фокусирани върху механизмите на резистентност, особено в хипоксични условия. Глиомни клетки като NCH640 показват значителна зависимост от метаболитни адаптации, включително променена регулация на реактивните кислородни видове (ROS). Проучванията показват, че насочването към пътища като интегрирания отговор на стреса (ISR) в NCH640 и свързаните с него клетъчни линии може да подобри чувствителността им към терапии като темозоломид, който обикновено се използва при лечението на глиобластом. Тези открития са важни за разработването на нови стратегии за преодоляване на присъщата резистентност на глиомоподобните стволови клетки към стандартните терапевтични интервенции.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Описание

Клетъчната линия NCH640 е клетъчен модел, подобен на стволовите клетки на глиобластома, който се използва в научните изследвания за изследване на механизмите на туморната резистентност, клетъчното оцеляване при стрес и терапевтичните реакции. Глиобластомът, една от най-агресивните форми на мозъчни тумори, е труден за лечение поради своята устойчивост към терапия и адаптация към враждебна микросреда. NCH640 се култивира в специализирани среди като Neurobasal A с добавки като B27, а растежът му се подпомага от основни растежни фактори като EGF и FGF-2. Той често се използва заедно с други модели на глиомни стволови клетки, като NCH690 и NCH644, за изследване на тези биологични явления.
Изследванията на NCH640 са силно фокусирани върху механизмите на резистентност, особено в хипоксични условия. Глиомни клетки като NCH640 показват значителна зависимост от метаболитни адаптации, включително променена регулация на реактивните кислородни видове (ROS). Проучванията показват, че насочването към пътища като интегрирания отговор на стреса (ISR) в NCH640 и свързаните с него клетъчни линии може да подобри чувствителността им към терапии като темозоломид, който обикновено се използва при лечението на глиобластом. Тези открития са важни за разработването на нови стратегии за преодоляване на присъщата резистентност на глиомоподобните стволови клетки към стандартните терапевтични интервенции.

Тъкан	Мозък
Заболяване	Глиобластом

КЛАСИФИКАЦИЯ

Организъм	Човек
Секс	Женски
Свойства, свързани с растежа	Привърженик
Ниво на биологична безопасност	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Туморогенен	Да

ИДЕНТИФИКАТОРИ

Източник

NCH690 (каталожен номер 300120 на Cytion)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Данъчен идентификационен номер в NCBI	9606
Целозавър	CVCL_x915

ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

Хранителна среда

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L глюкоза, w: 2,5 mM L-глутамин, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM натриев пируват, w: 1,2 g/L NaHCO3 (номер на изделието на Cytion 820400a)

Атмосфера за инкубация	37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера.

Добавки

Добавете към средата 5 мг/л хепарин, 20 нг/мл bFGF, 20 микрограма/л EGF, 5 mg/L инсулин, 100 mg/L трансферин, 5,2 микрограма/L натриев селенит, 6,3 микрограма/L прогестерон, 161,1 микрограма/L путресцин, 50 mg/L хидрокортизон

Пресаждане

За субкултивиране на сфероидните култури започнете с механично разделяне на сфероидите чрез пипетиране нагоре-надолу 5 до 10 пъти с помощта на пипета Eppendorf с 1000 µl филтърни накрайници. След това центрофугирайте сместа при 300 g в продължение на 5 минути при стайна температура, за да се изсипят клетките. Изхвърлете супернатантата и ресуспендирайте клетъчната пелета в свежа хранителна среда. Накрая прехвърлете ресуспендираните клетки в нови съдове за култивиране, за да стимулирате по-нататъшното формиране на сфероиди. Този подход осигурява ефективно разпадане на сфероидите и ги подготвя за продължаване на растежа в нова среда

Плътност на засяването	1 x 10^5 клетки/мл
Обновяване на течността	2 до 3 пъти седмично
Възстановяване след размразяване	След размразяването оставете клетките да се възстановят от процеса на замразяване за поне 24-48 часа.

Размразяване и култивиране

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Стерилност

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

Среда за замразяване	Като среда за криоконсервация използваме 50% базова среда + 40% FBS + 10% DMSO или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

Условия за съхранение

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Условия за доставка

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

ДАРИТЕЛ

Възраст на донора	78 години
Етническа принадлежност	Кавказки

ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

Мерки за безопасност

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

Гаранция

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

Прилагат се споразумения с трети страни	Yes