NCH690 sejtek

300120

Az NCH640 sejtvonal egy glioblasztóma őssejt-szerű sejtmodell, amelyet a kutatásban a tumorrezisztencia, a stressz alatti sejttúlélés és a terápiás válaszok mechanizmusainak feltárására használnak. A glioblasztóma, az agydaganatok egyik legagresszívebb formája, nehezen kezelhető a terápiával szembeni rezisztencia és az ellenséges mikrokörnyezethez való alkalmazkodás miatt. Az NCH640-et speciális táptalajban, például Neurobasal A-ban tenyésztik, olyan kiegészítőkkel, mint a B27, és növekedését olyan alapvető növekedési faktorok támogatják, mint az EGF és az FGF-2. Gyakran használják más glióma őssejtmodellekkel, például az NCH690 és az NCH644 modellel együtt e biológiai jelenségek vizsgálatára.
Az NCH640-re vonatkozó kutatások nagymértékben összpontosítanak a rezisztencia mechanizmusaira, különösen hipoxiás körülmények között. Az NCH640-hez hasonló glióma sejtek jelentős mértékben támaszkodnak a metabolikus adaptációkra, beleértve a reaktív oxigénfajok (ROS) megváltozott szabályozását. Vizsgálatok kimutatták, hogy az NCH640 és a rokon sejtvonalakban az olyan útvonalak, mint az integrált stresszválasz (ISR) célzott kezelése javíthatja az olyan terápiákkal szembeni érzékenységüket, mint a glioblasztóma kezelésében gyakran alkalmazott temozolomid. Ezek az eredmények fontosak olyan új stratégiák kidolgozásához, amelyekkel leküzdhető a glióma őssejtek eredendő rezisztenciája a standard terápiás beavatkozásokkal szemben.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

Az NCH640 sejtvonal egy glioblasztóma őssejt-szerű sejtmodell, amelyet a kutatásban a tumorrezisztencia, a stressz alatti sejttúlélés és a terápiás válaszok mechanizmusainak feltárására használnak. A glioblasztóma, az agydaganatok egyik legagresszívebb formája, nehezen kezelhető a terápiával szembeni rezisztencia és az ellenséges mikrokörnyezethez való alkalmazkodás miatt. Az NCH640-et speciális táptalajban, például Neurobasal A-ban tenyésztik, olyan kiegészítőkkel, mint a B27, és növekedését olyan alapvető növekedési faktorok támogatják, mint az EGF és az FGF-2. Gyakran használják más glióma őssejtmodellekkel, például az NCH690 és az NCH644 modellel együtt e biológiai jelenségek vizsgálatára.
Az NCH640-re vonatkozó kutatások nagymértékben összpontosítanak a rezisztencia mechanizmusaira, különösen hipoxiás körülmények között. Az NCH640-hez hasonló glióma sejtek jelentős mértékben támaszkodnak a metabolikus adaptációkra, beleértve a reaktív oxigénfajok (ROS) megváltozott szabályozását. Vizsgálatok kimutatták, hogy az NCH640 és a rokon sejtvonalakban az olyan útvonalak, mint az integrált stresszválasz (ISR) célzott kezelése javíthatja az olyan terápiákkal szembeni érzékenységüket, mint a glioblasztóma kezelésében gyakran alkalmazott temozolomid. Ezek az eredmények fontosak olyan új stratégiák kidolgozásához, amelyekkel leküzdhető a glióma őssejtek eredendő rezisztenciája a standard terápiás beavatkozásokkal szemben.

Szövet	Agy
Betegség	Glioblastoma

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Nő
Növekedési tulajdonságok	Hűséges
Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Daganatképző	Igen

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

NCH690 (Cytion katalógusszám: 300120)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI adóazonosító szám	9606
Cellosaurus	CVCL_x915

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L glükóz, w: 2,5 mM L-Glutamin, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM nátrium-piruvát, w: 1,2 g/L NaHCO3 (Cytion 820400a cikkszám)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.

Kiegészítők

A tápközeget egészítsük ki 5 mg/L heparinnal, 20 ng/mL bFGF-fel, 20 mikrogramm/L EGF-fel, 5 mg/L inzulinnal, 100 mg/L transzferrinnel, 5,2 mikrogramm/L Na-szelenittal, 6,3 mikrogramm/L progeszteronnal, 161,1 mikrogramm/L putrescinnel, 50 mg/L hidrokortizonnal

Átültetés

A szferoidkultúrák szubkultiválásához kezdje a szferoidok mechanikus disszociációjával, 5-10 alkalommal történő fel-le pipettázással, 1000 µl-es szűrőhegyekkel ellátott Eppendorf pipettával. Ezt követően a sejtek pelletálásához centrifugálja az elegyet 300 g-nél 5 percig szobahőmérsékleten. Dobja el a felülúszót, és szuszpendálja újra a sejtpelletet friss táptalajban. Végül a reszuszpendált sejteket helyezze át új tenyésztőedényekbe a további szferoidképződés elősegítése érdekében. Ez a megközelítés biztosítja a szferoidok hatékony lebomlását, és felkészíti őket az új környezetben történő további növekedésre

Ültetési sűrűség	1 x 10^5 sejt/ml
Folyadékcsere	hetente 2-3 alkalommal
Az olvadás utáni helyreállás	A felolvasztás után hagyja, hogy a sejtek legalább 24-48 órán keresztül regenerálódjanak a fagyasztásból.

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	A kriokonzerváláshoz 50%-os alapközeget + 40% FBS + 10% DMSO-t vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100) használunk, amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regeneráció fokozása és a krioindukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	78 év
Etnikai hovatartozás	Kaukázusi

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Harmadik felekkel kötött megállapodások érvényesek	Yes