Sel NCH690

300120

Garis sel NCH640 adalah model sel mirip batang glioblastoma yang digunakan dalam penelitian untuk mengeksplorasi mekanisme resistensi tumor, kelangsungan hidup sel di bawah tekanan, dan respons terapeutik. Glioblastoma, salah satu bentuk tumor otak yang paling agresif, sulit diobati karena resistensi terhadap terapi dan adaptasi terhadap lingkungan mikro yang tidak bersahabat. NCH640 dikultur dalam media khusus seperti Neurobasal A dengan suplemen seperti B27, dan pertumbuhannya didukung oleh faktor pertumbuhan esensial seperti EGF dan FGF-2. Ini sering digunakan bersama model sel punca glioma lainnya, seperti NCH690 dan NCH644, untuk menyelidiki fenomena biologis ini.
Penelitian tentang NCH640 sangat berfokus pada mekanisme ketahanannya, terutama dalam kondisi hipoksia. Sel-sel glioma seperti NCH640 menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada adaptasi metabolik, termasuk perubahan regulasi spesies oksigen reaktif (ROS). Penelitian telah menunjukkan bahwa penargetan jalur seperti respon stres terintegrasi (ISR) pada NCH640 dan jalur sel terkait dapat meningkatkan sensitivitasnya terhadap terapi seperti temozolomide, yang umumnya digunakan dalam pengobatan glioblastoma. Temuan ini penting untuk merancang strategi baru untuk mengatasi resistensi yang melekat pada sel mirip batang glioma terhadap intervensi terapi standar.

INFORMASI UMUM

Deskripsi

Garis sel NCH640 adalah model sel mirip batang glioblastoma yang digunakan dalam penelitian untuk mengeksplorasi mekanisme resistensi tumor, kelangsungan hidup sel di bawah tekanan, dan respons terapeutik. Glioblastoma, salah satu bentuk tumor otak yang paling agresif, sulit diobati karena resistensi terhadap terapi dan adaptasi terhadap lingkungan mikro yang tidak bersahabat. NCH640 dikultur dalam media khusus seperti Neurobasal A dengan suplemen seperti B27, dan pertumbuhannya didukung oleh faktor pertumbuhan esensial seperti EGF dan FGF-2. Ini sering digunakan bersama model sel punca glioma lainnya, seperti NCH690 dan NCH644, untuk menyelidiki fenomena biologis ini.
Penelitian tentang NCH640 sangat berfokus pada mekanisme ketahanannya, terutama dalam kondisi hipoksia. Sel-sel glioma seperti NCH640 menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada adaptasi metabolik, termasuk perubahan regulasi spesies oksigen reaktif (ROS). Penelitian telah menunjukkan bahwa penargetan jalur seperti respon stres terintegrasi (ISR) pada NCH640 dan jalur sel terkait dapat meningkatkan sensitivitasnya terhadap terapi seperti temozolomide, yang umumnya digunakan dalam pengobatan glioblastoma. Temuan ini penting untuk merancang strategi baru untuk mengatasi resistensi yang melekat pada sel mirip batang glioma terhadap intervensi terapi standar.

Tisu	Otak
Penyakit	Glioblastoma

KLASIFIKASI

Organisme	Manusia
Seks	Perempuan
Sifat-sifat pertumbuhan	Pengikut
Tingkat keamanan hayati	1

KARAKTERISTIK

Tumorigenik	Ya

PENGIDENTIFIKASI

Referensi

NCH690 (Nomor katalog Cytion 300120)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Nomor Identifikasi Pajak NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_x915

PENANGANAN DAN BUDIDAYA

Media kultur

DMEM: Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L Glukosa, w: 2,5 mM L-Glutamin, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM Natrium piruvat, w: 1,2 g/L NaHCO3 (Nomor artikel Cytion 820400a)

Suasana inkubasi	37°C, 5%CO2, atmosfer yang dilembabkan.

Suplemen

Tambahkan ke dalam medium 5 mg/L heparin, 20 ng/mL bFGF, 20 mikrogram/L EGF, 5 mg/L insulin, 100 mg/L transferrin, 5,2 mikrogram/L natrium selenit, 6,3 mikrogram/L progesteron, 161,1 mikrogram/L putrescin, 50 mg/L hidrokortison

Perbanyakan sel

Untuk subkultur kultur spheroid, mulailah dengan memisahkan spheroid secara mekanis melalui pemipetan ke atas dan ke bawah sebanyak 5 hingga 10 kali menggunakan pipet Eppendorf dengan ujung filter 1000 µl. Setelah itu, sentrifugasi campuran tersebut pada 300g selama 5 menit pada suhu kamar untuk memecah sel. Buang supernatan dan resuspensi pelet sel dalam media kultur segar. Terakhir, pindahkan sel yang telah diresuspensi ke dalam bejana kultur baru untuk mendorong pembentukan sferoid lebih lanjut. Pendekatan ini memastikan pemecahan spheroid yang efisien dan mempersiapkan mereka untuk pertumbuhan berkelanjutan di lingkungan baru

Kepadatan penanaman	1 x 10^5 sel/mL
Pergantian cairan	2 hingga 3 kali per minggu
Pemulihan pasca-pencairan	Setelah pencairan, biarkan sel pulih dari proses pembekuan setidaknya selama 24 hingga 48 jam.

Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran.
Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Media pembekuan	Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan 50% media basal + 40% FBS + 10% DMSO, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

DONATUR

Usia donor	78 tahun
Etnis	Kaukasia

HUKUM DAN KESELAMATAN

Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

Berlaku ketentuan perjanjian pihak ketiga	Yes