Celice SK-LMS-1

300125

SK-LMS-1 je človeška celična linija leiomiosarkoma, ki se pogosto uporablja za raziskave raka, zlasti za raziskave terapevtskih sredstev, namenjenih sarkomom mehkih tkiv. Leiomiosarkom je vrsta malignega tumorja, ki nastane iz gladkih mišičnih tkiv, celična linija SK-LMS-1 pa učinkovito modelira to bolezen in vitro. Te celice izražajo protoonkogen c-Met, ki ima ključno vlogo pri tumorigenezi, proliferaciji in metastaziranju pri številnih vrstah raka, vključno z leiomiosarkomom. Zaradi aberantnega izražanja c-Met v SK-LMS-1 je to dragocen model za preučevanje terapij, usmerjenih na c-Met.
Ena od pomembnih študij je vključevala identifikacijo peptida, ki veže Met, Met-pep1, s pregledovanjem knjižnice s prikazom fagov. Ta peptid je bil specifičen za receptor Met in je lahko tekmoval z rastnim faktorjem hepatocitov (HGF) pri vezavi na receptor ter zaviral proliferacijo tumorskih celic. Celice SK-LMS-1, ki so bile zdravljene z Met-pep1, so pokazale zmanjšano proliferacijo, kar nakazuje, da bi ciljno usmerjanje c-Met s tem peptidom lahko imelo terapevtski potencial. Internalizacija peptida v celicah SK-LMS-1 po vezavi na c-Met dodatno podpira njegov potencial kot diagnostičnega ali terapevtskega sredstva, zlasti v študijah jedrskega slikanja, kjer je bila aktivnost, povezana s tumorjem, uspešno vizualizirana in vivo z uporabo ksenografov SK-LMS-1.
Poleg tega so bile celice SK-LMS-1 uporabljene za raziskovanje učinkov naravnih spojin, kot je Flavokawain B (FKB), halkon, pridobljen iz rastline kava. Ugotovljeno je bilo, da FKB v celicah SK-LMS-1 povzroči zastoj celičnega cikla G2/M in močno apoptozo, kar je posledica povečanja regulacije proapoptotičnih beljakovin, kot so DR5, Bim in Puma, ter zmanjšanja regulacije anti-apoptotične beljakovine survivin. Kombinacija FKB s kemoterapevtiki, kot sta docetaksel in gemcitabin, je imela sinergistični učinek in je še dodatno zavirala rast celic SK-LMS-1.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Opis

SK-LMS-1 je človeška celična linija leiomiosarkoma, ki se pogosto uporablja za raziskave raka, zlasti za raziskave terapevtskih sredstev, namenjenih sarkomom mehkih tkiv. Leiomiosarkom je vrsta malignega tumorja, ki nastane iz gladkih mišičnih tkiv, celična linija SK-LMS-1 pa učinkovito modelira to bolezen in vitro. Te celice izražajo protoonkogen c-Met, ki ima ključno vlogo pri tumorigenezi, proliferaciji in metastaziranju pri številnih vrstah raka, vključno z leiomiosarkomom. Zaradi aberantnega izražanja c-Met v SK-LMS-1 je to dragocen model za preučevanje terapij, usmerjenih na c-Met.
Ena od pomembnih študij je vključevala identifikacijo peptida, ki veže Met, Met-pep1, s pregledovanjem knjižnice s prikazom fagov. Ta peptid je bil specifičen za receptor Met in je lahko tekmoval z rastnim faktorjem hepatocitov (HGF) pri vezavi na receptor ter zaviral proliferacijo tumorskih celic. Celice SK-LMS-1, ki so bile zdravljene z Met-pep1, so pokazale zmanjšano proliferacijo, kar nakazuje, da bi ciljno usmerjanje c-Met s tem peptidom lahko imelo terapevtski potencial. Internalizacija peptida v celicah SK-LMS-1 po vezavi na c-Met dodatno podpira njegov potencial kot diagnostičnega ali terapevtskega sredstva, zlasti v študijah jedrskega slikanja, kjer je bila aktivnost, povezana s tumorjem, uspešno vizualizirana in vivo z uporabo ksenografov SK-LMS-1.
Poleg tega so bile celice SK-LMS-1 uporabljene za raziskovanje učinkov naravnih spojin, kot je Flavokawain B (FKB), halkon, pridobljen iz rastline kava. Ugotovljeno je bilo, da FKB v celicah SK-LMS-1 povzroči zastoj celičnega cikla G2/M in močno apoptozo, kar je posledica povečanja regulacije proapoptotičnih beljakovin, kot so DR5, Bim in Puma, ter zmanjšanja regulacije anti-apoptotične beljakovine survivin. Kombinacija FKB s kemoterapevtiki, kot sta docetaksel in gemcitabin, je imela sinergistični učinek in je še dodatno zavirala rast celic SK-LMS-1.

Tkivo	Vulvar
Bolezen	Leiomiosarkom

Sinonimi

- SKLMS-1
- SKLMS1

RAZVRSTITEV

Organizem	Človek
Seks	Ženska
Lastnosti rasti	Pripadnik

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Stopnja biološke varnosti	1

ZNAČILNOSTI

Morfologija	Fibroblastom podobni
Tumorigeničen	Da, na golih miših. Oblikuje leiomiosarkom

Kariotip

(P12) hipotriploidni do hipertriploidni (+A2, +A3, +C, +D, +E, +F, +G, -A) z nepravilnostmi, vključno z dicentriki, akrocentričnimi fragmenti, prelomi, sekundarnimi zožitvami, minutami in velikimi submetacentričnimi markerji

IDENTIFIKATORJI

Navajanje vira

SK-LMS-1 (kataloška številka Cytion 300125)

Davčna identifikacijska številka NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0628

IZRAŽANJE IN DOVZETNOST

Ekspresija antigena

Krvna skupina O, Rh+

Izoenzimi

Me-2, 2, PGM3, 1-2, PGM1, 1-2, ES-D, 1, AK-1, 1, GLO-1, 1-2, G6PD, B, Fenotip Pogostost izdelka: 0.0027

RAVNANJE IN GOJENJE

Gojišče

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L glukoze, w: 2,5 mM L-glutamina, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM natrijevega piruvata, w: 1,2 g/L NaHCO3 (številka izdelka Cytion 820400a)

Inkubacijska atmosfera	37 °C, 5 %CO2, vlažno ozračje.

Prehranska dopolnila

Gojišče dopolnite z 10 % FBS

Reagenca za disociacijo	Accutase

Preusmeritev v drugo kulturo

Odstranite staro gojišče z adherentnih celic in jih sperite s PBS, ki ne vsebuje kalcija in magnezija. Za bučke T25 uporabite 3-5 ml PBS, za bučke T75 pa 5-10 ml. Nato celice popolnoma prekrijte z Accutase, pri čemer uporabite 1-2 ml za bučke T25 in 2,5 ml za bučke T75. Celice pustite inkubirati pri sobni temperaturi 8-10 minut, da se ločijo. Po inkubaciji celice nežno premešajte z 10 ml gojišča, da se ponovno suspendirajo, nato jih 3 minute centrifugirajte pri 300xg. Zavrzite supernatant, ponovno suspendirajte celice v svežem gojišču in jih prenesite v nove bučke, ki že vsebujejo sveže gojišče.

Obnova tekočine	2 do 3-krat na teden

Odtaljevanje in gojenje

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KAKOVOSTI IN KRIOPREZERVACIJA

Sterilnost

Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence.
Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.

Medij za zamrzovanje	Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (kataloška številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročenega s kriom.

Pogoji shranjevanja

Za dolgotrajno shranjevanje viale postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196 °C. Shranjevanje pri -80 °C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

Pogoji dostave

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno -78 °C. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in viale nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

DONATOR

Starost darovalca	43 let
Etnična pripadnost	Kavkaški

PRAVNE ZADEVE IN VARNOST

Varnostni ukrepi

Pri načrtovanju shranjevanja kriovialov v tekočem dušiku za kasnejše odtaljevanje je treba obvezno upoštevati stroge varnostne ukrepe. Nujni so ustrezne zaščitne rokavice in oblačila, med prenosom zamrznjenih vzorcev v rezervoar s tekočim dušikom ali iz njega pa je potrebna uporaba obrazne maske ali zaščitnih očal. S tem se zmanjša tveganje poškodb zaradi morebitnih eksplozij kriovialov pri odstranjevanju, ki lahko povzročijo izstrelitev ostrih delcev.

Garancija

V podjetju Cytion stojimo za kakovostjo in uporabnostjo svojih izdelkov.
Zagotavljamo, da bodo naše celice ob začetku gojenja še 60 dni po odpremi iz naših obratov vitalne.
Zagotavljamo, da so vsi materiali skladni s specifikacijami, opisanimi v potrdilu o analizi in/ali listu izdelka
Za vse podrobnosti si oglejte našo <a href=""/Kdo smo/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garancijsko izjavo

Potreben je sporazum o prenosu materiala	Yes