Cellules HNO41

300126

La lignée cellulaire HNO41 provient d'un carcinome épidermoïde hypopharyngé, un type de carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC). Cette lignée cellulaire a été caractérisée par plusieurs aberrations chromosomiques, notamment des gains de nombre de copies d'ADN dans des régions chromosomiques telles que 3q23-qter, 5p, 7p, 7q21-q22, 8q22.2-qter, 9q22-qter et 11q13. Ces régions sont connues pour abriter des oncogènes qui contribuent à la progression tumorale, ce qui fait de HNO41 un modèle précieux pour l'étude des mécanismes moléculaires sous-jacents au cancer de l'hypopharynx.
Outre son profil génétique, la lignée cellulaire HNO41 a fait l'objet d'analyses visant à évaluer l'expression de facteurs de croissance angiogéniques, qui jouent un rôle crucial dans le développement tumoral et les métastases. Cette lignée cellulaire présente notamment une forte expression du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF) et du facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF). Ces facteurs participent à la promotion de l'angiogenèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, un processus clé dans la croissance tumorale et les métastases. La présence de ces facteurs dans la lignée HNO41 renforce encore son utilité dans la recherche visant à comprendre l'angiogenèse tumorale et à évaluer les traitements anti-angiogéniques pour le cancer de la tête et du cou (HNSCC).

GENERAL INFORMATION

Description

La lignée cellulaire HNO41 provient d'un carcinome épidermoïde hypopharyngé, un type de carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC). Cette lignée cellulaire a été caractérisée par plusieurs aberrations chromosomiques, notamment des gains de nombre de copies d'ADN dans des régions chromosomiques telles que 3q23-qter, 5p, 7p, 7q21-q22, 8q22.2-qter, 9q22-qter et 11q13. Ces régions sont connues pour abriter des oncogènes qui contribuent à la progression tumorale, ce qui fait de HNO41 un modèle précieux pour l'étude des mécanismes moléculaires sous-jacents au cancer de l'hypopharynx.
Outre son profil génétique, la lignée cellulaire HNO41 a fait l'objet d'analyses visant à évaluer l'expression de facteurs de croissance angiogéniques, qui jouent un rôle crucial dans le développement tumoral et les métastases. Cette lignée cellulaire présente notamment une forte expression du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF) et du facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF). Ces facteurs participent à la promotion de l'angiogenèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, un processus clé dans la croissance tumorale et les métastases. La présence de ces facteurs dans la lignée HNO41 renforce encore son utilité dans la recherche visant à comprendre l'angiogenèse tumorale et à évaluer les traitements anti-angiogéniques pour le cancer de la tête et du cou (HNSCC).

Tissue	Amygdale
Disease	Carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC)

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	De type épithélial

IDENTIFIERS

Citation

HNO41 (numéro de catalogue Cytion 300126)

NCBI TaxID	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_D224

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM, p/v : 4,5 g/L de glucose, p/v : 4 mM de L-glutamine, p/v : 3,7 g/L de $NaHCO_3$, p/v : 1,0 mM de pyruvate de sodium (référence Cytion 820300a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmosphère humidifiée.

Supplements

Ajouter 10 % de FBS au milieu de culture

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Retirez l'ancien milieu des cellules adhérentes et lavez-les avec du PBS sans calcium ni magnésium. Pour les flacons T25, utilisez 3 à 5 ml de PBS, et pour les flacons T75, utilisez 5 à 10 ml. Ensuite, recouvrez complètement les cellules d'Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laissez les cellules incuber à température ambiante pendant 8 à 10 minutes afin de les détacher. Après l'incubation, mélangez délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifugez à 300 x g pendant 3 minutes. Éliminez le surnageant, remettez les cellules en suspension dans du milieu frais, puis transférez-les dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais.

Fluid renewal	2 à 3 fois par semaine

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes par luminescence.
Afin de s'assurer qu'il n'y a aucune contamination bactérienne, fongique ou par des levures, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Freeze medium	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (contenant du sérum fœtal bovin) + 10 % de DMSO pour assurer une viabilité adéquate après décongélation, ou du CM-1 (référence Cytion 800100), qui contient des osmoprotecteurs et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryoconservation.

Storage conditions

Pour une conservation à long terme, placez les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre environ −150 et −196 °C. L'entreposage à −80 °C n'est acceptable qu'à titre d'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Shipping conditions

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées dans de la glace sèche, dans un emballage isotherme validé contenant suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ −78 °C pendant tout le transport. À la réception, inspectez immédiatement le conteneur et transférez sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONOR

Donor age	52 ans
Ethnicity	caucasien

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Lorsqu'on prévoit entreposer un cryotube dans de l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est impératif de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Le port de gants et de vêtements de protection appropriés est essentiel, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de protection est obligatoire lors du transfert d'échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Cette précaution vise à réduire le risque de blessure causé par d'éventuelles explosions de cryotubes lors de leur retrait, pouvant entraîner la projection de fragments coupants.

Warranty

Chez Cytion, nous garantissons la qualité et la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant
60 jours à compter de leur expédition depuis nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le
certificat d'analyse et/ou la fiche technique du produit.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre
déclaration de garantie.

Third-party agreements apply	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB