Bunky CADO-ES1

300127

Bunková línia CADO-ES1 bola vytvorená z malígneho pleurálneho výpotku odobratého 19-ročnej pacientke s diagnózou Ewingovho sarkómu, ktorý sa nachádzal predovšetkým v pravej časti zadku s početnými metastázami v pľúcach. Táto bunková línia poskytuje cenný nástroj na výskum v oblasti biológie sarkómov, najmä pri štúdiu metastatických procesov spojených s Ewingovým sarkómom. Ewingov sarkóm ako ochorenie postihujúce predovšetkým deti a mladých dospelých je charakterizovaný malými okrúhlymi bunkami, ktoré sú vysoko malígne, často vykazujú agresívne správanie a zlú prognózu, najmä ak metastázujú.
Bunky CADO-ES1 vykazujú jedinečne niekoľko kritických vlastností cenných pre hĺbkový výskum rakoviny. Sú heterotransplantovateľné, čo znamená, že ich možno transplantovať do iného druhu (napr. myší), čo je nevyhnutné pre štúdie in vivo. Táto schopnosť z nich robí robustný model na štúdium rastu nádorov a metastáz v kontrolovanom, ale biologicky relevantnom systéme. Okrem toho tieto bunky preukázali schopnosť rásť nezávisle od ukotvenia, čo je vlastnosť typická pre mnohé rakovinové bunky, ktorá im umožňuje prosperovať bez priľnutia k extracelulárnej matrici. Okrem toho sa bunky CADO-ES1 môžu neurálne diferencovať v reakcii na cyklický AMP (cAMP), čo poskytuje jedinečný pohľad na bunkové správanie ovplyvnené signálnymi dráhami pri progresii a diferenciácii rakoviny.
Táto kombinácia vlastností robí z CADO-ES1 významný model nielen pre pochopenie patológie Ewingovho sarkómu, ale aj pre vývoj a testovanie cielených terapií, ktoré by mohli inhibovať rast a šírenie podobných druhov rakoviny. Výskum využívajúci túto bunkovú líniu môže prispieť k hlbšiemu pochopeniu správania rakovinových buniek, mechanizmov metastázovania a potenciálnych terapeutických cieľov pri sarkómoch.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

Bunková línia CADO-ES1 bola vytvorená z malígneho pleurálneho výpotku odobratého 19-ročnej pacientke s diagnózou Ewingovho sarkómu, ktorý sa nachádzal predovšetkým v pravej časti zadku s početnými metastázami v pľúcach. Táto bunková línia poskytuje cenný nástroj na výskum v oblasti biológie sarkómov, najmä pri štúdiu metastatických procesov spojených s Ewingovým sarkómom. Ewingov sarkóm ako ochorenie postihujúce predovšetkým deti a mladých dospelých je charakterizovaný malými okrúhlymi bunkami, ktoré sú vysoko malígne, často vykazujú agresívne správanie a zlú prognózu, najmä ak metastázujú.
Bunky CADO-ES1 vykazujú jedinečne niekoľko kritických vlastností cenných pre hĺbkový výskum rakoviny. Sú heterotransplantovateľné, čo znamená, že ich možno transplantovať do iného druhu (napr. myší), čo je nevyhnutné pre štúdie in vivo. Táto schopnosť z nich robí robustný model na štúdium rastu nádorov a metastáz v kontrolovanom, ale biologicky relevantnom systéme. Okrem toho tieto bunky preukázali schopnosť rásť nezávisle od ukotvenia, čo je vlastnosť typická pre mnohé rakovinové bunky, ktorá im umožňuje prosperovať bez priľnutia k extracelulárnej matrici. Okrem toho sa bunky CADO-ES1 môžu neurálne diferencovať v reakcii na cyklický AMP (cAMP), čo poskytuje jedinečný pohľad na bunkové správanie ovplyvnené signálnymi dráhami pri progresii a diferenciácii rakoviny.
Táto kombinácia vlastností robí z CADO-ES1 významný model nielen pre pochopenie patológie Ewingovho sarkómu, ale aj pre vývoj a testovanie cielených terapií, ktoré by mohli inhibovať rast a šírenie podobných druhov rakoviny. Výskum využívajúci túto bunkovú líniu môže prispieť k hlbšiemu pochopeniu správania rakovinových buniek, mechanizmov metastázovania a potenciálnych terapeutických cieľov pri sarkómoch.

Tkanivo	Kosti
Choroba	Ewingov sarkóm

Synonymá

- CADO-ES-1
- CADO ES1
- CADOES1
- CADO-ES
- Cado-ES
- ESCADO1
- Center for Adult Diseases Osaka-Ewing Sarcoma 1

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Človek

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Sex	Žena
Rastové vlastnosti	Prívrženec
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKY

Morfológia	Malé okrúhle bunky

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

CADO-ES1 (katalógové číslo Cytion 300127)

Daňové identifikačné číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1103

PREJAV A NÁCHYLNOSŤ

Exprimované receptory

CD99 (Eun Jung Lee, 2003)

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilný glutamín, w: 2,0 g/L NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 10 % tepelne inaktivovaného FBS

Disociačné činidlo	Accutase

Rozmnožovanie kultúr

Odstráňte staré médium z adherovaných buniek a premyte ich PBS, ktorý neobsahuje vápnik a horčík. Pre banky T25 použite 3 - 5 ml PBS a pre banky T75 použite 5 - 10 ml. Potom bunky úplne pokryte Accutase, pričom použite 1 - 2 ml pre banky T25 a 2,5 ml pre banky T75. Nechajte bunky inkubovať pri izbovej teplote 8-10 minút, aby sa oddelili. Po inkubácii jemne premiešajte bunky s 10 ml média, aby boli znovu suspendované, a potom ich 3 minúty odstreďujte pri 300xg. Supernatant zlikvidujte, bunky znovu rozmiešajte v čerstvom médiu a preneste ich do nových fliaš, ktoré už obsahujú čerstvé médium.

Obnova kvapaliny	Každé 3 až 4 dni
Zotavenie po rozmrazení	Po rozmrazení naneste bunky v koncentrácii 5 x 10^4 buniek/cm^2 a nechajte bunky zotaviť sa z procesu zmrazenia a prilnúť aspoň 24 hodín.

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Vek darcu	19 rokov
Etnická príslušnosť	Japonský

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes