BT-20 cellák

300130

A BT-20 sejtvonal egy humán emlő adenokarcinóma sejtvonal, amelyet 1958-ban hoztak létre egy 74 éves kaukázusi nőbeteg rosszindulatú szövetéből. Ez a sejtvonal epithelszerű morfológiát mutat, és gyakran használják az emlőrák biológiájával foglalkozó kutatásokban, különösen a rák növekedésének hormonális szabályozását, a génexpressziót és az emlőrák elleni terápiás szerek hatékonyságát vizsgáló tanulmányokban.
A BT-20 sejteket az jellemzi, hogy immunhiányos egerekbe ültetve képesek daganatot képezni, így az emlőrák hasznos in vivo modelljeként szolgálnak. Ezek a sejtek ösztrogén-, progeszteron- és androgénreceptorokat expresszálnak, így fontosak a hormonválasz útvonalainak vizsgálatához. A BT-20 sejtek genetikai elemzése emellett mutációkat mutatott ki olyan génekben, mint a TP53 és a PIK3CA, amelyek gyakoriak az emlőrákban, ami alátámasztja a genetikai és farmakológiai kutatásokban való felhasználásukat.
In vitro a BT-20 sejteket a rákos sejtek proliferációs, migrációs és inváziós mechanizmusainak tanulmányozására használják. A kemoterápiás szerek citotoxicitásának értékelésére is alkalmazzák őket, ami kritikus jelentőségűvé teszi őket a rákellenes gyógyszerek preklinikai tesztelésében. A BT-20 sejtek különböző tenyésztési körülményekhez való alkalmazkodóképessége és robusztus in vitro növekedésük értékes forrássá teszi őket az emlőrák mögöttes mechanizmusaira és új terápiás stratégiák kifejlesztésére összpontosító rákkutató laboratóriumok számára.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

A BT-20 sejtvonal egy humán emlő adenokarcinóma sejtvonal, amelyet 1958-ban hoztak létre egy 74 éves kaukázusi nőbeteg rosszindulatú szövetéből. Ez a sejtvonal epithelszerű morfológiát mutat, és gyakran használják az emlőrák biológiájával foglalkozó kutatásokban, különösen a rák növekedésének hormonális szabályozását, a génexpressziót és az emlőrák elleni terápiás szerek hatékonyságát vizsgáló tanulmányokban.
A BT-20 sejteket az jellemzi, hogy immunhiányos egerekbe ültetve képesek daganatot képezni, így az emlőrák hasznos in vivo modelljeként szolgálnak. Ezek a sejtek ösztrogén-, progeszteron- és androgénreceptorokat expresszálnak, így fontosak a hormonválasz útvonalainak vizsgálatához. A BT-20 sejtek genetikai elemzése emellett mutációkat mutatott ki olyan génekben, mint a TP53 és a PIK3CA, amelyek gyakoriak az emlőrákban, ami alátámasztja a genetikai és farmakológiai kutatásokban való felhasználásukat.
In vitro a BT-20 sejteket a rákos sejtek proliferációs, migrációs és inváziós mechanizmusainak tanulmányozására használják. A kemoterápiás szerek citotoxicitásának értékelésére is alkalmazzák őket, ami kritikus jelentőségűvé teszi őket a rákellenes gyógyszerek preklinikai tesztelésében. A BT-20 sejtek különböző tenyésztési körülményekhez való alkalmazkodóképessége és robusztus in vitro növekedésük értékes forrássá teszi őket az emlőrák mögöttes mechanizmusaira és új terápiás stratégiák kifejlesztésére összpontosító rákkutató laboratóriumok számára.

Szövet	Mell, emlőmirigy
Betegség	Invazív ductus carcinoma

Szinonimák

- BT 20
- BT20

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Nő
Növekedési tulajdonságok	Hűséges
Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Morfológia	Epithelszerű

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Daganatképző	Igen, meztelen egereken. II. fokozatú adenokarcinómákat képez

Kariotípus

Modális szám = 50, sok marker, nagy szubtelocentrikussággal a legjellemzőbb. (P87) Hiperdiploid, rendellenességekkel, beleértve a töredezett kromoszómákat, töréseket, másodlagos szűkületeket, transzlokációkat, szubmetacentrikus és telocentrikus markereket

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

BT-20 (Cytion katalógusszám: 300130)

NCBI adóazonosító szám	9606
Cellosaurus	CVCL_0178

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Antigén-expresszió

HLA A1, Bw16 (+/-)

Izoenzimek

PGM3, 1, PGM1, 1, ES-D, 1, AK-1, 1-2, G6PD, B, GLO-1, 1-2, Phenotype Frequency Product: 0.0115

Onkogének

Wnt4 +, wnt7h +

Mutációs profil

TP53 mut

Fordított transzkriptáz	Negatív

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L glükóz, w: 2,5 mM L-Glutamin, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM nátrium-piruvát, w: 1,2 g/L NaHCO3 (Cytion 820400a cikkszám)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.

Kiegészítők

A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel

Diszociációs reagens	Accutase

Átültetés

Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.

Ültetési sűrűség	1 x 10^4 sejt/cm^2 körülbelül 6 nap alatt konfluens réteget képez.
Folyadékcsere	hetente 2-3 alkalommal

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	74 év
Etnikai hovatartozás	Kaukázusi

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes