Células BT-549

300132

Las células BT-549 son una línea celular humana de cáncer de mama derivada del tejido de la glándula mamaria de una mujer caucásica de 72 años con carcinoma ductal. Se utilizan habitualmente en la investigación oncológica para estudiar la biología y el tratamiento del cáncer de mama, en particular el subtipo triple negativo, que carece de expresión del receptor de estrógeno, el receptor de progesterona y HER2. Las células BT-549 se caracterizan por su morfología epitelial y son conocidas por sus propiedades altamente invasivas, lo que las convierte en un modelo valioso para estudiar la metástasis y la invasión tumoral. Presentan varios rasgos distintivos, como la presencia de gotas de lípidos en el citoplasma y una fuerte expresión de la proteína mucina-1. Estas células también expresan varios oncogenes. Estas células también expresan varios oncogenes y genes supresores de tumores relevantes para la patología del cáncer de mama, como TP53 y RB1. La línea celular BT-549 es negativa para el receptor de estrógenos, negativa para el receptor de progesterona y no amplifica HER2, lo que la clasifica en el subtipo de cáncer de mama triple negativo (TNBC). Debido a esta clasificación, las células BT-549 son particularmente útiles para estudiar los mecanismos únicos de progresión y respuesta al tratamiento en el TNBC, que es conocido por su naturaleza agresiva y la falta de terapias dirigidas.
Además, las células BT-549 se utilizan a menudo en estudios de resistencia a fármacos y para probar nuevos agentes quimioterapéuticos y terapias dirigidas, ofreciendo información sobre posibles estrategias terapéuticas para controlar y tratar formas agresivas de cáncer de mama.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción

Las células BT-549 son una línea celular humana de cáncer de mama derivada del tejido de la glándula mamaria de una mujer caucásica de 72 años con carcinoma ductal. Se utilizan habitualmente en la investigación oncológica para estudiar la biología y el tratamiento del cáncer de mama, en particular el subtipo triple negativo, que carece de expresión del receptor de estrógeno, el receptor de progesterona y HER2. Las células BT-549 se caracterizan por su morfología epitelial y son conocidas por sus propiedades altamente invasivas, lo que las convierte en un modelo valioso para estudiar la metástasis y la invasión tumoral. Presentan varios rasgos distintivos, como la presencia de gotas de lípidos en el citoplasma y una fuerte expresión de la proteína mucina-1. Estas células también expresan varios oncogenes. Estas células también expresan varios oncogenes y genes supresores de tumores relevantes para la patología del cáncer de mama, como TP53 y RB1. La línea celular BT-549 es negativa para el receptor de estrógenos, negativa para el receptor de progesterona y no amplifica HER2, lo que la clasifica en el subtipo de cáncer de mama triple negativo (TNBC). Debido a esta clasificación, las células BT-549 son particularmente útiles para estudiar los mecanismos únicos de progresión y respuesta al tratamiento en el TNBC, que es conocido por su naturaleza agresiva y la falta de terapias dirigidas.
Además, las células BT-549 se utilizan a menudo en estudios de resistencia a fármacos y para probar nuevos agentes quimioterapéuticos y terapias dirigidas, ofreciendo información sobre posibles estrategias terapéuticas para controlar y tratar formas agresivas de cáncer de mama.

Pañuelo de papel	Pecho, glándula mamaria
Enfermedad	Carcinoma ductal invasivo
Lugar de metástasis	Ductal

Sinónimos

- BT 549
- BT.549
- BT549

CLASIFICACIÓN

Organismo	Humano
Sexo	Mujer
Propiedades de crecimiento	Adherente
Nivel de bioseguridad	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

CARACTERÍSTICAS

Morfología	De tipo epitelial

Cariotipo

Modo = 74, rango = 53 a 140, tres cromosomas marcadores

IDENTIFICADORES

Referencia

BT-549 (número de catálogo 300132 de Cytion)

N.º de identificación fiscal del NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1092

EXPRESIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD

Isoenzimas

G6PD, B, PGM1, 2, PGM3, 1, ES-D, 1, Me-2, 1, AK-1, 1, GLO-1, 1-2, Producto de Frecuencia de Fenotipo: 0.0048

Perfil mutacional

TP53 mut

MANEJO Y CULTIVO

Medio de cultivo

DMEM, w: 4,5 g/L de glucosa, w: 4 mM de L-glutamina, w: 3,7 g/L de NaHCO3, w: 1,0 mM de piruvato sódico (número de artículo de Cytion 820300a)

Atmósfera de incubación	37°C, 5%CO2, atmósfera humidificada.

Suplementos

Complementar el medio con un 10% de FBS

Reactivo de disociación	Accutase

Subcultivo

Retire el medio antiguo de las células adheridas y lávelas con PBS que carezca de calcio y magnesio. Para matraces T25, utilice 3-5 ml de PBS, y para matraces T75, utilice 5-10 ml. A continuación, cubra completamente las células con Accutase, utilizando 1-2 ml para matraces T25 y 2,5 ml para matraces T75. Deje incubar las células a temperatura ambiente durante 8-10 minutos para desprenderlas. Tras la incubación, mezclar suavemente las células con 10 ml de medio para resuspenderlas y, a continuación, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Desechar el sobrenadante, resuspender las células en medio fresco y transferirlas a nuevos matraces que ya contengan medio fresco.

Densidad de siembra	1 x 10^4 células/cm^2 producirán una capa confluente en aproximadamente 4 días.
Renovación de fluidos	de 2 a 3 veces por semana
Recuperación tras la descongelación	Después de descongelar, siembre las células a 5 x 10^4 células/cm^2 y deje que las células se recuperen del proceso de congelación y se adhieran durante al menos 24 horas.

Descongelación y cultivo

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROL DE CALIDAD Y CRIOPRESERVACIÓN

Esterilidad

La contaminación por micoplasma se excluye utilizando tanto ensayos basados en la PCR como métodos de detección de micoplasma basados en la luminiscencia.
Para garantizar la ausencia de contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.

Medio de congelación	Como medio de criopreservación, utilizamos el medio de crecimiento completo (incluido FBS) + 10% DMSO para una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo 800100 de Cytion), que incluye osmoprotectores optimizados y estabilizadores metabólicos para mejorar la recuperación y reducir el estrés crioinducido.

Condiciones de almacenamiento

Para la conservación a largo plazo, colocar los viales en nitrógeno líquido en fase vapor a una temperatura aproximada de -150 a -196 °C. El almacenamiento a -80 °C sólo es aceptable como breve paso intermedio antes de la transferencia al nitrógeno líquido.

Condiciones de envío

Las líneas celulares crioconservadas se envían en hielo seco en envases validados y aislados con suficiente refrigerante para mantener aproximadamente -78 °C durante el tránsito. A la recepción, inspeccione el envase inmediatamente y transfiera los viales sin demora al almacenamiento adecuado.

DONANTE

Edad del donante	72 años
Origen étnico	Caucásico

ASPECTOS LEGALES Y DE SEGURIDAD

Medidas de seguridad

Cuando se planea almacenar un criovial en nitrógeno líquido para su futura descongelación, es obligatorio cumplir estrictas medidas de seguridad. Es esencial utilizar guantes y ropa de protección adecuados, así como una mascarilla o gafas de seguridad durante el traslado de muestras congeladas desde o hacia el tanque de nitrógeno líquido. Con ello se pretende mitigar el riesgo de lesiones por posibles explosiones crioviales al extraerlas, que pueden dar lugar a la proyección de fragmentos afilados.

Garantía

En Cytion, respaldamos la calidad y viabilidad de nuestros productos.
Garantizamos que nuestras células serán viables al inicio del cultivo durante los 60 días posteriores al envío desde nuestras instalaciones.
Aseguramos que todos los materiales se ajustan a las especificaciones descritas en el Certificado de Análisis y/o Hoja de Producto
Para más información, consulte nuestra <a href=""/Quiénes somos/Garantía/"" hreflang=""x-default"">Declaración de garantía

Se requiere un acuerdo de transferencia de material	Yes