Sel BT-549

300132

Sel BT-549 adalah garis sel kanker payudara manusia yang berasal dari jaringan kelenjar susu seorang wanita Kaukasia berusia 72 tahun dengan karsinoma duktal. Sel ini umumnya digunakan dalam penelitian kanker untuk mempelajari biologi dan pengobatan kanker payudara, khususnya subtipe triple-negatif, yang tidak memiliki reseptor estrogen, reseptor progesteron, dan ekspresi HER2.

Sel BT-549 dicirikan oleh morfologi epitelnya dan dikenal karena sifatnya yang sangat invasif, menjadikannya model yang berharga untuk mempelajari metastasis dan invasi tumor. Sel ini menunjukkan beberapa ciri khas termasuk adanya tetesan lipid dalam sitoplasma dan ekspresi protein mucin-1 yang kuat. Sel-sel ini juga mengekspresikan berbagai onkogen dan gen penekan tumor yang relevan dengan patologi kanker payudara, seperti TP53 dan RB1.

Garis sel BT-549 adalah reseptor estrogen-negatif, reseptor progesteron-negatif, dan tidak mengamplifikasi HER2, sehingga mengkategorikannya di bawah subtipe kanker payudara triple-negatif (TNBC). Karena klasifikasi ini, sel BT-549 sangat berguna untuk mempelajari mekanisme unik perkembangan dan respons pengobatan pada TNBC, yang dikenal karena sifatnya yang agresif dan kurangnya terapi yang ditargetkan.

Selain itu, sel BT-549 sering digunakan dalam studi resistensi obat dan untuk menguji agen kemoterapi baru dan terapi yang ditargetkan, yang menawarkan wawasan tentang strategi terapeutik potensial untuk mengelola dan mengobati bentuk kanker payudara yang agresif.

INFORMASI UMUM

Deskripsi

Sel BT-549 adalah garis sel kanker payudara manusia yang berasal dari jaringan kelenjar susu seorang wanita Kaukasia berusia 72 tahun dengan karsinoma duktal. Sel ini umumnya digunakan dalam penelitian kanker untuk mempelajari biologi dan pengobatan kanker payudara, khususnya subtipe triple-negatif, yang tidak memiliki reseptor estrogen, reseptor progesteron, dan ekspresi HER2.

Sel BT-549 dicirikan oleh morfologi epitelnya dan dikenal karena sifatnya yang sangat invasif, menjadikannya model yang berharga untuk mempelajari metastasis dan invasi tumor. Sel ini menunjukkan beberapa ciri khas termasuk adanya tetesan lipid dalam sitoplasma dan ekspresi protein mucin-1 yang kuat. Sel-sel ini juga mengekspresikan berbagai onkogen dan gen penekan tumor yang relevan dengan patologi kanker payudara, seperti TP53 dan RB1.

Garis sel BT-549 adalah reseptor estrogen-negatif, reseptor progesteron-negatif, dan tidak mengamplifikasi HER2, sehingga mengkategorikannya di bawah subtipe kanker payudara triple-negatif (TNBC). Karena klasifikasi ini, sel BT-549 sangat berguna untuk mempelajari mekanisme unik perkembangan dan respons pengobatan pada TNBC, yang dikenal karena sifatnya yang agresif dan kurangnya terapi yang ditargetkan.

Selain itu, sel BT-549 sering digunakan dalam studi resistensi obat dan untuk menguji agen kemoterapi baru dan terapi yang ditargetkan, yang menawarkan wawasan tentang strategi terapeutik potensial untuk mengelola dan mengobati bentuk kanker payudara yang agresif.

Tisu	Payudara, kelenjar susu
Penyakit	Karsinoma duktal invasif
Lokasi metastasis	Ductal

Sinonim

- BT 549
- BT.549
- BT549

KLASIFIKASI

Organisme	Manusia
Seks	Perempuan
Sifat-sifat pertumbuhan	Pengikut
Tingkat keamanan hayati	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

KARAKTERISTIK

Morfologi	Seperti epitel

Kariotipe

Modus = 74, rentang = 53 hingga 140, tiga kromosom penanda

PENGIDENTIFIKASI

Referensi

BT-549 (Nomor katalog Cytion 300132)

Nomor Identifikasi Pajak NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1092

EKSPRESI DAN KERENTANAN

Isoenzim

G6PD, B, PGM1, 2, PGM3, 1, ES-D, 1, Me-2, 1, AK-1, 1, GLO-1, 1-2, Produk Frekuensi Fenotipe: 0.0048

Profil mutasi

TP53 mut

PENANGANAN DAN BUDIDAYA

Media kultur

DMEM, w: 4,5 g/L Glukosa, w: 4 mM L-Glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM Natrium piruvat (Nomor artikel Cytion 820300a)

Suasana inkubasi	37°C, 5%CO2, atmosfer yang dilembabkan.

Suplemen

Tambahkan media dengan 10% FBS

Reagen disosiasi	Accutase

Perbanyakan sel

Buang media lama dari sel yang melekat dan cuci dengan PBS yang tidak mengandung kalsium dan magnesium. Untuk labu T25, gunakan 3-5 ml PBS, dan untuk labu T75, gunakan 5-10 ml. Kemudian, tutupi sel sepenuhnya dengan Accutase, menggunakan 1-2 ml untuk labu T25 dan 2,5 ml untuk labu T75. Biarkan sel diinkubasi pada suhu kamar selama 8-10 menit untuk melepaskannya. Setelah inkubasi, campurkan sel secara perlahan dengan 10 ml medium untuk meresuspensi sel, kemudian sentrifugasi pada 300xg selama 3 menit. Buang supernatan, resuspensi sel dalam medium segar, dan pindahkan ke dalam labu baru yang sudah berisi medium segar.

Kepadatan penanaman	1 x 10^4 sel/cm^2 akan membentuk lapisan yang padat dalam waktu sekitar 4 hari.
Pergantian cairan	2 hingga 3 kali per minggu
Pemulihan pasca-pencairan	Setelah dicairkan, tanam sel pada kepadatan 5 x 10^4 sel/cm^2 dan biarkan sel pulih dari proses pembekuan serta menempel setidaknya selama 24 jam.

Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran.
Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Media pembekuan	Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan media pertumbuhan lengkap (termasuk FBS) + 10% DMSO untuk viabilitas pasca-pencairan yang memadai, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

DONATUR

Usia donor	72 tahun
Etnis	Kaukasia

HUKUM DAN KESELAMATAN

Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

Diperlukan Perjanjian Transfer Material	Yes