Sel BV-173

300133

Garis sel BV-173 berasal dari darah tepi pasien yang didiagnosis dengan leukemia myeloid kronis kromosom-positif (Ph+) Philadelphia, yang didirikan pada tahun 1980. Garis sel ini secara khusus terkenal karena status Ph+-nya, yang mengindikasikan kelainan kromosom spesifik yang melibatkan translokasi antara kromosom 9 dan kromosom 22. Translokasi ini, yang sering disebut sebagai kromosom Philadelphia, menghasilkan gen fusi BCR-ABL, sebuah ciri molekuler penting yang mendorong patogenesis CML dengan mendorong proliferasi dan kelangsungan hidup sel leukemia.
Sel BV-173 digunakan secara luas dalam penelitian hematologi sebagai model untuk mempelajari mekanisme seluler dan molekuler CML, terutama dalam konteks resistensi obat dan respons seluler terhadap inhibitor tirosin kinase (TKI), yang menargetkan protein fusi BCR-ABL. Garis sel telah berperan penting dalam studi praklinis untuk mengevaluasi strategi terapi baru dan memahami biologi CML. BV-173 menunjukkan karakteristik yang khas dari sel garis keturunan myeloid dan sering digunakan untuk mempelajari jalur transduksi sinyal yang mengalami deregulasi pada CML karena onkogen BCR-ABL.

INFORMASI UMUM

Deskripsi

Garis sel BV-173 berasal dari darah tepi pasien yang didiagnosis dengan leukemia myeloid kronis kromosom-positif (Ph+) Philadelphia, yang didirikan pada tahun 1980. Garis sel ini secara khusus terkenal karena status Ph+-nya, yang mengindikasikan kelainan kromosom spesifik yang melibatkan translokasi antara kromosom 9 dan kromosom 22. Translokasi ini, yang sering disebut sebagai kromosom Philadelphia, menghasilkan gen fusi BCR-ABL, sebuah ciri molekuler penting yang mendorong patogenesis CML dengan mendorong proliferasi dan kelangsungan hidup sel leukemia.
Sel BV-173 digunakan secara luas dalam penelitian hematologi sebagai model untuk mempelajari mekanisme seluler dan molekuler CML, terutama dalam konteks resistensi obat dan respons seluler terhadap inhibitor tirosin kinase (TKI), yang menargetkan protein fusi BCR-ABL. Garis sel telah berperan penting dalam studi praklinis untuk mengevaluasi strategi terapi baru dan memahami biologi CML. BV-173 menunjukkan karakteristik yang khas dari sel garis keturunan myeloid dan sering digunakan untuk mempelajari jalur transduksi sinyal yang mengalami deregulasi pada CML karena onkogen BCR-ABL.

Tisu	Darah
Penyakit	Leukemia myeloid kronis

KLASIFIKASI

Organisme	Manusia
Seks	Laki-laki
Sifat-sifat pertumbuhan	Penangguhan
Tingkat keamanan hayati	1

KARAKTERISTIK

Jenis sel	Sel-sel ledakan yang tidak berdiferensiasi
Status ploidi	T (9, 22) Angka Modal: 2n = 46
Waktu penggandaan	35 jam

PENGIDENTIFIKASI

Referensi

BV-173 (Nomor katalog Cytion 300133)

Nomor Identifikasi Pajak NCBI	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_0181

EKSPRESI DAN KERENTANAN

Profil mutasi

B2a2 BCR-ABL

Transkriptase balik	Negatif (ELISA)

PENANGANAN DAN BUDIDAYA

Media kultur

RPMI 1640, w: 2,0 mM Glutamin stabil, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Nomor artikel Cytion 820700a)

Suasana inkubasi	37°C, 5%CO2, atmosfer yang dilembabkan.

Suplemen

Lengkapi media dengan 10% FBS yang dinonaktifkan dengan panas

Perbanyakan sel

Pertahankan kultur dengan secara berkala menambahkan atau mengganti medium. Mulailah kultur dengan kepadatan 5 x 10^5 sel/ml dan jaga konsentrasi sel dalam rentang 3 x 10^5 hingga 1 x 10^6 sel/ml untuk pertumbuhan optimal.

Kepadatan penanaman	1 x 10^5 sel/ml
Pergantian cairan	2 hingga 3 kali per minggu
Pemulihan pasca-pencairan	Biarkan sel pulih dari proses pembekuan setidaknya selama 48 jam.

Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran.
Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Media pembekuan	Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan media pertumbuhan lengkap (termasuk FBS) + 10% DMSO untuk viabilitas pasca-pencairan yang memadai, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

DONATUR

Usia donor	45 tahun
Etnis	Kaukasia

HUKUM DAN KESELAMATAN

Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

Diperlukan Perjanjian Transfer Material	Yes