Buňky HNO210

300134

Buněčná linie HNO210 je odvozena od dlaždicobuněčného karcinomu hrtanu, podtypu dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku (HNSCC). Tato buněčná linie byla podrobně charakterizována z hlediska svých genetických a molekulárních vlastností, což z ní činí cenný model pro studium patogeneze a reakce na léčbu HNSCC. Analýza chromozomální komparativní genomové hybridizace (cCGH) u HNO210 odhalila několik významných chromozomálních aberací. Zejména vykazuje nárůst počtu kopií DNA v chromozomálních oblastech 3q, 7p, 7q, 9p, 9q, 20p a 20q a ztráty počtu kopií v oblastech 3p, 4p, 4q a chromozomu 21. V případě HHNOXu se jedná o nárůst počtu kopií DNA v chromozomálních oblastech 3q, 7p, 7q, 9p, 9q, 20p a 20q. Tyto genetické změny jsou u HNSCC běžné a jsou spojeny s agresivním chováním nádoru a špatnou prognózou pacientů.
Zajímavá je zejména amplifikace oblastí, jako jsou 3q a 11q13, která se vyskytuje u mnoha buněčných linií HNSCC, a to kvůli její korelaci se zvýšenou expresí onkogenů, jako jsou CCND1 (cyklin D1) a CTTN (kortaktin). Tyto geny se podílejí na regulaci buněčného cyklu, respektive na organizaci cytoskeletu, a jejich nadměrná exprese může přispívat ke zvýšené buněčné proliferaci, invazi a metastazování. Buněčná linie HNO210 se svým odlišným genetickým profilem slouží jako robustní model pro zkoumání molekulárních mechanismů, které jsou základem progrese rakoviny hrtanu, a pro testování cílených terapií, které se zabývají těmito specifickými genetickými abnormalitami.
Kromě toho je tato buněčná linie součástí panelu používaného ke zkoumání účinnosti kombinovaných terapií, jako je použití cisplatiny s thalidomidem, které se ukázaly jako slibné při zvyšování protinádorové aktivity in vitro a in vivo. Díky tomu je HNO210 klíčový nejen pro základní výzkum rakoviny, ale také pro translační studie zaměřené na zlepšení léčebných výsledků u pacientů s HNSCC.

OBECNÉ INFORMACE

Popis

Buněčná linie HNO210 je odvozena od dlaždicobuněčného karcinomu hrtanu, podtypu dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku (HNSCC). Tato buněčná linie byla podrobně charakterizována z hlediska svých genetických a molekulárních vlastností, což z ní činí cenný model pro studium patogeneze a reakce na léčbu HNSCC. Analýza chromozomální komparativní genomové hybridizace (cCGH) u HNO210 odhalila několik významných chromozomálních aberací. Zejména vykazuje nárůst počtu kopií DNA v chromozomálních oblastech 3q, 7p, 7q, 9p, 9q, 20p a 20q a ztráty počtu kopií v oblastech 3p, 4p, 4q a chromozomu 21. V případě HHNOXu se jedná o nárůst počtu kopií DNA v chromozomálních oblastech 3q, 7p, 7q, 9p, 9q, 20p a 20q. Tyto genetické změny jsou u HNSCC běžné a jsou spojeny s agresivním chováním nádoru a špatnou prognózou pacientů.
Zajímavá je zejména amplifikace oblastí, jako jsou 3q a 11q13, která se vyskytuje u mnoha buněčných linií HNSCC, a to kvůli její korelaci se zvýšenou expresí onkogenů, jako jsou CCND1 (cyklin D1) a CTTN (kortaktin). Tyto geny se podílejí na regulaci buněčného cyklu, respektive na organizaci cytoskeletu, a jejich nadměrná exprese může přispívat ke zvýšené buněčné proliferaci, invazi a metastazování. Buněčná linie HNO210 se svým odlišným genetickým profilem slouží jako robustní model pro zkoumání molekulárních mechanismů, které jsou základem progrese rakoviny hrtanu, a pro testování cílených terapií, které se zabývají těmito specifickými genetickými abnormalitami.
Kromě toho je tato buněčná linie součástí panelu používaného ke zkoumání účinnosti kombinovaných terapií, jako je použití cisplatiny s thalidomidem, které se ukázaly jako slibné při zvyšování protinádorové aktivity in vitro a in vivo. Díky tomu je HNO210 klíčový nejen pro základní výzkum rakoviny, ale také pro translační studie zaměřené na zlepšení léčebných výsledků u pacientů s HNSCC.

Tkáň	Hrtan
Nemoc	Spinocelulární karcinom hlavy a krku (HNSCC)

KLASIFIKACE

Organismus	Člověk
Sex	Muž
Růstové vlastnosti	Přívrženec
Úroveň biologické bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKA

Morfologie	Epitelu podobné

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIKÁTORY

Citace

HNO210 (katalogové číslo Cytion 300134)

Daňové identifikační číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_D215

MANIPULACE A CHOV

Pěstovací médium

DMEM, w: 4,5 g/l glukózy, w: 4 mM L-glutaminu, w: 3,7 g/l NaHCO3, w: 1,0 mM pyruvátu sodného (číslo výrobku Cytion 820300a)

Inkubační atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplňky stravy

Doplňte médium o 10% FBS

Disociační činidlo	Accutase

Subkultivace

Odstraňte staré médium z adherovaných buněk a promyjte je PBS bez vápníku a hořčíku. Pro baňky T25 použijte 3-5 ml PBS a pro baňky T75 5-10 ml. Poté buňky zcela zakryjte přípravkem Accutase, přičemž použijte 1-2 ml pro baňky T25 a 2,5 ml pro baňky T75. Nechte buňky inkubovat při pokojové teplotě po dobu 8-10 minut, aby se oddělily. Po inkubaci jemně promíchejte buňky s 10 ml média, aby byly znovu suspendovány, a poté je odstřeďte při 300xg po dobu 3 minut. Supernatant vyhoďte, buňky znovu rozpusťte v čerstvém médiu a přeneste je do nových baněk, které již obsahují čerstvé médium.

Obnova tekutin	2 až 3krát týdně

Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

Mrazicí médium	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Dopravní podmínky

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

DÁRCE

Věk dárce	69 let
Etnická příslušnost	Kavkazský

PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

Záruka

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

Platí smlouvy s třetími stranami	Yes