HNO210-celler

300134

HNO210-cellelinjen stammer fra et laryngealt pladecellekarcinom, en undertype af pladecellekarcinom i hoved og hals (HNSCC). Denne cellelinje er blevet grundigt karakteriseret for sine genetiske og molekylære egenskaber, hvilket gør den til en værdifuld model til undersøgelse af patogenesen og behandlingsresponsen af HNSCC. Kromosomal komparativ genomisk hybridisering (cCGH) af HNO210 har afsløret flere signifikante kromosomale aberrationer. Især udviser den DNA-kopiantalsgevinster i kromosomregionerne 3q, 7p, 7q, 9p, 9q, 20p og 20q og tab af kopiantal i 3p, 4p, 4q og kromosom 21. Disse genetiske ændringer er almindelige i HNSCC og er forbundet med aggressiv tumoradfærd og dårlig patientprognose.
Især amplifikationen af regioner som 3q og 11q13, som ses i mange HNSCC-cellelinjer, er interessant på grund af dens sammenhæng med øget udtryk af onkogener som CCND1 (cyclin D1) og CTTN (cortactin). Disse gener er involveret i henholdsvis cellecyklusregulering og cytoskeletal organisering, og deres overekspression kan bidrage til øget celleproliferation, invasion og metastase. HNO210-cellelinjen er med sin særlige genetiske profil en robust model til at undersøge de molekylære mekanismer, der ligger til grund for udviklingen af larynxcancer, og til at teste målrettede behandlinger, der er rettet mod disse specifikke genetiske abnormiteter.
Derudover er denne cellelinje en del af et panel, der bruges til at undersøge effekten af kombinationsbehandlinger, såsom brugen af cisplatin med thalidomid, som har vist sig at være lovende i forhold til at øge antitumoraktiviteten in vitro og in vivo. Derfor er HNO210 ikke kun afgørende for den grundlæggende kræftforskning, men også for translationelle studier, der har til formål at forbedre de terapeutiske resultater for patienter med HNSCC.

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

HNO210-cellelinjen stammer fra et laryngealt pladecellekarcinom, en undertype af pladecellekarcinom i hoved og hals (HNSCC). Denne cellelinje er blevet grundigt karakteriseret for sine genetiske og molekylære egenskaber, hvilket gør den til en værdifuld model til undersøgelse af patogenesen og behandlingsresponsen af HNSCC. Kromosomal komparativ genomisk hybridisering (cCGH) af HNO210 har afsløret flere signifikante kromosomale aberrationer. Især udviser den DNA-kopiantalsgevinster i kromosomregionerne 3q, 7p, 7q, 9p, 9q, 20p og 20q og tab af kopiantal i 3p, 4p, 4q og kromosom 21. Disse genetiske ændringer er almindelige i HNSCC og er forbundet med aggressiv tumoradfærd og dårlig patientprognose.
Især amplifikationen af regioner som 3q og 11q13, som ses i mange HNSCC-cellelinjer, er interessant på grund af dens sammenhæng med øget udtryk af onkogener som CCND1 (cyclin D1) og CTTN (cortactin). Disse gener er involveret i henholdsvis cellecyklusregulering og cytoskeletal organisering, og deres overekspression kan bidrage til øget celleproliferation, invasion og metastase. HNO210-cellelinjen er med sin særlige genetiske profil en robust model til at undersøge de molekylære mekanismer, der ligger til grund for udviklingen af larynxcancer, og til at teste målrettede behandlinger, der er rettet mod disse specifikke genetiske abnormiteter.
Derudover er denne cellelinje en del af et panel, der bruges til at undersøge effekten af kombinationsbehandlinger, såsom brugen af cisplatin med thalidomid, som har vist sig at være lovende i forhold til at øge antitumoraktiviteten in vitro og in vivo. Derfor er HNO210 ikke kun afgørende for den grundlæggende kræftforskning, men også for translationelle studier, der har til formål at forbedre de terapeutiske resultater for patienter med HNSCC.

Væv	Strubehovedet
Sygdom	Pladecellekarcinom i hoved og hals (HNSCC)

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Mand
Vækstegenskaber	Tilhænger
Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Morfologi	Epitel-lignende

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

HNO210 (Cytion katalognummer 300134)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_D215

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

DMEM, w: 4,5 g/L glukose, w: 4 mM L-glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM natriumpyruvat (Cytion artikelnummer 820300a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS

Dissociationsreagens	Accutase

Oddyrkning

Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspender cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.

Væskeudskiftning	2 til 3 gange om ugen

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	69 år
Etnisk tilhørsforhold	Kaukasisk

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Der gælder aftaler med tredjeparter	Yes