תאי HNO210

300134

קו תאים זה אופיין בהרחבה .(HNSCC) נגזר מקרצינומה של תאי קשקש בגרון, תת-סוג של קרצינומה של תאי קשקש בראש ובצוואר HNO210 קו התאים ניתוח היברידיזציה גנומית השוואתית .HNSCC-על פי מאפייניו הגנטיים והמולקולריים, מה שהופך אותו למודל חשוב לחקר הפתוגנזה ותגובות הטיפול ב באזורים הכרומוזומליים DNA-חשף מספר חריגות כרומוזומליות משמעותיות. בפרט, הוא מציג עלייה במספר עותקי ה HNO210 של (cCGH) כרומוזומלית וקשורים להתנהגות HNSCC-ובכרומוזום 21. שינויים גנטיים אלה שכיחים ב 4p, 4q וירידה במספר העותקים ב-3q, 7p, 7q, 9p, 9q, 20p 20-iq אגרסיבית של הגידול ולפרוגנוזה גרועה של המטופל.

CCND1 מעניינת בשל הקשר שלה לביטוי מוגבר של אונקוגנים כגון HNSCC, הנצפית בקווי תאים רבים של 11-iq13, בפרט 3q, ההגברה באזורים כגון גנים אלה מעורבים בוויסות מחזור התא ובארגון שלד התא, בהתאמה, והביטוי המוגבר שלהם יכול לתרום להגברת .(cyclin D1) ו-CTTN (cortactin) התרבות התאים, HNO210 עם הפרופיל הגנטי הייחודי שלו, משמש מודל חזק לחקר המנגנונים המולקולריים העומדים הפלישה והגרורות. קו התאים בבסיס התקדמות סרטן הגרון ולבחינת טיפולים ממוקדים המטפלים במומים גנטיים ספציפיים אלה.

בנוסף, קו תאים זה הוא חלק מפאנל המשמש לבחינת היעילות של טיפולים משולבים, כגון השימוש בציספלטין עם תלידומיד, שהוכחו כמבטיחים בשיפור לחשוב לא רק למחקר בסיסי בסרטן, אלא גם למחקרים תרגומיים שמטרתם לשפר HNO210 הפעילות האנטי-גידולית במבחנה ובחי. עובדה זו הופכת את את תוצאות הטיפול בחולים עם HNSCC.

GENERAL INFORMATION

Description

קו תאים זה אופיין בהרחבה .(HNSCC) נגזר מקרצינומה של תאי קשקש בגרון, תת-סוג של קרצינומה של תאי קשקש בראש ובצוואר HNO210 קו התאים ניתוח היברידיזציה גנומית השוואתית .HNSCC-על פי מאפייניו הגנטיים והמולקולריים, מה שהופך אותו למודל חשוב לחקר הפתוגנזה ותגובות הטיפול ב באזורים הכרומוזומליים DNA-חשף מספר חריגות כרומוזומליות משמעותיות. בפרט, הוא מציג עלייה במספר עותקי ה HNO210 של (cCGH) כרומוזומלית וקשורים להתנהגות HNSCC-ובכרומוזום 21. שינויים גנטיים אלה שכיחים ב 4p, 4q וירידה במספר העותקים ב-3q, 7p, 7q, 9p, 9q, 20p 20-iq אגרסיבית של הגידול ולפרוגנוזה גרועה של המטופל.

CCND1 מעניינת בשל הקשר שלה לביטוי מוגבר של אונקוגנים כגון HNSCC, הנצפית בקווי תאים רבים של 11-iq13, בפרט 3q, ההגברה באזורים כגון גנים אלה מעורבים בוויסות מחזור התא ובארגון שלד התא, בהתאמה, והביטוי המוגבר שלהם יכול לתרום להגברת .(cyclin D1) ו-CTTN (cortactin) התרבות התאים, HNO210 עם הפרופיל הגנטי הייחודי שלו, משמש מודל חזק לחקר המנגנונים המולקולריים העומדים הפלישה והגרורות. קו התאים בבסיס התקדמות סרטן הגרון ולבחינת טיפולים ממוקדים המטפלים במומים גנטיים ספציפיים אלה.

בנוסף, קו תאים זה הוא חלק מפאנל המשמש לבחינת היעילות של טיפולים משולבים, כגון השימוש בציספלטין עם תלידומיד, שהוכחו כמבטיחים בשיפור לחשוב לא רק למחקר בסיסי בסרטן, אלא גם למחקרים תרגומיים שמטרתם לשפר HNO210 הפעילות האנטי-גידולית במבחנה ובחי. עובדה זו הופכת את את תוצאות הטיפול בחולים עם HNSCC.

Tissue	גרון
Disease	קרצינומה של תאי קשקש בראש ובצוואר (HNSCC)

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	דמוי אפיתל

IDENTIFIERS

Citation

HNO210 (מספר קטלוגי Cytion 300134)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_D215

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM, w: 4.5 g/L גלוקוז, w: 4 mM L-גלוטמין, w: 3.7 g/L NaHCO3, w: 1.0 mM נתרן פירובט (מספר קטלוגי Cytion 820300a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, אווירה לחה.

Supplements

10% הוסף לתווך FBS

Dissociation reagent	אקוטאז

Subculturing

T75, ועבור בקבוקי PBS, השתמש ב-3-5 מ"ל T25, ללא סידן ומגנזיום. עבור בקבוקי PBS-הסר את המדיום הישן מהתאים הדבוקים ושטוף אותם ב השאר את .T75 ו-2.5 מ"ל עבור בקבוקי T25 תוך שימוש ב-1-2 מ"ל עבור בקבוקי Accutase-השתמש ב-5-10 מ"ל. לאחר מכן, כסה את התאים לחלוטין ב התאים לדגירה בטמפרטורת החדר למשך 8-10 דקות כדי לנתק אותם. לאחר הדגירה, ערבב בעדינות את התאים עם 10 מ"ל של מדיום כדי להחזיר אותם למשך 3 דקות. השלך את הנוזל העליון, החזר את התאים לתמיסה במדיום טרי והעבר אותם לצלחות חדשות xgלתמיסה, ואז סובב בצנטריפוגה ב-300 שכבר מכילות מדיום טרי.

Fluid renewal	עד 3 פעמים בשבוע 2

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

ושיטות זיהוי מיקופלסמה מבוססות לומניסצנציה PCR זיהום במיקופלסמה נשלל באמצעות בדיקות מבוססות.
כדי להבטיח שאין זיהום חיידקי, פטרייתי או שמרי, תרבויות התאים עוברות בדיקות ויזואליות יומיות.

Freeze medium	כדי להבטיח DMSO + 10% (FBS כולל) כמדיום לשימור בקירור, אנו משתמשים במדיום גידול מלא הכולל חומרים אוסמו-, (Cytion 800100 מספר קטלוגי) CM-1 חיוניות נאותה לאחר ההפשרה, או מגנים ומייצבי מטבוליזם משופרים כדי לשפר את ההתאוששות ולהפחית את הלחץ הנגרם מהקפאה.

Storage conditions

לשימור לטווח ארוך, יש להניח את הבקבוקונים בחנקן נוזלי במצב של אדי בטמפרטורה של כ-150 עד 196 מעלות צלזיוס. אחסון בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס מקובל רק כצעד ביניים קצר לפני העברה לחנקן נוזלי.

Shipping conditions

במהלך C-שורות תאים שהוקפאו נשלחות בקרח יבש באריזה מאושרת ומבודדת עם כמות מספקת של חומר קירור כדי לשמור על טמפרטורה של כ-78° ההובלה. עם קבלת המשלוח, יש לבדוק את המכל מיד ולהעביר את הבקבוקונים ללא דיחוי לאחסון מתאים.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

DONOR

Donor age	שנים 69
Ethnicity	קווקזי

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

כאשר מתכננים לאחסן קריוביאל בחנקן נוזלי להפשרה עתידית, חובה להקפיד על אמצעי בטיחות מחמירים. יש להקפיד על שימוש בכפפות ובבגדים מגנים מתאימים, וכן על שימוש במסכת פנים או משקפי מגן בעת העברת דגימות קפואות אל מיכל החנקן הנוזלי או ממנו. זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מפיצוץ אפשרי של הקריוביאל בעת הוצאתו, העלול לגרום להתזת רסיסים חדים.

Warranty

אנו עומדים מאחורי האיכות והכדאיות של המוצרים שלנו, Cytion-ב.
אנו מבטיחים שתאינו יהיו קיימים בתחילת התרבית למשך
60 יום לאחר המשלוח מהמתקנים שלנו.
אנו מבטיחים שכל החומרים תואמים למפרטים המתוארים
בתעודת הניתוח ו/או בדף המוצר.
לפרטים מלאים, אנא עיינו ב
הצהרת האחריות שלנו<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">

Third-party agreements apply	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB