Células Calu-6

300135

La línea celular Calu-6 es una línea celular humana de carcinoma pulmonar no microcítico (CPNM) derivada del derrame pleural de un paciente varón de 61 años. Creada en 1975, esta línea celular ha sido un modelo fundamental en la investigación del cáncer de pulmón. Las células Calu-6 presentan una morfología epitelial distintiva y se han utilizado ampliamente para estudiar la biología del cáncer de pulmón, incluidos los mecanismos de metástasis, la resistencia a los fármacos y el microambiente tumoral. Estas células destacan especialmente por su capacidad para formar tumores en modelos de xenoinjerto, lo que las hace muy valiosas para los estudios in vivo del crecimiento tumoral y la respuesta a los tratamientos.
Calu-6 se caracteriza por un alto nivel de mutación KRAS, común en el CPNM, y proporciona un modelo relevante para estudiar el papel de este oncogén en el cáncer de pulmón. La línea celular también presenta varias anomalías citogenéticas típicas de las células cancerosas, como cariotipos complejos y aneuploidía, que contribuyen a su uso en estudios genéticos. La investigación con la línea celular Calu-6 ha ayudado a comprender los mecanismos celulares del cáncer de pulmón y a desarrollar estrategias terapéuticas. Su robusto crecimiento en cultivo y la capacidad de imitar aspectos clínicos del cáncer de pulmón la convierten en un recurso indispensable en la investigación oncológica.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción

La línea celular Calu-6 es una línea celular humana de carcinoma pulmonar no microcítico (CPNM) derivada del derrame pleural de un paciente varón de 61 años. Creada en 1975, esta línea celular ha sido un modelo fundamental en la investigación del cáncer de pulmón. Las células Calu-6 presentan una morfología epitelial distintiva y se han utilizado ampliamente para estudiar la biología del cáncer de pulmón, incluidos los mecanismos de metástasis, la resistencia a los fármacos y el microambiente tumoral. Estas células destacan especialmente por su capacidad para formar tumores en modelos de xenoinjerto, lo que las hace muy valiosas para los estudios in vivo del crecimiento tumoral y la respuesta a los tratamientos.
Calu-6 se caracteriza por un alto nivel de mutación KRAS, común en el CPNM, y proporciona un modelo relevante para estudiar el papel de este oncogén en el cáncer de pulmón. La línea celular también presenta varias anomalías citogenéticas típicas de las células cancerosas, como cariotipos complejos y aneuploidía, que contribuyen a su uso en estudios genéticos. La investigación con la línea celular Calu-6 ha ayudado a comprender los mecanismos celulares del cáncer de pulmón y a desarrollar estrategias terapéuticas. Su robusto crecimiento en cultivo y la capacidad de imitar aspectos clínicos del cáncer de pulmón la convierten en un recurso indispensable en la investigación oncológica.

Pañuelo de papel	Pulmón
Enfermedad	Adenocarcinoma
Lugar de metástasis	Derrame pleural

Sinónimos

- CaLu-6
- CALU-6
- Calu.6
- Calu 6
- Calu6
- CALU6
- CaLu-06

CLASIFICACIÓN

Organismo	Humano
Sexo	Mujer
Propiedades de crecimiento	Adherente
Nivel de bioseguridad	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

CARACTERÍSTICAS

Morfología	De tipo epitelial
Tumorigénico	Sí, en ratones desnudos. Forma carcinoma poco diferenciado

Cariotipo

El número cromosómico stemline es hipotriploide y el componente 2S se presenta en un 5,8%. El número cromosómico modal es 59. Catorce cromosomas marcadores (constitutivos) eran comunes a la mayoría de las metafases S. No se detectó ningún cromosoma Y en la preparación teñida con QM.

IDENTIFICADORES

Referencia

Calu-6 (número de catálogo 300135 de Cytion)

N.º de identificación fiscal del NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0236

EXPRESIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD

Expresión de proteínas

P53 negativo

Isoenzimas

Me-2, 1, PGM3, 1, PGM1, 2, ES-D, 1, AK-1, 1, GLO-1, 2, G6PD, B, Producto de Frecuencia de Fenotipo: 0.0031

Perfil mutacional

Las células CaLu-6 presentan una mutación en el codón 61 de KRAS, c.181C>A p.(Gln61Lys). No se detectó la mutación NRAS de BRAF.

MANEJO Y CULTIVO

Medio de cultivo

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamina, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (número de artículo de Cytion 820100a)

Atmósfera de incubación	37°C, 5%CO2, atmósfera humidificada.

Suplementos

Suplementar el medio con un 10% de FBS y un 1% de NEAA

Reactivo de disociación	Accutase

Subcultivo

Retire el medio antiguo de las células adheridas y lávelas con PBS que carezca de calcio y magnesio. Para matraces T25, utilice 3-5 ml de PBS, y para matraces T75, utilice 5-10 ml. A continuación, cubra completamente las células con Accutase, utilizando 1-2 ml para matraces T25 y 2,5 ml para matraces T75. Deje incubar las células a temperatura ambiente durante 8-10 minutos para desprenderlas. Tras la incubación, mezclar suavemente las células con 10 ml de medio para resuspenderlas y, a continuación, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Desechar el sobrenadante, resuspender las células en medio fresco y transferirlas a nuevos matraces que ya contengan medio fresco.

Densidad de siembra	2 x 10^4 células/cm^2 darán como resultado una monocapa confluente al 90 % en aproximadamente 4 días.
Renovación de fluidos	de 2 a 3 veces por semana
Recuperación tras la descongelación	Después de descongelar, siembre las células a 5 x 10^4 células/cm^2 y deje que las células se recuperen del proceso de congelación y se adhieran durante al menos 48 horas.

Descongelación y cultivo

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROL DE CALIDAD Y CRIOPRESERVACIÓN

Esterilidad

La contaminación por micoplasma se excluye utilizando tanto ensayos basados en la PCR como métodos de detección de micoplasma basados en la luminiscencia.
Para garantizar la ausencia de contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.

Medio de congelación	Como medio de criopreservación, utilizamos el medio de crecimiento completo (incluido FBS) + 10% DMSO para una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo 800100 de Cytion), que incluye osmoprotectores optimizados y estabilizadores metabólicos para mejorar la recuperación y reducir el estrés crioinducido.

Condiciones de almacenamiento

Para la conservación a largo plazo, colocar los viales en nitrógeno líquido en fase vapor a una temperatura aproximada de -150 a -196 °C. El almacenamiento a -80 °C sólo es aceptable como breve paso intermedio antes de la transferencia al nitrógeno líquido.

Condiciones de envío

Las líneas celulares crioconservadas se envían en hielo seco en envases validados y aislados con suficiente refrigerante para mantener aproximadamente -78 °C durante el tránsito. A la recepción, inspeccione el envase inmediatamente y transfiera los viales sin demora al almacenamiento adecuado.

DONANTE

Edad del donante	61 años
Origen étnico	Caucásico

ASPECTOS LEGALES Y DE SEGURIDAD

Medidas de seguridad

Cuando se planea almacenar un criovial en nitrógeno líquido para su futura descongelación, es obligatorio cumplir estrictas medidas de seguridad. Es esencial utilizar guantes y ropa de protección adecuados, así como una mascarilla o gafas de seguridad durante el traslado de muestras congeladas desde o hacia el tanque de nitrógeno líquido. Con ello se pretende mitigar el riesgo de lesiones por posibles explosiones crioviales al extraerlas, que pueden dar lugar a la proyección de fragmentos afilados.

Garantía

En Cytion, respaldamos la calidad y viabilidad de nuestros productos.
Garantizamos que nuestras células serán viables al inicio del cultivo durante los 60 días posteriores al envío desde nuestras instalaciones.
Aseguramos que todos los materiales se ajustan a las especificaciones descritas en el Certificado de Análisis y/o Hoja de Producto
Para más información, consulte nuestra <a href=""/Quiénes somos/Garantía/"" hreflang=""x-default"">Declaración de garantía

Se requiere un acuerdo de transferencia de material	Yes