Calu-6 šūnas

300135

Calu-6 šūnu līnija ir cilvēka nesmalto šūnu plaušu karcinomas (NSCLC) šūnu līnija, kas iegūta no 61 gadu veca vīrieša pleiras izplūdes. Šī šūnu līnija, kas izveidota 1975. gadā, ir bijusi ļoti svarīgs modelis plaušu vēža pētniecībā. Calu-6 šūnām ir izteikta epitēlija morfoloģija, un tās ir plaši izmantotas plaušu vēža bioloģijas, tostarp metastāžu, rezistences pret zālēm un audzēja mikrovides mehānismu, pētniecībā. Šīs šūnas īpaši izceļas ar savu spēju veidot audzējus ksenogrāfta modeļos, kas padara tās ļoti vērtīgas in vivo pētījumos par audzēja augšanu un reakciju uz terapiju.
Calu-6 raksturīgs augsts KRAS mutācijas līmenis, kas ir izplatīts NSCLC, un tas ir piemērots modelis šī onkogēna lomas izpētei plaušu vēža gadījumā. Šai šūnu līnijai ir arī vairākas vēža šūnām raksturīgas citogenētiskas anomālijas, piemēram, sarežģīts kariotips un aneuploīdija, kas veicina tās izmantošanu ģenētiskos pētījumos. Pētījumi, kuros izmantota Calu-6 šūnu līnija, ir palīdzējuši izprast plaušu vēža šūnu mehānismus un izstrādāt terapeitiskās stratēģijas. Tās spēcīgā augšana kultūrā un spēja imitēt plaušu vēža klīniskos aspektus padara to par neaizstājamu resursu onkoloģiskajos pētījumos.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Apraksts

Calu-6 šūnu līnija ir cilvēka nesmalto šūnu plaušu karcinomas (NSCLC) šūnu līnija, kas iegūta no 61 gadu veca vīrieša pleiras izplūdes. Šī šūnu līnija, kas izveidota 1975. gadā, ir bijusi ļoti svarīgs modelis plaušu vēža pētniecībā. Calu-6 šūnām ir izteikta epitēlija morfoloģija, un tās ir plaši izmantotas plaušu vēža bioloģijas, tostarp metastāžu, rezistences pret zālēm un audzēja mikrovides mehānismu, pētniecībā. Šīs šūnas īpaši izceļas ar savu spēju veidot audzējus ksenogrāfta modeļos, kas padara tās ļoti vērtīgas in vivo pētījumos par audzēja augšanu un reakciju uz terapiju.
Calu-6 raksturīgs augsts KRAS mutācijas līmenis, kas ir izplatīts NSCLC, un tas ir piemērots modelis šī onkogēna lomas izpētei plaušu vēža gadījumā. Šai šūnu līnijai ir arī vairākas vēža šūnām raksturīgas citogenētiskas anomālijas, piemēram, sarežģīts kariotips un aneuploīdija, kas veicina tās izmantošanu ģenētiskos pētījumos. Pētījumi, kuros izmantota Calu-6 šūnu līnija, ir palīdzējuši izprast plaušu vēža šūnu mehānismus un izstrādāt terapeitiskās stratēģijas. Tās spēcīgā augšana kultūrā un spēja imitēt plaušu vēža klīniskos aspektus padara to par neaizstājamu resursu onkoloģiskajos pētījumos.

Audums	Plaušas
Slimība	Adenokarcinoma
Metastāžu vieta	Pleiras izsvīdums

Sinonīmi

- CaLu-6
- CALU-6
- Calu.6
- Calu 6
- Calu6
- CALU6
- CaLu-06

KLASIFIKĀCIJA

Organisms	Cilvēks
Sekss	Sieviete
Augšanas īpašības	Atbalstītājs
Bioloģiskās drošības līmenis	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

RAKSTURLIELUMI

Morfoloģija	Epitēlijveidīgs
Tumorogēns	Jā, kailām pelēm. Veido vāji diferencētu karcinomu

Kariotips

Cilmes hromosomu skaits ir hipotriploīds, un 2S komponents ir 5,8 %. Modālais hromosomu skaits ir 59. Četrpadsmit marķieru hromosomas (konstitutīvās) bija kopīgas lielākajai daļai S metafāžu. QM iekrāsotajā preparātā netika konstatēta Y hromosoma.

IDENTIFIKATORI

Atsauce

Calu-6 (Cytion kataloga numurs 300135)

NCBI nodokļu identifikācijas numurs	9606
Cellosaurus	CVCL_0236

PAZĪMES UN UZŅĒMĪBA

Proteīnu ekspresija

P53 negatīvs

Izoenzīmi

Me-2, 1, PGM3, 1, PGM1, 2, ES-D, 1, AK-1, 1, GLO-1, 2, G6PD, B, Fenotipu biežuma produkts: 0.0031

Mutāciju profils

CaLu-6 šūnās ir KRAS 61. kodona mutācija, c.181C>A p.(Gln61Lys). NRAS vai BRAF mutācija netika konstatēta.

APSTRĀDE UN AUDZĒŠANA

Barotne

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-glutamīns, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytion izstrādājuma numurs 820100a)

Inkubācijas vide	37°C, 5%CO2, mitrināta atmosfēra.

Papildinājumi

Papildināt barotni ar 10% FBS un 1% NEAA

Disociācijas reaģents	Accutase

Pārstādīšana

Noņemt veco barotni no pielipušajām šūnām un mazgāt tās ar PBS, kurā nav kalcija un magnija. T25 kolbām izmantojiet 3-5 ml PBS, bet T75 kolbām - 5-10 ml. Pēc tam pilnībā pārklājiet šūnas ar Accutase, izmantojot 1-2 ml T25 kolbām un 2,5 ml T75 kolbām. Ļaujiet šūnām inkubēties istabas temperatūrā 8-10 minūtes, lai tās atdalītos. Pēc inkubācijas uzmanīgi samaisiet šūnas ar 10 ml barotnes, lai tās atkārtoti suspendētu, pēc tam centrifugējiet 3 minūtes ar 300xg. Izmetiet supernatantu, atkārtoti suspendējiet šūnas svaigā barotnē un pārvietojiet tās jaunās kolbās, kurās jau ir svaiga barotne.

Sēšanas blīvums	2 x 10^4 šūnas/cm^2 radīs 90 % konfluentu monoslāni apmēram 4 dienu laikā.
Šķidruma atjaunošana	2 līdz 3 reizes nedēļā
Atgūšanās pēc atkusņa	Pēc atkausēšanas izkliedējiet šūnas uz šķīvja ar blīvumu 5 x 10^4 šūnas/cm^2 un ļaujiet šūnām atgūties no sasaldēšanas procesa un pielipt vismaz 48 stundas.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Atkausēšana un kultivēšana

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITĀTES KONTROLE UN KRIOKONSERVĀCIJA

Sterilitāte

Mikoplazmas piesārņojums tiek izslēgts, izmantojot gan uz PCR balstītus testus, gan uz luminiscenci balstītas mikoplazmas noteikšanas metodes.
Lai pārliecinātos, ka nav baktēriju, sēnīšu vai rauga piesārņojuma, šūnu kultūras katru dienu vizuāli pārbauda.

Saldēšanas barotne	Kā kriokonservēšanas barotni mēs izmantojam pilnvērtīgu augšanas barotni (ieskaitot FBS) + 10 % DMSO, lai nodrošinātu pietiekamu dzīvotspēju pēc atkausēšanas, vai CM-1 (Cytion kataloga numurs 800100), kas ietver optimizētus osmoprotektorus un metaboliskos stabilizatorus, lai uzlabotu atveseļošanos un samazinātu krioinducēto stresu.

Uzglabāšanas nosacījumi

Ilgstošai uzglabāšanai flakonus ievietojiet šķidrā slāpeklī ar tvaika fāzi aptuveni -150 līdz -196 °C temperatūrā. Uzglabāšana -80 °C temperatūrā ir pieļaujama tikai kā īss starpposms pirms pārvietošanas uz šķidro slāpekli.

Piegādes nosacījumi

Kriokonservētas šūnu līnijas tiek sūtītas uz sausā ledus apstiprinātā, izolētā iepakojumā ar pietiekamu dzesēšanas šķidruma daudzumu, lai visā transportēšanas laikā uzturētu aptuveni -78 °C temperatūru. Pēc saņemšanas nekavējoties pārbaudiet iepakojumu un nekavējoties pārvietojiet flakonus uz atbilstošu uzglabāšanas vietu.

ZIEDOTĀJS

Donora vecums	61 gads
Etniskā piederība	Kaukāzietis

JURIDISKIE JAUTĀJUMI UN DROŠĪBA

Drošības pasākumi

Plānojot uzglabāt kriokviālu šķidrā slāpeklī turpmākai atkausēšanai, obligāti jāievēro stingri drošības pasākumi. Ir nepieciešami piemēroti aizsargcimdi un apģērbs, un, pārvietojot sasaldētos paraugus uz šķidrā slāpekļa tvertni vai no tās, ir jālieto sejas maska vai aizsargbrilles. Tas jādara, lai mazinātu traumu risku, ko var radīt iespējamas kriokrioviālu eksplozijas, kas var izraisīt asu fragmentu izmešanu.

Garantija

Uzņēmumā Cytion mēs atbalstām savu produktu kvalitāti un dzīvotspēju.
Mēs garantējam, ka mūsu šūnas būs dzīvotspējīgas kultivēšanas sākumā 60 dienas pēc nosūtīšanas no mūsu ražotnēm.
Mēs nodrošinām, ka visi materiāli atbilst analīzes sertifikātā un/vai produkta lapā aprakstītajām specifikācijām
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu <a href=""/"/Kas mēs esam/garantija/"" hreflang=""x-default"">Garantijas paziņojumu

Nepieciešams materiālu nodošanas līgums	Yes