Células Calu-6

300135

A linhagem celular Calu-6 é uma linhagem de carcinoma pulmonar de células não pequenas (NSCLC) derivada do derrame pleural de um paciente do sexo masculino de 61 anos. Criada em 1975, essa linhagem celular tem sido um modelo fundamental na pesquisa sobre o câncer de pulmão. As células Calu-6 apresentam uma morfologia epitelial distinta e têm sido amplamente utilizadas para estudar a biologia do câncer de pulmão, incluindo mecanismos de metástase, resistência a medicamentos e o microambiente tumoral. Essas células são particularmente conhecidas por sua capacidade de formar tumores em modelos de xenoenxertos, o que as torna altamente valiosas para estudos in vivo do crescimento tumoral e da resposta a tratamentos terapêuticos.
A Calu-6 é caracterizada por um alto nível de mutação no gene KRAS, comum no NSCLC, e fornece um modelo relevante para o estudo do papel desse oncogene no câncer de pulmão. A linhagem celular também apresenta várias anomalias citogenéticas típicas de células cancerosas, como cariótipos complexos e aneuploidia, o que contribui para seu uso em estudos genéticos. Pesquisas que utilizam a linhagem celular Calu-6 têm ajudado na compreensão dos mecanismos celulares do câncer de pulmão e no desenvolvimento de estratégias terapêuticas. Seu crescimento robusto em cultura e a capacidade de simular aspectos clínicos do câncer de pulmão a tornam um recurso indispensável na pesquisa oncológica.

GENERAL INFORMATION

Description

A linhagem celular Calu-6 é uma linhagem de carcinoma pulmonar de células não pequenas (NSCLC) derivada do derrame pleural de um paciente do sexo masculino de 61 anos. Criada em 1975, essa linhagem celular tem sido um modelo fundamental na pesquisa sobre o câncer de pulmão. As células Calu-6 apresentam uma morfologia epitelial distinta e têm sido amplamente utilizadas para estudar a biologia do câncer de pulmão, incluindo mecanismos de metástase, resistência a medicamentos e o microambiente tumoral. Essas células são particularmente conhecidas por sua capacidade de formar tumores em modelos de xenoenxertos, o que as torna altamente valiosas para estudos in vivo do crescimento tumoral e da resposta a tratamentos terapêuticos.
A Calu-6 é caracterizada por um alto nível de mutação no gene KRAS, comum no NSCLC, e fornece um modelo relevante para o estudo do papel desse oncogene no câncer de pulmão. A linhagem celular também apresenta várias anomalias citogenéticas típicas de células cancerosas, como cariótipos complexos e aneuploidia, o que contribui para seu uso em estudos genéticos. Pesquisas que utilizam a linhagem celular Calu-6 têm ajudado na compreensão dos mecanismos celulares do câncer de pulmão e no desenvolvimento de estratégias terapêuticas. Seu crescimento robusto em cultura e a capacidade de simular aspectos clínicos do câncer de pulmão a tornam um recurso indispensável na pesquisa oncológica.

Tissue	Pulmão
Disease	Adenocarcinoma
Metastatic site	Derrame pleural

Synonyms

- CaLu-6
- CALU-6
- Calu.6
- Calu 6
- Calu6
- CALU6
- CaLu-06

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

CHARACTERISTICS

Morphology	De tipo epitelial
Tumourigenic	Sim, em camundongos nude. Forma um carcinoma pouco diferenciado

Karyotype

O número cromossômico da linhagem-tronco é hipotriploide, e o componente 2S apresentou 5,8%. O número cromossômico modal é 59. Quatorze cromossomos marcadores (constitutivos) eram comuns à maioria das metafases S. Não foi detectado nenhum cromossomo Y na preparação corada com QM.

IDENTIFIERS

Citation

Calu-6 (número de catálogo da Cytion 300135)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_0236

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Protein expression

P53 negativo

Isoenzymes

Me-2, 1, PGM3, 1, PGM1, 2, ES-D, 1, AK-1, 1, GLO-1, 2, G6PD, B, Produto da frequência fenotípica: 0,0031

Mutational profile

As células CaLu-6 apresentam uma mutação no códon 61 do gene KRAS, c.181C>A p.(Gln61Lys). Não foram detectadas mutações nos genes NRAS ou BRAF.

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

EMEM (MEM Eagle), contendo: 2 mM de L-glutamina, contendo: 2,2 g/L de $NaHCO_3$, contendo: EBSS (número de artigo da Cytion 820100a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5% de CO_2, atmosfera umidificada.

Supplements

Adicione ao meio 10% de FBS e 1% de NEAA

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Remova o meio antigo das células aderentes e lave-as com PBS sem cálcio nem magnésio. Para frascos T25, use 3 a 5 ml de PBS; para frascos T75, use 5 a 10 ml. Em seguida, cubra as células completamente com Accutase, utilizando 1 a 2 ml para frascos T25 e 2,5 ml para frascos T75. Deixe as células incubarem à temperatura ambiente por 8 a 10 minutos para que se desprendam. Após a incubação, misture delicadamente as células com 10 ml de meio para ressuspender, depois centrifugue a 300xg por 3 minutos. Descarte o sobrenadante, ressuspenda as células em meio fresco e transfira-as para novos frascos que já contenham meio fresco.

Seeding density	2 x 10^4 células/cm^2 resultarão em uma monocamada com 90% de confluência em cerca de 4 dias
Fluid renewal	2 a 3 vezes por semana
Post-thaw recovery	Após o descongelamento, semeie as células a uma densidade de 5 x 10^4 células/cm^2 e deixe que elas se recuperem do processo de congelamento e se fixem por pelo menos 48 horas.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

A contaminação por micoplasma é descartada por meio de ensaios baseados em PCR e de métodos de detecção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não haja contaminação por bactérias, fungos ou leveduras, as culturas celulares são submetidas a inspeções visuais diárias.

Freeze medium	Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% de DMSO para garantir viabilidade adequada após o descongelamento, ou CM-1 (número de catálogo da Cytion 800100), que inclui osmoprotetores e estabilizadores metabólicos otimizados para melhorar a recuperação e reduzir o estresse induzido pela criopreservação.

Storage conditions

Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido.

Shipping conditions

As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado.

DONOR

Donor age	61 anos
Ethnicity	caucasiano

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Ao planejar o armazenamento de um criotubo em nitrogênio líquido para descongelamento futuro, é obrigatório seguir medidas de segurança rigorosas. É essencial o uso de luvas e roupas de proteção adequadas, além do uso obrigatório de máscara facial ou óculos de proteção durante a transferência de amostras congeladas para dentro ou para fora do tanque de nitrogênio líquido. Isso visa mitigar o risco de ferimentos decorrentes de possíveis explosões dos criotubos durante a remoção, o que pode resultar na projeção de fragmentos pontiagudos.

Warranty

Na Cytion, garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células permanecerão viáveis no início da cultura por
60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no
Certificado de Análise e/ou na Ficha Técnica do Produto.
Para obter todos os detalhes, consulte nossa
Declaração de Garantia.

Material Transfer Agreement required	Yes