Cellules HNO223

300142

La lignée cellulaire HNO223 provient d'un carcinome épidermoïde buccal, qui est un sous-type du carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC). Cette lignée cellulaire a fait l'objet d'une caractérisation cytogénétique qui a révélé des gains significatifs du nombre de copies d'ADN dans plusieurs régions chromosomiques, notamment 3q22-qter, 8q, 9p, 9q, 11q13, 20p et 20q. Ces régions présentent un intérêt particulier, car elles contiennent fréquemment des oncogènes impliqués dans la progression du HNSCC, notamment ceux liés à la prolifération cellulaire, à la survie cellulaire et aux métastases.
L'amplification de la région 11q13, observée dans la lignée HNO223, est associée à la surexpression d'oncogènes clés tels que CCND1 (cycline D1) et CTTN (cortactine), dont on sait qu'ils contribuent au comportement agressif des cellules cancéreuses, notamment par une progression accélérée du cycle cellulaire et une invasivité accrue. Cela fait de HNO223 un modèle pertinent pour l'étude des voies moléculaires impliquées dans le carcinome épidermoïde buccal et pour l'exploration de stratégies thérapeutiques ciblant ces altérations génétiques.
La lignée HNO223 constitue un modèle robuste pour la recherche sur le cancer, en particulier pour les études visant à comprendre les fondements génétiques et moléculaires du carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC) ainsi que pour le développement de thérapies ciblées qui s'attaquent à ces anomalies chromosomiques spécifiques. Ses caractéristiques génétiques en font un outil précieux tant pour la recherche fondamentale que pour la recherche translationnelle en oncologie.

GENERAL INFORMATION

Description

La lignée cellulaire HNO223 provient d'un carcinome épidermoïde buccal, qui est un sous-type du carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC). Cette lignée cellulaire a fait l'objet d'une caractérisation cytogénétique qui a révélé des gains significatifs du nombre de copies d'ADN dans plusieurs régions chromosomiques, notamment 3q22-qter, 8q, 9p, 9q, 11q13, 20p et 20q. Ces régions présentent un intérêt particulier, car elles contiennent fréquemment des oncogènes impliqués dans la progression du HNSCC, notamment ceux liés à la prolifération cellulaire, à la survie cellulaire et aux métastases.
L'amplification de la région 11q13, observée dans la lignée HNO223, est associée à la surexpression d'oncogènes clés tels que CCND1 (cycline D1) et CTTN (cortactine), dont on sait qu'ils contribuent au comportement agressif des cellules cancéreuses, notamment par une progression accélérée du cycle cellulaire et une invasivité accrue. Cela fait de HNO223 un modèle pertinent pour l'étude des voies moléculaires impliquées dans le carcinome épidermoïde buccal et pour l'exploration de stratégies thérapeutiques ciblant ces altérations génétiques.
La lignée HNO223 constitue un modèle robuste pour la recherche sur le cancer, en particulier pour les études visant à comprendre les fondements génétiques et moléculaires du carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC) ainsi que pour le développement de thérapies ciblées qui s'attaquent à ces anomalies chromosomiques spécifiques. Ses caractéristiques génétiques en font un outil précieux tant pour la recherche fondamentale que pour la recherche translationnelle en oncologie.

Tissue	Langue
Disease	Carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC)

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	De type épithélial

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIERS

Citation

HNO223 (numéro de catalogue Cytion 300142)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_D219

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM, p/v : 4,5 g/L de glucose, p/v : 4 mM de L-glutamine, p/v : 3,7 g/L de $NaHCO_3$, p/v : 1,0 mM de pyruvate de sodium (référence Cytion 820300a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmosphère humidifiée.

Supplements

Ajouter 10 % de FBS au milieu de culture

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Retirez l'ancien milieu des cellules adhérentes et lavez-les avec du PBS sans calcium ni magnésium. Pour les flacons T25, utilisez 3 à 5 ml de PBS, et pour les flacons T75, utilisez 5 à 10 ml. Ensuite, recouvrez complètement les cellules d'Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laissez les cellules incuber à température ambiante pendant 8 à 10 minutes afin de les détacher. Après l'incubation, mélangez délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifugez à 300 x g pendant 3 minutes. Éliminez le surnageant, remettez les cellules en suspension dans du milieu frais, puis transférez-les dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais.

Fluid renewal	2 à 3 fois par semaine

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes par luminescence.
Afin de s'assurer qu'il n'y a aucune contamination bactérienne, fongique ou par des levures, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Freeze medium	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (contenant du sérum fœtal bovin) + 10 % de DMSO pour assurer une viabilité adéquate après décongélation, ou du CM-1 (référence Cytion 800100), qui contient des osmoprotecteurs et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryoconservation.

Storage conditions

Pour une conservation à long terme, placez les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre environ −150 et −196 °C. L'entreposage à −80 °C n'est acceptable qu'à titre d'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Shipping conditions

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées dans de la glace sèche, dans un emballage isotherme validé contenant suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ −78 °C pendant tout le transport. À la réception, inspectez immédiatement le conteneur et transférez sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONOR

Ethnicity	caucasien

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Lorsqu'on prévoit entreposer un cryotube dans de l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est impératif de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Le port de gants et de vêtements de protection appropriés est essentiel, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de protection est obligatoire lors du transfert d'échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Cette précaution vise à réduire le risque de blessure causé par d'éventuelles explosions de cryotubes lors de leur retrait, pouvant entraîner la projection de fragments coupants.

Warranty

Chez Cytion, nous garantissons la qualité et la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours à compter de leur expédition depuis nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche technique du produit.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre déclaration de garantie.

Third-party agreements apply	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB