HNO223 ląstelės

300142

HNO223 ląstelių linija išvesta iš burnos plokščialąstelinės karcinomos, kuri yra galvos ir kaklo plokščialąstelinės karcinomos (HNSCC) potipis. Šiai ląstelių linijai buvo atliktas citogenetinis apibūdinimas, kurio metu nustatytas didelis DNR kopijų skaičiaus padidėjimas keliose chromosomų srityse, įskaitant 3q22-qter, 8q, 9p, 9q, 11q13, 20p ir 20q. Šie regionai yra ypač svarbūs, nes juose dažnai būna onkogenų, susijusių su HNSCC progresavimu, pavyzdžiui, ląstelių proliferacija, išgyvenamumu ir metastazėmis.
HNO223 nustatytas 11q13 amplifikavimas yra susijęs su pagrindinių onkogenų, tokių kaip CCND1 (ciklinas D1) ir CTTN (kortaktinas), kurie, kaip žinoma, prisideda prie agresyvaus vėžinių ląstelių elgesio, įskaitant intensyvesnį ląstelių ciklo progresavimą ir padidėjusį invazyvumą, hiperekspresija. Dėl to HNO223 yra tinkamas modelis molekuliniams burnos plokščialąstelinės karcinomos keliams tirti ir terapinėms strategijoms, nukreiptoms į šiuos genetinius pokyčius, nagrinėti.
HNO223 yra patikimas vėžio tyrimų modelis, ypač tyrimams, kuriais siekiama suprasti genetinius ir molekulinius HNSCC pagrindus ir kurti tikslines terapijas, nukreiptas į šiuos specifinius chromosomų pakitimus. Dėl savo genetinių savybių jis yra vertingas įrankis tiek fundamentiniams, tiek transliaciniams onkologiniams tyrimams.

BENDRA INFORMACIJA

Aprašymas

HNO223 ląstelių linija išvesta iš burnos plokščialąstelinės karcinomos, kuri yra galvos ir kaklo plokščialąstelinės karcinomos (HNSCC) potipis. Šiai ląstelių linijai buvo atliktas citogenetinis apibūdinimas, kurio metu nustatytas didelis DNR kopijų skaičiaus padidėjimas keliose chromosomų srityse, įskaitant 3q22-qter, 8q, 9p, 9q, 11q13, 20p ir 20q. Šie regionai yra ypač svarbūs, nes juose dažnai būna onkogenų, susijusių su HNSCC progresavimu, pavyzdžiui, ląstelių proliferacija, išgyvenamumu ir metastazėmis.
HNO223 nustatytas 11q13 amplifikavimas yra susijęs su pagrindinių onkogenų, tokių kaip CCND1 (ciklinas D1) ir CTTN (kortaktinas), kurie, kaip žinoma, prisideda prie agresyvaus vėžinių ląstelių elgesio, įskaitant intensyvesnį ląstelių ciklo progresavimą ir padidėjusį invazyvumą, hiperekspresija. Dėl to HNO223 yra tinkamas modelis molekuliniams burnos plokščialąstelinės karcinomos keliams tirti ir terapinėms strategijoms, nukreiptoms į šiuos genetinius pokyčius, nagrinėti.
HNO223 yra patikimas vėžio tyrimų modelis, ypač tyrimams, kuriais siekiama suprasti genetinius ir molekulinius HNSCC pagrindus ir kurti tikslines terapijas, nukreiptas į šiuos specifinius chromosomų pakitimus. Dėl savo genetinių savybių jis yra vertingas įrankis tiek fundamentiniams, tiek transliaciniams onkologiniams tyrimams.

Audinys	Liežuvis
Liga	Galvos ir kaklo plokščialąstelinė karcinoma (HNSCC)

KLASIFIKACIJA

Organizmas	Žmogus
Seksas	Vyras
Augimo savybės	Prisijungęs
Biologinio saugumo lygis	1

CHARAKTERISTIKOS

Morfologija	Į epitelį panašus

IDENTIFIKATORIAI

Nuoroda

HNO223 (Cytion katalogo numeris 300142)

NCBI mokesčių identifikavimo kodas	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_D219

LAIKYMAS IR AUGINIMAS

Maitinamoji terpė

DMEM, š: 4,5 g/l gliukozės, š: 4 mM L-glutamino, š: 3,7 g/l NaHCO3, š: 1,0 mM natrio piruvato (Cytion gaminio numeris 820300a)

Inkubacijos aplinka	37 °C, 5 %CO2, drėkintoje atmosferoje.

Maisto papildai

Papildykite terpę 10 % FBS

Disociacijos reagentas	Accutase

Subkultūrinis auginimas

Pašalinkite seną terpę nuo prilipusių ląstelių ir nuplaukite jas PBS, kuriame nėra kalcio ir magnio. T25 kolboms naudokite 3-5 ml PBS, o T75 kolboms - 5-10 ml. Tuomet visiškai užpilkite ląsteles "Accutase", naudodami 1-2 ml T25 kolboms ir 2,5 ml T75 kolboms. Leiskite ląstelėms inkubuotis kambario temperatūroje 8-10 minučių, kad jos atsiskirtų. Po inkubacijos atsargiai sumaišykite ląsteles su 10 ml terpės, kad jos vėl suspenduotų, tada 3 minutes centrifuguokite 300xg greičiu. Išmeskite supernatantą, vėl sutirpinkite ląsteles šviežioje terpėje ir perkelkite jas į naujas kolbas, kuriose jau yra šviežia terpė.

Skysčių atnaujinimas	2-3 kartus per savaitę

Atšildymas ir auginimas

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KOKYBĖS KONTROLĖ IR KRIOKONSERVAVIMAS

Sterilumas

Mikoplazmos užterštumas atmetamas taikant PGR pagrįstus tyrimus ir liuminescencinius mikoplazmos aptikimo metodus.
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užteršimo bakterijomis, grybeliais ar mielėmis, ląstelių kultūros kasdien vizualiai tikrinamos.

Šaldymo terpė	Kaip kriokonservavimo terpę naudojame visišką augimo terpę (įskaitant FBS) + 10 % DMSO, kad būtų užtikrintas tinkamas gyvybingumas po atšildymo, arba CM-1 (Cytion katalogo numeris 800100), kurioje yra optimizuotų osmoprotektorių ir medžiagų apykaitos stabilizatorių, kad būtų pagerintas atsigavimas ir sumažintas kriokonservavimo sukeltas stresas.

Laikymo sąlygos

Norėdami ilgai saugoti, įdėkite buteliukus į garų fazės skystą azotą maždaug -150-196 °C temperatūroje. Laikymas -80 °C temperatūroje yra priimtinas tik kaip trumpas tarpinis etapas prieš perkeliant į skystąjį azotą.

Pristatymo sąlygos

Kriokonservuotos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje su pakankamu kiekiu šaldymo skysčio, kad pervežimo metu būtų palaikoma maždaug -78 °C temperatūra. Gavę pakuotę, nedelsdami ją apžiūrėkite ir nedelsdami perkelkite mėgintuvėlius į tinkamą saugyklą.

DONORAS

Etninė priklausomybė	Kaukaziečių

TEISINIAI IR SAUGOS KLAUSIMAI

Saugos priemonės

Planuojant saugoti kriovaistinę skystame azote, kad ateityje ją būtų galima atšildyti, būtina laikytis griežtų saugos priemonių. Būtina mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir drabužius, o perkeliant užšaldytus mėginius į skystojo azoto talpyklą arba iš jos būtina naudoti veido kaukę arba apsauginius akinius. Taip siekiama sumažinti sužeidimų riziką dėl galimo kriokomponentų sprogimo išėmimo metu, kai gali išsiveržti aštrūs fragmentai.

Garantija

" Cytion" garantuoja savo produktų kokybę ir gyvybingumą.
Garantuojame, kad mūsų ląstelės bus gyvybingos kultūrų auginimo pradžioje 60 dienų po išsiuntimo iš mūsų gamyklos.
Užtikriname, kad visos medžiagos atitinka analizės sertifikate ir (arba) gaminio lape aprašytas specifikacijas
Išsamią informaciją rasite mūsų <a href=""/Kas mes esame/garantijos/" hreflang=""x-default"">Garantijos pareiškime

Taikomos susitarimai su trečiosiomis šalimis	Yes