HNO223 □池

300142

HNO223 □胞系源自口腔鱗狀□胞癌，該病變屬於頭頸部鱗狀□胞癌（HNSCC）的一種亞型。該□胞系的□胞遺傳學特徵已獲釐清，結果顯示多個染色體區域（包括 3q22-qter、8q、9p、9q、11q13、20p 及 20q）出現顯著的 DNA 拷貝數增加。這些區域之所以備受關注，是因為它們經常含有與頭頸部鱗狀□胞癌（HNSCC）進展有關的致癌基因，例如參與□胞增殖、存活和轉移的基因。

在 HNO223 中觀察到的 11q13 擴增，與 CCND1（□胞周期蛋白 D1）和 CTTN （cortactin）等關鍵致癌基因的過度表達，已知這些基因會促進癌 □胞的侵襲性行為，包括加速□胞週期進展及增強侵襲性。這使得 HNO223 成為研究口腔鱗狀□胞癌相關分子路徑，以及探索針對這些基因變異之治療策略的理想模型。

HNO223 在癌症研究中扮演著可靠的模型角色，特別是針對旨在釐清頭頸部鱗狀 □胞癌（HNSCC）遺傳與分子基礎的研究，以及開發針對這些特定染色體異常的標靶療法。其遺傳特徵使其成為腫瘤學基礎研究與轉譯研究中極具價值的工具。

GENERAL INFORMATION

Description

HNO223 □胞系源自口腔鱗狀□胞癌，該病變屬於頭頸部鱗狀□胞癌（HNSCC）的一種亞型。該□胞系的□胞遺傳學特徵已獲釐清，結果顯示多個染色體區域（包括 3q22-qter、8q、9p、9q、11q13、20p 及 20q）出現顯著的 DNA 拷貝數增加。這些區域之所以備受關注，是因為它們經常含有與頭頸部鱗狀□胞癌（HNSCC）進展有關的致癌基因，例如參與□胞增殖、存活和轉移的基因。

在 HNO223 中觀察到的 11q13 擴增，與 CCND1（□胞周期蛋白 D1）和 CTTN （cortactin）等關鍵致癌基因的過度表達，已知這些基因會促進癌 □胞的侵襲性行為，包括加速□胞週期進展及增強侵襲性。這使得 HNO223 成為研究口腔鱗狀□胞癌相關分子路徑，以及探索針對這些基因變異之治療策略的理想模型。

HNO223 在癌症研究中扮演著可靠的模型角色，特別是針對旨在釐清頭頸部鱗狀 □胞癌（HNSCC）遺傳與分子基礎的研究，以及開發針對這些特定染色體異常的標靶療法。其遺傳特徵使其成為腫瘤學基礎研究與轉譯研究中極具價值的工具。

Tissue	舌頭
Disease	頭頸部鱗狀□胞癌（HNSCC）

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	上皮樣

IDENTIFIERS

Citation

HNO223（Cytion 型號 300142）

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_D219

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM，含 4.5 g/L 葡萄糖、4 mM L-谷氨醯胺、3.7 g/L $NaHCO_3$ 及 1.0 mM 丙酮酸鈉（Cytion 產品編號 820300a）

Incubation atmosphere	37°C，5% CO_2，加濕環境。

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Supplements

在培養基中加入 10% 的胎牛血清（FBS）

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

從貼壁□胞中移除舊培養基，並用不含鈣和鎂的 PBS 洗滌□胞。T25 培養瓶使用 3-5 毫升 PBS，T75 培養瓶則使用 5-10 毫升。接著，用 Accutase 完全覆蓋□胞，T25 培養瓶使用 1–2 毫升，T75 培養瓶則使用 2.5 毫升。將□胞於室溫下孵育 8–10 分鐘，使其脫附。孵育後，將□胞與 10 毫升培養基輕柔混合以使其重新懸浮，然後以 300xg 離心 3 分鐘。棄去上清液，將□胞重新懸浮於新鮮培養基中，並轉移至已預先加入新鮮培養基的新培養瓶中。

Fluid renewal	每週 2 至 3 次

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

透過基於 PCR 的檢測及基於發光原理的支原體檢測方法，排除支原體污染的可能性。
為確保無□菌、真菌或酵母菌污染，每日均會對□胞培養物進行目視檢查。

Freeze medium	作為冷凍保存培養基，我們使用完全生長培養基（含 FBS）+ 10% DMSO 以確保解凍後的存活率，或使用 CM-1（Cytion 型號 800100），該培養基含有經優化的滲透保護劑和代謝穩定劑，可提升□胞恢復率並減輕冷凍誘導的壓力。

Storage conditions

若需長期保存，請將試管置於溫度約為 −150 至 −196 °C 的氣相液氮中。僅在轉移至液氮之前，可將試管暫時存放於 −80 °C 環境中，作為短期過渡步驟。

Shipping conditions

冷凍保存的□胞系會以乾冰冷藏，並裝於經驗證的隔熱包裝中，包裝內含有足夠的冷媒，以確保在運輸過程中溫度維持在約 −78 °C。收到貨物後，請立即檢查容器，並盡快將試管轉移至適當的儲存場所。

DONOR

Ethnicity	高加索人

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

若計劃將低溫試管存放在液態氮中以供日後解凍，必須嚴格遵守相關安全措施。 必須穿戴適當的防護手套和防護服，且在將冷凍樣本移入或移出液氮罐時，必須佩戴口罩或安全護目鏡。此舉旨在降低因取出時冷凍試管可能發生爆炸而導致受傷的風險，此類爆炸可能造成尖銳碎片飛濺。

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Warranty

在 Cytion，我們對產品的品質與存活率提供保障。
我們保證，自本公司設施出貨後
60 天內，我們的□胞在培養開始時仍具存活能力。
我們保證所有材料均符合
分析證明書及／或產品說明書中所載的規格。
詳情請參閱我們的
《保固聲明》。

Third-party agreements apply	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB