Capan-2 sejtek

300144

A Capan-2 sejtvonal egy humán hasnyálmirigy adenokarcinóma sejtvonal, amelyet először egy 56 éves kaukázusi férfi hasnyálmirigy-tumorszövetéből izoláltak. A májban lévő metasztatikus helyről származik, ami azt jelzi, hogy másodlagos tumorból származik, ami különösen értékessé teszi az áttétképző folyamatok és a hasnyálmirigyrák biológiájának kutatásában. A sejtek epiteliális morfológiát mutatnak, és széles körben használták őket a hasnyálmirigyrák, a gyógyszerrezisztencia és a tumorbiológia tanulmányozására.
A Capan-2 sejtekről ismert, hogy a hasnyálmirigyrákban gyakran előforduló mutáció, a Kirsten rat sarcoma viral oncogene homológ (KRAS) mutáns formáját expresszálják, így a sejtek robusztus modellként szolgálnak a KRAS által vezérelt tumorigenezis tanulmányozására.
Emellett jellemző rájuk a p53 tumorszupresszor gén mutációinak kifejeződése, és megfigyelték, hogy kromoszóma-instabilitást mutatnak, amelyek kritikus jellemzők a rák progressziója és a kezelésre adott válasz szempontjából. Ezt a sejtvonalat számos vizsgálatban használták, többek között a kemoterápiás hatékonyság értékelésére, a rák progressziójának molekuláris útvonalainak feltárására és célzott terápiás stratégiák kidolgozására.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

A Capan-2 sejtvonal egy humán hasnyálmirigy adenokarcinóma sejtvonal, amelyet először egy 56 éves kaukázusi férfi hasnyálmirigy-tumorszövetéből izoláltak. A májban lévő metasztatikus helyről származik, ami azt jelzi, hogy másodlagos tumorból származik, ami különösen értékessé teszi az áttétképző folyamatok és a hasnyálmirigyrák biológiájának kutatásában. A sejtek epiteliális morfológiát mutatnak, és széles körben használták őket a hasnyálmirigyrák, a gyógyszerrezisztencia és a tumorbiológia tanulmányozására.
A Capan-2 sejtekről ismert, hogy a hasnyálmirigyrákban gyakran előforduló mutáció, a Kirsten rat sarcoma viral oncogene homológ (KRAS) mutáns formáját expresszálják, így a sejtek robusztus modellként szolgálnak a KRAS által vezérelt tumorigenezis tanulmányozására.
Emellett jellemző rájuk a p53 tumorszupresszor gén mutációinak kifejeződése, és megfigyelték, hogy kromoszóma-instabilitást mutatnak, amelyek kritikus jellemzők a rák progressziója és a kezelésre adott válasz szempontjából. Ezt a sejtvonalat számos vizsgálatban használták, többek között a kemoterápiás hatékonyság értékelésére, a rák progressziójának molekuláris útvonalainak feltárására és célzott terápiás stratégiák kidolgozására.

Szövet	Hasnyálmirigy
Betegség	Adenokarcinóma

Szinonimák

- CaPan-2
- CAPAN-2
- Capan 2
- CAPAN 2
- Capan2
- CAPAN2

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Férfi
Növekedési tulajdonságok	Hűséges
Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Morfológia	Poligonális

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Daganatképző	Igen, meztelen egereken. Jól differenciált adenokarcinómát képez, amely megfelel a hasnyálmirigy karcinómának
Ploidiaállapot	Aneuploid
Kettőzési idő	45-60 óra

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

Capan-2 (Cytion katalógusszám: 300144)

NCBI adóazonosító szám	9606
Cellosaurus	CVCL_0026

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Fehérjeexpresszió

P53 negatív

Antigén-expresszió

B vércsoport, Rh+

Izoenzimek

Me-2, 2, PGM3, 2, PGM1, 1, ES-D, 1, AK-1, 1, G6PD, B, GLO-1, 2, Phenotype Frequency Product: 0.0004

Mutációs profil

A Capan-2 sejtek heterozigóta Kras mutációt hordoznak a 12-es kodonban: GGT>GTT

Termékek

Mucin (apomucin, MUC-1, MUC-2)

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

McCoys 5a, w: 3,0 g/L glükóz, w: stabil glutamin, w: 2,0 mM nátrium-piruvát, w: 2,2 g/L NaHCO3 (Cytion cikkszám: 820200a)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.

Kiegészítők

A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel

Diszociációs reagens	Accutase

Átültetés

Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.

Ültetési sűrűség	1 x 10^4 sejt/cm^2 7 napon belül konfluens monoréteget eredményez.
Folyadékcsere	hetente 2-3 alkalommal
Az olvadás utáni helyreállás	Felolvasztás után helyezze a sejteket 5 x 10^4 sejt/cm^2 sűrűséggel a lemezre, és hagyja, hogy a sejtek felépüljenek a fagyasztási folyamatból, és legalább 48 órán át tapadjanak.

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	56 év
Etnikai hovatartozás	Kaukázusi

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes