Capan-2 cellen

300144

De Capan-2 cellijn is een menselijke pancreas adenocarcinoom cellijn die voor het eerst geïsoleerd werd uit het pancreastumorweefsel van een 56-jarige Kaukasische man. De lijn was afkomstig van metastase in de lever, wat duidt op de oorsprong van een secundaire tumor, waardoor de lijn bijzonder waardevol is voor onderzoek naar metastatische processen en de biologie van alvleesklierkanker. De cellen vertonen een epitheliale morfologie en zijn uitgebreid gebruikt om alvleesklierkanker, resistentie tegen medicijnen en tumorbiologie te bestuderen.
Van Capan-2 cellen is bekend dat ze een gemuteerde vorm van het Kirsten rat sarcoma virale oncogen homolog (KRAS) tot expressie brengen, een veel voorkomende mutatie in alvleesklierkanker, waardoor ze een robuust model vormen voor het bestuderen van KRAS-gedreven tumorigenese. Daarnaast worden ze gekenmerkt door de expressie van tumorsuppressorgene p53-mutaties en is waargenomen dat ze chromosomale instabiliteit vertonen, wat kritieke kenmerken zijn die relevant zijn voor de progressie van kanker en de respons op behandelingen. Deze cellijn is gebruikt in talloze onderzoeken, waaronder onderzoeken naar de werkzaamheid van chemotherapeutica, het verkennen van moleculaire routes van kankerprogressie en het ontwikkelen van gerichte therapiestrategieën.

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

De Capan-2 cellijn is een menselijke pancreas adenocarcinoom cellijn die voor het eerst geïsoleerd werd uit het pancreastumorweefsel van een 56-jarige Kaukasische man. De lijn was afkomstig van metastase in de lever, wat duidt op de oorsprong van een secundaire tumor, waardoor de lijn bijzonder waardevol is voor onderzoek naar metastatische processen en de biologie van alvleesklierkanker. De cellen vertonen een epitheliale morfologie en zijn uitgebreid gebruikt om alvleesklierkanker, resistentie tegen medicijnen en tumorbiologie te bestuderen.
Van Capan-2 cellen is bekend dat ze een gemuteerde vorm van het Kirsten rat sarcoma virale oncogen homolog (KRAS) tot expressie brengen, een veel voorkomende mutatie in alvleesklierkanker, waardoor ze een robuust model vormen voor het bestuderen van KRAS-gedreven tumorigenese. Daarnaast worden ze gekenmerkt door de expressie van tumorsuppressorgene p53-mutaties en is waargenomen dat ze chromosomale instabiliteit vertonen, wat kritieke kenmerken zijn die relevant zijn voor de progressie van kanker en de respons op behandelingen. Deze cellijn is gebruikt in talloze onderzoeken, waaronder onderzoeken naar de werkzaamheid van chemotherapeutica, het verkennen van moleculaire routes van kankerprogressie en het ontwikkelen van gerichte therapiestrategieën.

Weefsel	Alvleesklier
Ziekte	Adenocarcinoom

Synoniemen

- CaPan-2
- CAPAN-2
- Capan 2
- CAPAN 2
- Capan2
- CAPAN2

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Man
Groei-eigenschappen	Aanhanger
Bioveiligheidsniveau	1

KENMERKEN

Morfologie	Veelhoekig

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Tumorverwekkend	Ja, in naakte muizen. Vormt goed gedifferentieerd adenocarcinoom consistent met pancreascarcinoom
Ploïdie	Aneuploïde
Verdubbelingstijd	45 tot 60 uur

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

Capan-2 (Cytion catalogusnummer 300144)

NCBI-belastingnummer	9606
Cellosaurus	CVCL_0026

EXPRESSIE EN VATBAARHEID

Eiwit-expressie

P53 negatief

Antigeenexpressie

Bloedgroep B, Rh+

Iso-enzymen

Me-2, 2, PGM3, 2, PGM1, 1, ES-D, 1, AK-1, 1, G6PD, B, GLO-1, 2, Fenotype Frequentie Product: 0.0004

Mutatieprofiel

Capan-2 cellen dragen een heterozygote Kras-mutatie in codon12: GGT>GTT

Producten

Mucine (apomucine, MUC-1, MUC-2)

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

McCoys 5a, w: 3,0 g/L Glucose, w: stabiel Glutamine, w: 2,0 mM Natriumpyruvaat, w: 2,2 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820200a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 10% FBS

Dissociatiereagens	Accutase

Heruitplanten

Verwijder het oude medium van de adherente cellen en was ze met PBS zonder calcium en magnesium. Gebruik voor T25-flesjes 3-5 ml PBS en voor T75-flesjes 5-10 ml. Bedek de cellen vervolgens volledig met Accutase, met 1-2 ml voor T25-flesjes en 2,5 ml voor T75-flesjes. Laat de cellen gedurende 8-10 minuten bij kamertemperatuur incuberen om ze los te maken. Na incubatie de cellen voorzichtig mengen met 10 ml medium om ze te resuspenderen en vervolgens centrifugeren bij 300xg gedurende 3 minuten. Gooi het supernatant weg, resuspendeer de cellen in vers medium en breng ze over in nieuwe kolven die al vers medium bevatten.

Zaaidichtheid	1 x 10^4 cellen/cm^2 resulteert binnen 7 dagen in een confluente monolaag.
Vloeistofverversing	2 tot 3 keer per week
Herstel na ontdooiing	Na ontdooien, zaai de cellen uit op 5 x 10^4 cellen/cm^2 en laat de cellen minstens 48 uur herstellen van het invriesproces en zich hechten.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	56 jaar
Etnische afkomst	Kaukasisch

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes