Capan-2 Hücreleri

300144

Capan-2 hücre hattı, ilk olarak 56 yaşında Kafkasyalı bir erkeğin pankreatik tümör dokusundan izole edilen bir insan pankreatik adenokarsinom hücre hattıdır. Karaciğerdeki metastatik bölgeden türetilmiştir, bu da ikincil bir tümörden kaynaklandığını gösterir, bu da onu metastatik süreçler ve pankreas kanseri biyolojisi üzerine araştırmalar için özellikle değerli kılar. Hücreler epitelyal morfoloji sergiler ve pankreas kanseri, ilaç direnci ve tümör biyolojisini incelemek için kapsamlı bir şekilde kullanılmıştır.
Capan-2 hücrelerinin, pankreas kanserinde yaygın bir mutasyon olan Kirsten sıçan sarkomu viral onkogen homologunun (KRAS) mutasyona uğramış bir formunu ifade ettiği bilinmektedir, bu da onları KRAS kaynaklı tümörijenezi incelemek için sağlam bir model haline getirmektedir. Ek olarak, tümör baskılayıcı gen p53 mutasyonlarının ekspresyonu ile karakterize edilirler ve kanser ilerlemesi ve tedavi yanıtı ile ilgili kritik özellikler olan kromozomal dengesizlikler sergiledikleri gözlemlenmiştir. Bu hücre hattı, kemoterapötik etkinliğin değerlendirilmesi, kanser ilerlemesinin moleküler yolaklarının araştırılması ve hedefe yönelik tedavi stratejilerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda çalışmada kullanılmıştır.

GENEL BILGILER

Açıklama

Capan-2 hücre hattı, ilk olarak 56 yaşında Kafkasyalı bir erkeğin pankreatik tümör dokusundan izole edilen bir insan pankreatik adenokarsinom hücre hattıdır. Karaciğerdeki metastatik bölgeden türetilmiştir, bu da ikincil bir tümörden kaynaklandığını gösterir, bu da onu metastatik süreçler ve pankreas kanseri biyolojisi üzerine araştırmalar için özellikle değerli kılar. Hücreler epitelyal morfoloji sergiler ve pankreas kanseri, ilaç direnci ve tümör biyolojisini incelemek için kapsamlı bir şekilde kullanılmıştır.
Capan-2 hücrelerinin, pankreas kanserinde yaygın bir mutasyon olan Kirsten sıçan sarkomu viral onkogen homologunun (KRAS) mutasyona uğramış bir formunu ifade ettiği bilinmektedir, bu da onları KRAS kaynaklı tümörijenezi incelemek için sağlam bir model haline getirmektedir. Ek olarak, tümör baskılayıcı gen p53 mutasyonlarının ekspresyonu ile karakterize edilirler ve kanser ilerlemesi ve tedavi yanıtı ile ilgili kritik özellikler olan kromozomal dengesizlikler sergiledikleri gözlemlenmiştir. Bu hücre hattı, kemoterapötik etkinliğin değerlendirilmesi, kanser ilerlemesinin moleküler yolaklarının araştırılması ve hedefe yönelik tedavi stratejilerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda çalışmada kullanılmıştır.

Doku	Pankreas
Hastalık	Adenokarsinom

Eş anlamlılar

- CaPan-2
- CAPAN-2
- Capan 2
- CAPAN 2
- Capan2
- CAPAN2

SINIFLANDIRMA

Canlı	İnsan
Cinsiyet	Erkek
Büyüme özellikleri	Bağlı
Biyogüvenlik seviyesi	1

ÖZELLIKLER

Morfoloji	Çokgen

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Tümör oluşturucu	Evet, çıplak farelerde. Pankreas karsinomu ile uyumlu iyi diferansiye adenokarsinom oluşturur
Ploidi durumu	Aneuploid
İki katına çıkma süresi	45 ila 60 saat

TANIMLAYICILAR

Kaynak gösterimi

Capan-2 (Cytion katalog numarası 300144)

NCBI Vergi Kimlik Numarası	9606
Cellosaurus	CVCL_0026

İFADE VE DUYARLILIK

Protein ekspresyonu

P53 negatif

Antijen ekspresyonu

Kan Grubu B, Rh+

İzoenzimler

Me-2, 2, PGM3, 2, PGM1, 1, ES-D, 1, AK-1, 1, G6PD, B, GLO-1, 2, Fenotip Frekans Ürünü: 0.0004

Mutasyon profili

Capan-2 hücreleri kodon12'de heterozigot Kras mutasyonu taşır: GGT>GTT

Ürünler

Müsin (apomüsin, MUC-1, MUC-2)

İŞLEME VE YETIŞTIRME

Besiyeri

McCoys 5a, w: 3.0 g/L Glukoz, w: stabil Glutamin, w: 2.0 mM Sodyum piruvat, w: 2.2 g/L NaHCO3 (Cytion makale numarası 820200a)

Kuluçka ortamı	37°C, %5CO2, nemlendirilmiş atmosfer.

Takviyeler

Ortamı %10 FBS ile takviye edin

Ayrıştırma reaktifi	Accutase

Alt kültür oluşturma

Yapışık hücrelerden eski ortamı çıkarın ve kalsiyum ve magnezyum içermeyen PBS ile yıkayın. T25 şişeleri için 3-5 ml PBS ve T75 şişeleri için 5-10 ml kullanın. Ardından, T25 flasklar için 1-2 ml ve T75 flasklar için 2,5 ml kullanarak hücreleri Accutase ile tamamen kaplayın. Hücreleri ayırmak için oda sıcaklığında 8-10 dakika inkübasyona bırakın. İnkübasyondan sonra, hücreleri yeniden süspanse etmek için 10 ml besiyeriyle hafifçe karıştırın, ardından 300xg'de 3 dakika santrifüjleyin. Süpernatantı atın, hücreleri taze besiyerinde yeniden süspanse edin ve zaten taze besiyeri içeren yeni şişelere aktarın.

Ekim yoğunluğu	1 x 10^4 hücre/cm2, 7 gün içinde birleşik tek tabaka oluşturacaktır.
Sıvı değişimi	haftada 2 ila 3 kez
Çözülme sonrası toparlanma	Çözüldükten sonra, hücreleri 5 x 10^4 hücre/cm^2 olarak plakaya yerleştirin ve hücrelerin dondurma işleminden kurtulmasını ve en az 48 saat boyunca yapışmasını bekleyin.

Çözme ve kültürleme

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KALITE KONTROL VE KRIYOPREZERVASYON

Kısırlık

Mikoplazma kontaminasyonu hem PCR tabanlı tahliller hem de lüminesans tabanlı mikoplazma tespit yöntemleri kullanılarak dışlanır. Bakteriyel, fungal veya maya kontaminasyonu olmadığından emin olmak için hücre kültürleri günlük görsel incelemelere tabi tutulur.

Dondurma ortamı	Kriyoprezervasyon ortamı olarak, yeterli çözülme sonrası canlılık için tam büyüme ortamı (FBS dahil) + %10 DMSO veya iyileşmeyi artırmak ve kriyo-indüklenmiş stresi azaltmak için optimize edilmiş ozmoprotektanlar ve metabolik stabilizatörler içeren CM-1 (Cytion katalog numarası 800100) kullanıyoruz.

Saklama koşulları

Uzun süreli muhafaza için flakonları yaklaşık -150 ila -196 °C'de buhar fazlı sıvı nitrojen içine yerleştirin. 80 °C'de saklama yalnızca sıvı nitrojene aktarılmadan önce kısa bir ara adım olarak kabul edilebilir.

Nakliye koşulları

Kriyoprezerve edilmiş hücre hatları, nakliye boyunca yaklaşık -78 °C'yi korumak için yeterli soğutucu akışkan içeren, onaylanmış, yalıtılmış ambalajlarda kuru buz üzerinde gönderilir. Teslim aldığınızda, kabı hemen inceleyin ve flakonları gecikmeden uygun depoya aktarın.

BAĞIŞÇI

Bağışçının yaşı	56 yıl
Etnik köken	Kafkas

YASAL VE GÜVENLIK

Güvenlik önlemleri

İleride çözdürmek üzere sıvı nitrojen içinde bir kriyoviyal saklamayı planlarken, sıkı güvenlik önlemlerine uymak zorunludur. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler şarttır ve dondurulmuş numunelerin sıvı nitrojen tankına veya tanktan transferi sırasında yüz maskesi veya koruyucu gözlük kullanılması gerekir. Bu, çıkarma sırasında keskin parçaların fırlamasına neden olabilecek potansiyel kriyoviyal patlamalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak içindir.

Garanti

Cytion olarak ürünlerimizin kalitesinin ve canlılığının arkasındayız.
Hücrelerimizin, tesislerimizden sevkiyattan sonra 60 gün boyunca kültürün başlangıcında canlı olacağını garanti ediyoruz.
Tüm malzemelerin Analiz Sertifikası ve/veya Ürün Sayfasında açıklanan özelliklere uygun olduğunu garanti ediyoruz
Tüm ayrıntılar için lütfen <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garanti Beyanımıza bakın

Malzeme Transfer Anlaşması gereklidir	Yes