Κύτταρα CCRF-CEM

300147

Τα κύτταρα CCRF-CEM είναι ένας τύπος ανθρώπινων Τ λεμφοβλαστών που χρησιμοποιούνται συνήθως στην ανοσο-ογκολογική και ανοσολογική έρευνα. Τα κύτταρα αυτά απομονώθηκαν από το περιφερικό αίμα μιας 4χρονης Καυκάσιας με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ).
Τα CCRF-CEM αναπτύσσονται σε εναιώρημα και μπορούν να επιτύχουν υψηλή κυτταρική πυκνότητα όταν καλλιεργούνται σε φιάλες spinner. Η ανάλυση του καρυότυπου των κυττάρων CCRF-CEM έδειξε έναν μέσο αριθμό 47 χρωμοσωμάτων, που κυμαίνεται από 41 έως 95. Δεν παρουσιάζουν σταθερή απώλεια ή αύξηση συγκεκριμένων χρωμοσωμάτων και δεν έχουν χρωμοσώματα-δείκτες. Ωστόσο, το 28% των κυττάρων με 45 χρωμοσώματα εμφάνισαν C- και το 53% όλων των κυττάρων είχαν ένα επιπλέον D και το 35% είχαν ένα επιπλέον F.
Τα κύτταρα CCRF-CEM είναι καρκινικά και μπορούν να προκαλέσουν όγκους στα συριακά χάμστερ. Τα κύτταρα αυτά εκφράζουν γονίδια και αντιγόνα CD3, CD5, CD7 και CD4. Επιπλέον, η ανάλυση ισοενζύμων έδειξε ADA, 1, ES-D, 1, G6PD, B, GLO-I, 1, PEP-D, 1, PGD, C, PGM1, 1, PGM3, 0. Τα κύτταρα αυτά αναφέρεται ότι είναι απαλλαγμένα από σωματίδια ιού, όπως προσδιορίζεται με ηλεκτρονική μικροσκοπία.
Μια μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός ρεσβερατρόλης και πρεδνιζολόνης προκάλεσε απόπτωση σε κύτταρα CCRF-CEM με τρόπο που εξαρτάται από το χρόνο και τη δόση. Η συνδυασμένη θεραπεία έδειξε συνεργιστικά αποτελέσματα στην υπερέκφραση του BAx και στην υπορύθμιση του BCL2.

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Περιγραφή

Τα κύτταρα CCRF-CEM είναι ένας τύπος ανθρώπινων Τ λεμφοβλαστών που χρησιμοποιούνται συνήθως στην ανοσο-ογκολογική και ανοσολογική έρευνα. Τα κύτταρα αυτά απομονώθηκαν από το περιφερικό αίμα μιας 4χρονης Καυκάσιας με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ).
Τα CCRF-CEM αναπτύσσονται σε εναιώρημα και μπορούν να επιτύχουν υψηλή κυτταρική πυκνότητα όταν καλλιεργούνται σε φιάλες spinner. Η ανάλυση του καρυότυπου των κυττάρων CCRF-CEM έδειξε έναν μέσο αριθμό 47 χρωμοσωμάτων, που κυμαίνεται από 41 έως 95. Δεν παρουσιάζουν σταθερή απώλεια ή αύξηση συγκεκριμένων χρωμοσωμάτων και δεν έχουν χρωμοσώματα-δείκτες. Ωστόσο, το 28% των κυττάρων με 45 χρωμοσώματα εμφάνισαν C- και το 53% όλων των κυττάρων είχαν ένα επιπλέον D και το 35% είχαν ένα επιπλέον F.
Τα κύτταρα CCRF-CEM είναι καρκινικά και μπορούν να προκαλέσουν όγκους στα συριακά χάμστερ. Τα κύτταρα αυτά εκφράζουν γονίδια και αντιγόνα CD3, CD5, CD7 και CD4. Επιπλέον, η ανάλυση ισοενζύμων έδειξε ADA, 1, ES-D, 1, G6PD, B, GLO-I, 1, PEP-D, 1, PGD, C, PGM1, 1, PGM3, 0. Τα κύτταρα αυτά αναφέρεται ότι είναι απαλλαγμένα από σωματίδια ιού, όπως προσδιορίζεται με ηλεκτρονική μικροσκοπία.
Μια μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός ρεσβερατρόλης και πρεδνιζολόνης προκάλεσε απόπτωση σε κύτταρα CCRF-CEM με τρόπο που εξαρτάται από το χρόνο και τη δόση. Η συνδυασμένη θεραπεία έδειξε συνεργιστικά αποτελέσματα στην υπερέκφραση του BAx και στην υπορύθμιση του BCL2.

Ιστός	Περιφερικό αίμα
Ασθένεια	Λευχαιμία

Συνώνυμα

- CCRF/CEM
- CCRFCEM
- CCRF.CEM
- CCRF CEM
- CCRF
- CEM
- CEM-CCRF
- CEM-CCRF (CAMR)
- CCRF/CEM/0
- CEM/0
- CEM-0
- CCRF-CEM/S
- GM03671
- GM03671C

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ

Οργανισμός	Άνθρωπος
Σεξ	Γυναίκα
Ιδιότητες ανάπτυξης	Αναστολή
Επίπεδο βιοασφάλειας	1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Μορφολογία	Πολύμορφα κύτταρα, μεγάλοι πυρήνες, σχηματισμός μικροβίων
Τύπος κυττάρου	Τ λεμφοβλάστης
Ογκογόνος	Ναι, σε γυμνά ποντίκια
Πολυπλοειδής κατάσταση	Ανευπλοειδές
Κατάσταση MSI	Ασταθής (MSI)
Χρόνος διπλασιασμού	24 ώρες

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΆ

Παραπομπή

CCRF-CEM (αριθμός καταλόγου Cytion 300147)

Αριθμός φορολογικού μητρώου NCBI	9606
Κελλοσαύρος	CVCL_0207

ΈΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ

Έκφραση πρωτεϊνών

P53 αρνητικό

Έκφραση αντιγόνου

CD3 B (37%), CD4 (50%), CD5 (95%), CD7 (77%)

Ισοένζυμα

G6PD, B

Ιοί

EBV αρνητικό

Αντίστροφη μεταγραφάση	Αρνητικό

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ

Θρεπτικό μέσο

RPMI 1640, w: 2,0 mM σταθερής γλουταμίνης, w: 2,0 g/L NaHCO3 (αριθμός άρθρου Cytion 820700a)

Ατμόσφαιρα επώασης	37°C, 5%CO2, υγροποιημένη ατμόσφαιρα.

Συμπληρώματα

Συμπληρώστε το θρεπτικό μέσο με 10% θερμικά αδρανοποιημένο FBS

Αναπαραγωγή σε υποκαλλιέργεια

Διατηρήστε τις καλλιέργειες προσθέτοντας ή αντικαθιστώντας περιοδικά το μέσο. Ξεκινήστε τις καλλιέργειες με πυκνότητα 5 x 10^5 κύτταρα/ml και διατηρήστε τη συγκέντρωση των κυττάρων εντός του εύρους 3 x 10^5 έως 1 x 10^6 κύτταρα/ml για βέλτιστη ανάπτυξη.

Πυκνότητα σποράς	Ξεκινήστε νέες καλλιέργειες με 1 x 10^5 κύτταρα/ml
Ανανέωση υγρών	Κάθε 3 ημέρες
Ανάκαμψη μετά την απόψυξη	Αφήστε τα κύτταρα να ανακάμψουν από τη διαδικασία κατάψυξης για τουλάχιστον 48 ώρες.

Απόψυξη και καλλιέργεια

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Στειρότητα

Η μόλυνση από μυκόπλασμα αποκλείεται με τη χρήση τόσο των δοκιμασιών που βασίζονται στην PCR όσο και των μεθόδων ανίχνευσης μυκοπλάσματος με βάση τη φωταύγεια.
Για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει μόλυνση από βακτήρια, μύκητες ή ζύμες, οι κυτταροκαλλιέργειες υποβάλλονται σε καθημερινές οπτικές επιθεωρήσεις.

Μέσο κατάψυξης	Ως μέσο κρυοσυντήρησης, χρησιμοποιούμε πλήρες μέσο ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένου του FBS) + 10% DMSO για επαρκή βιωσιμότητα μετά την απόψυξη, ή CM-1 (αριθμός καταλόγου Cytion 800100), το οποίο περιλαμβάνει βελτιστοποιημένα ωσμοπροστατευτικά και μεταβολικούς σταθεροποιητές για την ενίσχυση της ανάκαμψης και τη μείωση του στρες που προκαλείται από την κρυοσυντήρηση.

Συνθήκες αποθήκευσης

Για μακροχρόνια συντήρηση, τοποθετήστε τα φιαλίδια σε υγρό άζωτο σε φάση ατμών σε θερμοκρασία περίπου -150 έως -196 °C. Η αποθήκευση στους -80 °C είναι αποδεκτή μόνο ως σύντομο ενδιάμεσο βήμα πριν από τη μεταφορά σε υγρό άζωτο.

Όροι αποστολής

Οι κρυοσυντηρημένες κυτταρικές σειρές αποστέλλονται σε ξηρό πάγο σε επικυρωμένη, μονωμένη συσκευασία με επαρκές ψυκτικό μέσο για τη διατήρηση περίπου των -78 °C καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατά την παραλαβή, επιθεωρήστε αμέσως τον περιέκτη και μεταφέρετε τα φιαλίδια χωρίς καθυστέρηση στην κατάλληλη αποθήκη.

ΔΩΡΗΤΉΣ

Ηλικία δωρητή	4 χρόνια
Εθνικότητα	Καυκάσιος

ΝΟΜΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Μέτρα ασφαλείας

Όταν σχεδιάζετε να αποθηκεύσετε ένα κρυοφιαλίδιο σε υγρό άζωτο για μελλοντική απόψυξη, είναι υποχρεωτικό να τηρείτε αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Τα κατάλληλα προστατευτικά γάντια και ο κατάλληλος προστατευτικός ρουχισμός είναι απαραίτητα, ενώ απαιτείται η χρήση μάσκας προσώπου ή γυαλιών ασφαλείας κατά τη μεταφορά κατεψυγμένων δειγμάτων προς ή από τη δεξαμενή υγρού αζώτου. Αυτό γίνεται για να μετριαστεί ο κίνδυνος τραυματισμού από πιθανές εκρήξεις κρυοσωλήνων κατά την απομάκρυνση, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην προβολή αιχμηρών θραυσμάτων.

Εγγύηση

Στην Cytion, υποστηρίζουμε την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων μας.
Εγγυόμαστε ότι τα κύτταρά μας θα είναι βιώσιμα κατά την έναρξη της καλλιέργειας για 60 ημέρες μετά την αποστολή από τις εγκαταστάσεις μας.
Διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα υλικά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Πιστοποιητικό Ανάλυσης ή/και στο Φύλλο Προϊόντος
Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Δήλωση εγγύησης

Απαιτείται συμφωνία μεταφοράς υλικού	Yes