Celice CCRF-CEM

300147

Celice CCRF-CEM so vrsta človeških limfoblastov T, ki se pogosto uporabljajo v imunoonkoloških in imunoloških raziskavah. Te celice so bile izolirane iz periferne krvi 4-letne belopolte ženske z akutno limfoblastno levkemijo (ALL).
CCRF-CEM rastejo v suspenziji in lahko dosežejo visoko gostoto celic pri gojenju v vrtečih se bučkah. Kariotipska analiza celic CCRF-CEM je pokazala, da je povprečno število kromosomov 47, od 41 do 95. Pri njih ni opaziti stalnih izgub ali prirastkov določenih kromosomov in markerskih kromosomov. Vendar je 28 % celic s 45 kromosomi pokazalo C-, 53 % vseh celic je imelo dodaten D, 35 % pa dodaten F.
Celice CCRF-CEM so tumorogene in lahko povzročijo tumorje pri sirskih hrčkih. Te celice izražajo gene in antigene CD3, CD5, CD7 in CD4. Poleg tega je analiza izoencimov pokazala ADA, 1; ES-D, 1; G6PD, B; GLO-I, 1; PEP-D, 1; PGD, C; PGM1, 1; PGM3, 0. Te celice naj ne bi vsebovale virusnih delcev, kot je določeno z elektronskim mikroskopom.
Študija je pokazala, da kombinacija resveratrola in prednizolona povzroči apoptozo v celicah CCRF-CEM v odvisnosti od časa in odmerka. Zdravljenje s kombinacijo je pokazalo sinergistične učinke na prekomerno izražanje BAx in zniževanje BCL2.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Opis

Celice CCRF-CEM so vrsta človeških limfoblastov T, ki se pogosto uporabljajo v imunoonkoloških in imunoloških raziskavah. Te celice so bile izolirane iz periferne krvi 4-letne belopolte ženske z akutno limfoblastno levkemijo (ALL).
CCRF-CEM rastejo v suspenziji in lahko dosežejo visoko gostoto celic pri gojenju v vrtečih se bučkah. Kariotipska analiza celic CCRF-CEM je pokazala, da je povprečno število kromosomov 47, od 41 do 95. Pri njih ni opaziti stalnih izgub ali prirastkov določenih kromosomov in markerskih kromosomov. Vendar je 28 % celic s 45 kromosomi pokazalo C-, 53 % vseh celic je imelo dodaten D, 35 % pa dodaten F.
Celice CCRF-CEM so tumorogene in lahko povzročijo tumorje pri sirskih hrčkih. Te celice izražajo gene in antigene CD3, CD5, CD7 in CD4. Poleg tega je analiza izoencimov pokazala ADA, 1; ES-D, 1; G6PD, B; GLO-I, 1; PEP-D, 1; PGD, C; PGM1, 1; PGM3, 0. Te celice naj ne bi vsebovale virusnih delcev, kot je določeno z elektronskim mikroskopom.
Študija je pokazala, da kombinacija resveratrola in prednizolona povzroči apoptozo v celicah CCRF-CEM v odvisnosti od časa in odmerka. Zdravljenje s kombinacijo je pokazalo sinergistične učinke na prekomerno izražanje BAx in zniževanje BCL2.

Tkivo	Periferna kri
Bolezen	Levkemija

Sinonimi

- CCRF/CEM
- CCRFCEM
- CCRF.CEM
- CCRF CEM
- CCRF
- CEM
- CEM-CCRF
- CEM-CCRF (CAMR)
- CCRF/CEM/0
- CEM/0
- CEM-0
- CCRF-CEM/S
- GM03671
- GM03671C

RAZVRSTITEV

Organizem	Človek
Seks	Ženska

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Lastnosti rasti	Vzmetenje
Stopnja biološke varnosti	1

ZNAČILNOSTI

Morfologija	Polimorfne celice, velika jedra, nastanek mikrovilov
Vrsta celice	Limfoblast T
Tumorigeničen	Da, na golih miših
Ploidnost	Aneuploidni
Stanje MSI	Nestabilen (MSI)
Čas podvojitve	24 ur

IDENTIFIKATORJI

Navajanje vira

CCRF-CEM (kataloška številka Cytion 300147)

Davčna identifikacijska številka NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0207

IZRAŽANJE IN DOVZETNOST

Ekspresija beljakovin

P53 negativen

Ekspresija antigena

CD3 B (37 %), CD4 (50 %), CD5 (95 %), CD7 (77 %)

Izoenzimi

G6PD, B

Virusi

EBV negativen

Reversna transkriptaza	Negativni

RAVNANJE IN GOJENJE

Gojišče

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilnega glutamina, w: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (številka izdelka Cytion 820700a)

Inkubacijska atmosfera	37 °C, 5 %CO_2, vlažno ozračje.

Prehranska dopolnila

Gojišče dopolnite z 10 % toplotno aktiviranega FBS

Preusmeritev v drugo kulturo

Kulture vzdržujte z rednim dodajanjem ali zamenjavo gojišča. Kulture začnite z gostoto 5 x 10^5 celic/ml in za optimalno rast ohranjajte koncentracijo celic v območju od 3 x 10^5 do 1 x 10^6 celic/ml.

Gostota setve	Začnite nove kulture pri 1 x 10^5 celicah/ml.
Obnova tekočine	Vsakih 3 dni

Obnova po odtaljevanju	Počakajte vsaj 48 ur, da si celice opomorejo od zamrzovanja.

Odtaljevanje in gojenje

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KAKOVOSTI IN KRIOPREZERVACIJA

Sterilnost

Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence.
Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.

Medij za zamrzovanje	Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (kataloška številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročenega s kriom.

Pogoji shranjevanja

Za dolgotrajno shranjevanje viale postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196 °C. Shranjevanje pri -80 °C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

Pogoji dostave

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno -78 °C. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in viale nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

DONATOR

Starost darovalca	4 leta
Etnična pripadnost	Kavkaški

PRAVNE ZADEVE IN VARNOST

Varnostni ukrepi

Pri načrtovanju shranjevanja kriovialov v tekočem dušiku za kasnejše odtaljevanje je treba obvezno upoštevati stroge varnostne ukrepe. Nujni so ustrezne zaščitne rokavice in oblačila, med prenosom zamrznjenih vzorcev v rezervoar s tekočim dušikom ali iz njega pa je potrebna uporaba obrazne maske ali zaščitnih očal. S tem se zmanjša tveganje poškodb zaradi morebitnih eksplozij kriovialov pri odstranjevanju, ki lahko povzročijo izstrelitev ostrih delcev.

Garancija

V podjetju Cytion stojimo za kakovostjo in uporabnostjo svojih izdelkov.
Zagotavljamo, da bodo naše celice ob začetku gojenja še 60 dni po odpremi iz naših obratov vitalne.
Zagotavljamo, da so vsi materiali skladni s specifikacijami, opisanimi v potrdilu o analizi in/ali listu izdelka
Za vse podrobnosti si oglejte našo <a href=""/Kdo smo/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garancijsko izjavo

Potreben je sporazum o prenosu materiala	Yes