Клітини CCRF-CEM

300147

Клітини CCRF-CEM - це тип людських Т-лімфобластів, які широко використовуються в імуноонкологічних та імунологічних дослідженнях. Ці клітини були виділені з периферичної крові 4-річної європеоїдної жінки з гострою лімфобластною лейкемією (ГЛЛ). CCRF-CEM ростуть у суспензії і можуть досягати високої клітинної щільності при культивуванні в колбах зі спінером. Аналіз каріотипу клітин CCRF-CEM показав модальне число 47 хромосом, що варіює від 41 до 95. Вони не демонструють послідовної втрати або збільшення певних хромосом і не мають маркерних хромосом. Однак, 28% клітин з 45 хромосомами показали C-, 53% всіх клітин мали додаткову D-хромосому, а 35% - додаткову F-хромосому.
Клітини CCRF-CEM є туморогенними і можуть викликати пухлини у сирійських хом'яків. Ці клітини експресують гени та антигени CD3, CD5, CD7 і CD4. Крім того, ізоферментний аналіз показав наявність ADA, 1; ES-D, 1; G6PD, B; GLO-I, 1; PEP-D, 1; PGD, C; PGM1, 1; PGM3, 0. Повідомляється, що ці клітини не містять вірусних частинок, що підтверджується електронною мікроскопією.
Дослідження показало, що комбінація ресвератролу та преднізолону індукує апоптоз у клітинах CCRF-CEM у залежний від часу та дози спосіб. Комбіноване лікування показало синергічний вплив на гіперекспресію BAx та зниження регуляції BCL2.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Клітини CCRF-CEM - це тип людських Т-лімфобластів, які широко використовуються в імуноонкологічних та імунологічних дослідженнях. Ці клітини були виділені з периферичної крові 4-річної європеоїдної жінки з гострою лімфобластною лейкемією (ГЛЛ). CCRF-CEM ростуть у суспензії і можуть досягати високої клітинної щільності при культивуванні в колбах зі спінером. Аналіз каріотипу клітин CCRF-CEM показав модальне число 47 хромосом, що варіює від 41 до 95. Вони не демонструють послідовної втрати або збільшення певних хромосом і не мають маркерних хромосом. Однак, 28% клітин з 45 хромосомами показали C-, 53% всіх клітин мали додаткову D-хромосому, а 35% - додаткову F-хромосому.
Клітини CCRF-CEM є туморогенними і можуть викликати пухлини у сирійських хом'яків. Ці клітини експресують гени та антигени CD3, CD5, CD7 і CD4. Крім того, ізоферментний аналіз показав наявність ADA, 1; ES-D, 1; G6PD, B; GLO-I, 1; PEP-D, 1; PGD, C; PGM1, 1; PGM3, 0. Повідомляється, що ці клітини не містять вірусних частинок, що підтверджується електронною мікроскопією.
Дослідження показало, що комбінація ресвератролу та преднізолону індукує апоптоз у клітинах CCRF-CEM у залежний від часу та дози спосіб. Комбіноване лікування показало синергічний вплив на гіперекспресію BAx та зниження регуляції BCL2.

Тканина	Периферична кров
Хвороба	Лейкемія

Синоніми

- CCRF/CEM
- CCRFCEM
- CCRF.CEM
- CCRF CEM
- CCRF
- CEM
- CEM-CCRF
- CEM-CCRF (CAMR)
- CCRF/CEM/0
- CEM/0
- CEM-0
- CCRF-CEM/S
- GM03671
- GM03671C

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Секс	Жінка
Характеристики росту	Підвіска
Рівень біобезпеки	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфологія	Поліморфні клітини, великі ядра, утворення мікроворсинок
Тип клітини	Т-лімфобласт
Пухлиноутворювальний	Так, у голих мишей
Плоїдність	Анеуплоїдний
Статус MSI	Нестабільний (MSI)
Час подвоєння	24 години

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

CCRF-CEM (номер за каталогом Cytion 300147)

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_0207

ЕКСПРЕСІЯ ТА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ

Експресія білків

P53 негативний

Експресія антигену

CD3 B (37%), CD4 (50%), CD5 (95%), CD7 (77%)

Ізоферменти

G6PD, B

Віруси

EBV негативний

Зворотна транскриптаза	Негативно

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

RPMI 1640, w: 2,0 мМ стабільний глютамін, w: 2,0 г/л NaHCO3 (номер за каталожним номером 820700a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% термоінактивованого FBS

Пересадка в нове середовище

Підтримуйте культури, періодично додаючи або замінюючи середовище. Починайте культури з щільністю 5 x 10^5 клітин/мл і підтримуйте концентрацію клітин в діапазоні від 3 x 10^5 до 1 x 10^6 клітин/мл для оптимального росту.

Щільність висіву	Почніть нову культуру з 1 x 10^5 клітин/мл

Оновлення рідини	Кожні 3 дні
Відновлення після відлиги	Дайте клітинам відновитися після процесу заморожування протягом щонайменше 48 годин.

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	4 роки
Етнічна приналежність	Кавказець

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes