# IMR-32-solut

300148

IMR-32 on ihmisen neuroblastooma-solulinja, joka on peräisin sellaisen lapsen lisämunuaisydinytimestä, jolla on diagnosoitu neuroblastooma, pahanlaatuinen kasvain, joka on peräisin hermoruston soluista. Näillä soluilla on kypsymättömien hermosolujen ominaisuuksia, minkä vuoksi ne ovat arvokas malli hermosolujen erilaistumisen, neuroblastooman patogeneesin ja hermoston kehitysprosessien taustalla olevien molekyylimekanismien tutkimiseen. IMR-32-soluilla on suuri proliferaatiokapasiteetti, ja niillä on edelleen kyky syntetisoida katekoliamiineja, erityisesti dopamiinia ja noradrenaliinia, jotka ovat hermoston keskeisiä välittäjäaineita.
IMR-32-soluilla on diploidinen karyotyyppi, jossa on erityisiä neuroblastoomaan yleisesti liittyviä kromosomipoikkeavuuksia, kuten MYCN-onkogeenin monistuminen. Tämä ominaisuus tekee niistä erityisen hyödyllisiä neuroblastooman geneettisten ja molekulaaristen taustatekijöiden tutkimisessa, mukaan lukien MYCN:n rooli kasvainten synnyssä ja etenemisessä. Lisäksi IMR-32-soluja käytetään lääkeaineiden seulontamäärityksissä neuroblastoomaan kohdistuvien mahdollisten terapeuttisten aineiden tehokkuuden ja sytotoksisuuden arvioimiseksi. On kuitenkin tärkeää huomata, että nämä solut on tarkoitettu ainoastaan in vitro -tutkimustarkoituksiin eivätkä ne sovellu mihinkään terapeuttisiin tai in vivo -sovelluksiin.

## YLEISTÄ TIETOA

### Kuvaus

IMR-32 on ihmisen neuroblastooma-solulinja, joka on peräisin sellaisen lapsen lisämunuaisydinytimestä, jolla on diagnosoitu neuroblastooma, pahanlaatuinen kasvain, joka on peräisin hermoruston soluista. Näillä soluilla on kypsymättömien hermosolujen ominaisuuksia, minkä vuoksi ne ovat arvokas malli hermosolujen erilaistumisen, neuroblastooman patogeneesin ja hermoston kehitysprosessien taustalla olevien molekyylimekanismien tutkimiseen. IMR-32-soluilla on suuri proliferaatiokapasiteetti, ja niillä on edelleen kyky syntetisoida katekoliamiineja, erityisesti dopamiinia ja noradrenaliinia, jotka ovat hermoston keskeisiä välittäjäaineita.
IMR-32-soluilla on diploidinen karyotyyppi, jossa on erityisiä neuroblastoomaan yleisesti liittyviä kromosomipoikkeavuuksia, kuten MYCN-onkogeenin monistuminen. Tämä ominaisuus tekee niistä erityisen hyödyllisiä neuroblastooman geneettisten ja molekulaaristen taustatekijöiden tutkimisessa, mukaan lukien MYCN:n rooli kasvainten synnyssä ja etenemisessä. Lisäksi IMR-32-soluja käytetään lääkeaineiden seulontamäärityksissä neuroblastoomaan kohdistuvien mahdollisten terapeuttisten aineiden tehokkuuden ja sytotoksisuuden arvioimiseksi. On kuitenkin tärkeää huomata, että nämä solut on tarkoitettu ainoastaan in vitro -tutkimustarkoituksiin eivätkä ne sovellu mihinkään terapeuttisiin tai in vivo -sovelluksiin.

| | |
|---|---|
| **Kudos** | Aivot |
| **Sairaus** | Neuroblastooma |
| **Metastaasikohde** | Vatsa |

### Synonyymit

- IMR 32
- IMR32
- Institute for Medical Research-32
- GM03320
- GM3320C
- GM03320D
- AG03320
- AG3320

## LUOKITTELU

| | |
|---|---|
| **Organismi** | Ihminen |
| **Sukupuoli** | Mies |
| **Kasvuominaisuudet** | Kiinnittynyt |
| **Bioturvallisuustaso** | 1 |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

## OMINAISUUDET

| | |
|---|---|
| **Morfologia** | Fibroblastien kaltaiset |
| **Solutyyppi** | Neuroblastit |

## TUNNISTEET

**Lähdeviite**

IMR-32 (Cytionin luettelonumero 300148)

| | |
|---|---|
| **NCBI-verotunnus** | 9606 |
| **Cellosaurus** | CVCL_0346 |

## ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

**Isoentsyymit**

G6PD, B

**Viruksille altistuminen**

Vesicular stomatitis (Indiana), herpes simplex, vaccinia, coxsackievirus B3, poliovirus 3 (heikosti)

**Virusten kestävyys**

Echovirus 11

| | |
|---|---|
| **Käänteiskopioijaentsyymi** | Negatiivinen |

## KÄSITTELY JA VILJELY

**Viljelyalusta**

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamiini, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytionin artikkelinumero 820100a)

| | |
|---|---|
| **Inkubaatioilma** | 37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä. |

**Ravintolisät**

Täydennetään elatusainetta 10 % FBS:llä ja 1 % NEAA:lla

| | |
|---|---|
| **Dissosiaatioreagenssi** | Accutase |

**Soluviljely**

Poista vanha väliaine tarttuneista soluista ja pese ne PBS:llä, josta puuttuu kalsiumia ja magnesiumia. Käytä T25-pulloissa 3-5 ml PBS:ää ja T75-pulloissa 5-10 ml. Peitä sitten solut kokonaan Accutase-valmisteella, käyttäen 1-2 ml T25-pulloissa ja 2,5 ml T75-pulloissa. Anna solujen inkuboitua huoneenlämmössä 8-10 minuuttia solujen irtoamiseksi. Inkuboinnin jälkeen solut sekoitetaan varovasti 10 ml:n väliaineella niiden resuspendoimiseksi ja sentrifugoidaan sitten 300xg:n nopeudella 3 minuutin ajan. Hävitä supernatantti, suspendoi solut uudelleen tuoreeseen väliaineeseen ja siirrä ne uusiin pulloihin, jotka sisältävät jo tuoretta väliaineita.

| | |
|---|---|
| **Kylvötiheys** | 1 x $10^4$ solua/$cm^2$ |
| **Nesteen uusiminen** | 3-5 päivän välein |
| **Sulamisen jälkeinen palautuminen** | Sulattamisen jälkeen levitä solut 5 x $10^4$ solua/$cm^2$ ja anna solujen toipua pakastusprosessista ja kiinnittyä vähintään 24 tunnin ajan. |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

### Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

### Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

| | |
|---|---|
| **Jäädytysaine** | Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä. |

### Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

### Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

## LAHJOITTAJA

| | |
|---|---|
| **Luovuttajan ikä** | 13 kuukautta |
| **Etnisyys** | Kaukasialainen |

## OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

### Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

### Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Takuulausumassa

| | |
|---|---|
| **Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan** | Yes |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB