IMR-32-celler

300148

IMR-32 är en human neuroblastomcellinje som härrör från binjuremärgen hos ett barn som diagnostiserats med neuroblastom, en elakartad tumör som härstammar från neurallistceller. Dessa celler uppvisar egenskaper hos omogna neuronala celler, vilket gör dem till en värdefull modell för studier av neuronal differentiering, neuroblastompatogenes och de molekylära mekanismer som ligger bakom neurologiska utvecklingsprocesser. IMR-32-cellerna har en hög kapacitet för proliferation och behåller förmågan att syntetisera katekolaminer, särskilt dopamin och noradrenalin, som är viktiga signalsubstanser i nervsystemet.
IMR-32-cellerna har en diploid karyotyp med specifika kromosomavvikelser som vanligen förknippas med neuroblastom, t.ex. amplifiering av MYCN-onkogenen. Denna egenskap gör dem särskilt användbara för forskning om de genetiska och molekylära drivkrafterna bakom neuroblastom, inklusive MYCN:s roll i tumörernas uppkomst och utveckling. IMR-32-celler används dessutom i läkemedelsscreeningsanalyser för att utvärdera effekten och cytotoxiciteten hos potentiella terapeutiska medel riktade mot neuroblastom. Det är dock viktigt att notera att dessa celler endast är avsedda för in vitro-forskningsändamål och inte är lämpliga för några terapeutiska eller in vivo-tillämpningar.

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

IMR-32 är en human neuroblastomcellinje som härrör från binjuremärgen hos ett barn som diagnostiserats med neuroblastom, en elakartad tumör som härstammar från neurallistceller. Dessa celler uppvisar egenskaper hos omogna neuronala celler, vilket gör dem till en värdefull modell för studier av neuronal differentiering, neuroblastompatogenes och de molekylära mekanismer som ligger bakom neurologiska utvecklingsprocesser. IMR-32-cellerna har en hög kapacitet för proliferation och behåller förmågan att syntetisera katekolaminer, särskilt dopamin och noradrenalin, som är viktiga signalsubstanser i nervsystemet.
IMR-32-cellerna har en diploid karyotyp med specifika kromosomavvikelser som vanligen förknippas med neuroblastom, t.ex. amplifiering av MYCN-onkogenen. Denna egenskap gör dem särskilt användbara för forskning om de genetiska och molekylära drivkrafterna bakom neuroblastom, inklusive MYCN:s roll i tumörernas uppkomst och utveckling. IMR-32-celler används dessutom i läkemedelsscreeningsanalyser för att utvärdera effekten och cytotoxiciteten hos potentiella terapeutiska medel riktade mot neuroblastom. Det är dock viktigt att notera att dessa celler endast är avsedda för in vitro-forskningsändamål och inte är lämpliga för några terapeutiska eller in vivo-tillämpningar.

Vävnad	Hjärna
Sjukdom	Neuroblastom
Metastaseringsställe	Buken

Synonymer

- IMR 32
- IMR32
- Institute for Medical Research-32
- GM03320
- GM3320C
- GM03320D
- AG03320
- AG3320

KLASSIFICERING

Organism	Människa
Kön	Man
Tillväxtegenskaper	Följsam
Biosäkerhetsnivå	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EGENSKAPER

Morfologi	Fibroblastliknande
Celltyp	Neuroblast

IDENTIFIERARE

Källa

IMR-32 (Cytion katalognummer 300148)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_0346

UTTRYCK OCH MOTTAGLIGHET

Isoenzymer

G6PD, B

Virusmottaglighet

Vesikulär stomatit (Indiana), herpes simplex, vaccinia, coxsackievirus B3, poliovirus 3 (svagt)

Virusresistens

Echovirus 11

Omvänt transkriptas	Negativt

HANTERING OCH ODLING

Odlingsmedium

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamin, w: 2,2 g/L $NaHCO_3$, w: EBSS (Cytion artikelnummer 820100a)

Inkubationsatmosfär	37°C, 5%CO_2, befuktad atmosfär.

Kosttillskott

Komplettera mediet med 10% FBS och 1% NEAA

Dissociationsmedel	Accutase

Vidareodling

Ta bort det gamla mediet från de adherenta cellerna och tvätta dem med PBS som saknar kalcium och magnesium. Använd 3-5 ml PBS för T25-kolvar och 5-10 ml för T75-kolvar. Täck sedan cellerna helt med Accutase, använd 1-2 ml för T25-kolvar och 2,5 ml för T75-kolvar. Låt cellerna inkubera i rumstemperatur i 8-10 minuter så att de lossnar. Efter inkubationen, blanda cellerna försiktigt med 10 ml medium för att resuspendera dem och centrifugera sedan vid 300xg i 3 minuter. Kassera supernatanten, resuspendera cellerna i färskt medium och överför dem till nya kolvar som redan innehåller färskt medium.

Såtäthet	1 x 10^4 celler/cm^2
Vätskeförnyelse	Var 3:e till 5:e dag
Återhämtning efter upptining	Efter upptining, plattlägg cellerna med 5 x 10^4 celler/cm^2 och låt cellerna återhämta sig från frysprocessen och fästa i minst 24 timmar.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Upptining och odling

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OCH KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik. För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner.

Frysmedel	Som kryokonserveringsmedium använder vi komplett tillväxtmedium (inklusive FBS) + 10% DMSO för adekvat viabilitet efter upptining, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress.

Förvaringsförhållanden

För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve.

Leveransvillkor

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

DONATOR

Donatorns ålder	13 månader
Etnicitet	Kaukasisk

JURIDISKA FRÅGOR OCH SÄKERHET

Säkerhetsföreskrifter

När man planerar att förvara en kryovial i flytande kväve för framtida upptining är det obligatoriskt att följa strikta säkerhetsåtgärder. Lämpliga skyddshandskar och skyddskläder är nödvändiga, och ansiktsmask eller skyddsglasögon måste användas vid överföring av frysta prover till eller från tanken med flytande kväve. Detta för att minska risken för skador på grund av eventuella explosioner i frysbehållaren vid borttagning, vilket kan leda till att vassa fragment projiceras.

Garanti

På Cytion står vi bakom våra produkters kvalitet och livskraft.
Vi garanterar att våra celler är livsdugliga vid odlingens början i 60 dagar efter leverans från våra anläggningar.
Vi försäkrar att allt material överensstämmer med de specifikationer som beskrivs i analyscertifikatet och/eller produktbladet
För fullständig information, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantiförklaring

Avtal om materialöverföring krävs	Yes