Colo-320DM sejtek

300153

A COLO-320DM sejtvonal egy 55 éves kaukázusi nő metasztatikus helyéről származó humán kolorektális adenokarcinóma sejtvonal. Ez a sejtvonal egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek jelentősek a vastagbélrák metasztázisának és a kemoterápiás szerek hatásának tanulmányozása szempontjából. Figyelemre méltó a karcinoembryonális antigén (CEA) magas expressziója, amely értékes biomarker, amelyet a vastagbélrák megfigyelésében és diagnózisában használnak.
A COLO-320DM sejtek tapadó, epithelszerű morfológiájúak. Gyakran használják őket a vastagbélrák progressziójának és metasztázisának hátterében álló sejtes és molekuláris mechanizmusokra összpontosító kutatásokban. Ezenkívül következetes növekedési mintázatuknak és genetikai stabilitásuknak köszönhetően a passzázsok során megbízható modellként szolgálnak a rákos sejtek biológiáját, a gyógyszerre adott választ és a vastagbélrákkal kapcsolatos génexpressziót vizsgáló in vitro kísérletekhez.
Ezek a sejtek különösen érdekesek a genetikai vizsgálatok számára is, különösen azok számára, amelyek az áttétképződésben és a kemoterápiára adott válaszban szerepet játszó útvonalakkal kapcsolatosak. A kutatók a COLO-320DM-et használják a jelátviteli útvonalak, a hipoxiára adott sejtválasz, valamint a rákos sejtek és a tumor mikrokörnyezete közötti kölcsönhatások vizsgálatára. A sejtvonal fontos szerepet játszott a kolorektális karcinómára jellemző metasztatikus mechanizmusokat célzó terápiás stratégiák kifejlesztésében.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

A COLO-320DM sejtvonal egy 55 éves kaukázusi nő metasztatikus helyéről származó humán kolorektális adenokarcinóma sejtvonal. Ez a sejtvonal egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek jelentősek a vastagbélrák metasztázisának és a kemoterápiás szerek hatásának tanulmányozása szempontjából. Figyelemre méltó a karcinoembryonális antigén (CEA) magas expressziója, amely értékes biomarker, amelyet a vastagbélrák megfigyelésében és diagnózisában használnak.
A COLO-320DM sejtek tapadó, epithelszerű morfológiájúak. Gyakran használják őket a vastagbélrák progressziójának és metasztázisának hátterében álló sejtes és molekuláris mechanizmusokra összpontosító kutatásokban. Ezenkívül következetes növekedési mintázatuknak és genetikai stabilitásuknak köszönhetően a passzázsok során megbízható modellként szolgálnak a rákos sejtek biológiáját, a gyógyszerre adott választ és a vastagbélrákkal kapcsolatos génexpressziót vizsgáló in vitro kísérletekhez.
Ezek a sejtek különösen érdekesek a genetikai vizsgálatok számára is, különösen azok számára, amelyek az áttétképződésben és a kemoterápiára adott válaszban szerepet játszó útvonalakkal kapcsolatosak. A kutatók a COLO-320DM-et használják a jelátviteli útvonalak, a hipoxiára adott sejtválasz, valamint a rákos sejtek és a tumor mikrokörnyezete közötti kölcsönhatások vizsgálatára. A sejtvonal fontos szerepet játszott a kolorektális karcinómára jellemző metasztatikus mechanizmusokat célzó terápiás stratégiák kifejlesztésében.

Szövet	Vastagbél, Dukes C típusa
Betegség	Kolorektális adenokarcinóma

Szinonimák

- COLO_320DM
- COLO-320-DM
- COLO #320DM
- COLO320/DM
- COLO320-DM
- COLO320DM
- Colo320DM
- COLO320 DM
- COLO 320 DM
- COLO 320 (DM)
- Colorado 320 Double Minutes

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Nő

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Növekedési tulajdonságok	Hűséges
Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Morfológia	Lekerekített és fénytörő
Daganatképző	Igen, meztelen egerekben

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

COLO-320DM (Cytion katalógusszám 300153)

NCBI adóazonosító szám	9606
Cellosaurus	CVCL_0219

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Izoenzimek

PGM1,1, PGM3, 2, G6PD, B, PEP-D, 1, 6PGD, A, ES-D, 1

Termékek

Szerotonin, noradrenalin, adrenalin, adrenokortikotrop hormon (ACTH), mellékpajzsmirigyhormon

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

Ham's F12, w: 1,0 mM stabil glutamin, w: 1,0 mM nátrium-piruvát, w: 1,1 g/L NaHCO3 (Cytion cikkszám 820600a)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.

Kiegészítők

A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel

Diszociációs reagens	Accutase

Átültetés

Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.

Ültetési sűrűség	1 x 10^4 sejt/cm^2
Folyadékcsere	3-5 naponta
Az olvadás utáni helyreállás	Felolvasztás után helyezze a sejteket 5 x 10^4 sejt/cm^2 sűrűséggel lemezre, és hagyja, hogy a sejtek felolvadjanak és legalább 24 órán át tapadjanak.

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	55 év
Etnikai hovatartozás	Kaukázusi

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes