□□□□□ Colo-320DM

300153

□□□□□□□□ COLO-320DM □□□□□□□□□

Synonyms

- COLO_320DM
- COLO-320-DM
- COLO #320DM
- COLO320/DM
- COLO320-DM
- COLO320DM
- Colo320DM
- COLO320 DM
- COLO 320 DM
- COLO 320 (DM)
- Colorado 320 Double Minutes

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Tumourigenic	□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

IDENTIFIERS

Citation

COLO-320DM (□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 300153)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_0219

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Isoenzymes

PGM1,1, PGM3, 2, G6PD, B, PEP-D, 1, 6PGD, A, ES-D, 1

Products

□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (ACTH), □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

Ham's F12, w: 1.0 mM □□□□□□□□□□□□□□□□, w: 1.0 mM □□□□□□□□□□□□□□□□, w: 1.1 g/L NaHCO3 (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820600a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 10%

Dissociation reagent	□□□□□□□□

Subculturing

□□ PBS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ T25 □□□□□□□ PBS 3-5 □□. □□□□□□□□□□□□□□□ T75 □□□□□□□ 5-10 □□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ Accutase □□□□□□□ 1-2 □□. □□□□□□□□□□□ T25 □□□ 2.5 □□. □□□□□□□□□□□ T75□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8-10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Shipping conditions

□□□