Tế bào Colo-320DM

300153

Dòng tế bào COLO-320DM là dòng tế bào ung thư đại trực tràng ở người được thiết lập từ vị trí di căn của một phụ nữ da trắng 55 tuổi. Dòng tế bào này có những đặc điểm độc đáo quan trọng cho việc nghiên cứu quá trình di căn của ung thư đại trực tràng và tác động của các thuốc hóa trị. Đáng chú ý là dòng tế bào này có biểu hiện cao của kháng nguyên ung thư phôi (CEA), một chỉ số sinh học quan trọng được sử dụng trong theo dõi và chẩn đoán ung thư đại trực tràng.

Tế bào COLO-320DM có tính bám dính với hình thái biểu mô. Chúng thường được sử dụng trong nghiên cứu tập trung vào các cơ chế tế bào và phân tử liên quan đến sự tiến triển và di căn của ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, do có mô hình tăng trưởng ổn định và tính ổn định di truyền qua các thế hệ nuôi cấy, chúng là mô hình đáng tin cậy cho các thí nghiệm in vitro nghiên cứu sinh học tế bào ung thư, phản ứng với thuốc và biểu hiện gen liên quan đến ung thư đại trực tràng.

Các tế bào này cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt trong các nghiên cứu di truyền, đặc biệt là những nghiên cứu liên quan đến các con đường tham gia vào di căn và phản ứng với hóa trị. Các nhà nghiên cứu sử dụng COLO-320DM để khám phá các con đường tín hiệu, phản ứng tế bào với thiếu oxy và tương tác giữa tế bào ung thư và môi trường vi mô của khối u. Dòng tế bào này đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các chiến lược điều trị nhắm vào các cơ chế di căn đặc hiệu của ung thư đại trực tràng.

GENERAL INFORMATION

Description

Dòng tế bào COLO-320DM là dòng tế bào ung thư đại trực tràng ở người được thiết lập từ vị trí di căn của một phụ nữ da trắng 55 tuổi. Dòng tế bào này có những đặc điểm độc đáo quan trọng cho việc nghiên cứu quá trình di căn của ung thư đại trực tràng và tác động của các thuốc hóa trị. Đáng chú ý là dòng tế bào này có biểu hiện cao của kháng nguyên ung thư phôi (CEA), một chỉ số sinh học quan trọng được sử dụng trong theo dõi và chẩn đoán ung thư đại trực tràng.

Tế bào COLO-320DM có tính bám dính với hình thái biểu mô. Chúng thường được sử dụng trong nghiên cứu tập trung vào các cơ chế tế bào và phân tử liên quan đến sự tiến triển và di căn của ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, do có mô hình tăng trưởng ổn định và tính ổn định di truyền qua các thế hệ nuôi cấy, chúng là mô hình đáng tin cậy cho các thí nghiệm in vitro nghiên cứu sinh học tế bào ung thư, phản ứng với thuốc và biểu hiện gen liên quan đến ung thư đại trực tràng.

Các tế bào này cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt trong các nghiên cứu di truyền, đặc biệt là những nghiên cứu liên quan đến các con đường tham gia vào di căn và phản ứng với hóa trị. Các nhà nghiên cứu sử dụng COLO-320DM để khám phá các con đường tín hiệu, phản ứng tế bào với thiếu oxy và tương tác giữa tế bào ung thư và môi trường vi mô của khối u. Dòng tế bào này đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các chiến lược điều trị nhắm vào các cơ chế di căn đặc hiệu của ung thư đại trực tràng.

Tissue	Ruột già, loại C của Dukes
Disease	Ung thư tuyến đại tràng

Synonyms

- COLO_320DM
- COLO-320-DM
- COLO #320DM
- COLO320/DM
- COLO320-DM
- COLO320DM
- Colo320DM
- COLO320 DM
- COLO 320 DM
- COLO 320 (DM)
- Colorado 320 Double Minutes

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	Tròn và có khả năng khúc xạ
Tumourigenic	Đúng vậy, ở chuột nude

IDENTIFIERS

Citation

COLO-320DM (Số catalog Cytion 300153)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_0219

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Isoenzymes

PGM1,1, PGM3, 2, G6PD, B, PEP-D, 1, 6PGD, A, ES-D, 1

Products

Serotonin, norepinephrine, epinephrine, hormone kích thích vỏ thượng thận (ACTH), hormone tuyến cận giáp

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

Ham's F12, chứa: 1,0 mM glutamine ổn định, chứa: 1,0 mM natri pyruvate, chứa: 1,1 g/L $NaHCO_3$ (Số hiệu sản phẩm Cytion 820600a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO_2, môi trường ẩm.

Supplements

Bổ sung 10% huyết thanh bò phôi (FBS) vào môi trường nuôi cấy

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Loại bỏ môi trường nuôi cấy cũ khỏi các tế bào bám dính và rửa chúng bằng PBS không chứa canxi và magiê. Đối với bình T25, sử dụng 3-5 ml PBS, và đối với bình T75, sử dụng 5-10 ml. Sau đó, phủ hoàn toàn các tế bào bằng Accutase, sử dụng 1-2 ml cho bình T25 và 2,5 ml cho bình T75. Để tế bào ủ ở nhiệt độ phòng trong 8-10 phút để tách chúng ra. Sau khi ủ, nhẹ nhàng trộn tế bào với 10 ml môi trường để tái phân tán chúng, sau đó ly tâm ở 300xg trong 3 phút. Loại bỏ dịch trên, tái phân tán tế bào trong môi trường tươi và chuyển chúng vào các bình mới đã chứa môi trường tươi.

Seeding density	1×10^4 tế bào/cm^2
Fluid renewal	Mỗi 3 đến 5 ngày
Post-thaw recovery	Sau khi rã đông, cấy tế bào với mật độ 5 x 10^4 tế bào/cm^2 và để tế bào phục hồi sau quá trình đông lạnh và bám dính ít nhất 24 giờ.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

Sự nhiễm khuẩn Mycoplasma được loại trừ bằng cả các phương pháp xét nghiệm dựa trên PCR và các phương pháp phát hiện Mycoplasma dựa trên phát quang.
Để đảm bảo không có nhiễm khuẩn vi khuẩn, nấm hoặc men, các mẫu nuôi cấy tế bào được kiểm tra trực quan hàng ngày.

Freeze medium	Như một môi trường bảo quản đông lạnh, chúng tôi sử dụng môi trường tăng trưởng hoàn chỉnh (bao gồm FBS) + 10% DMSO để đảm bảo độ sống sau khi rã đông, hoặc CM-1 (mã sản phẩm Cytion 800100), bao gồm các chất bảo vệ thẩm thấu và chất ổn định chuyển hóa được tối ưu hóa để cải thiện quá trình phục hồi và giảm stress do đông lạnh gây ra.

Storage conditions

Để bảo quản lâu dài, hãy đặt ống nghiệm vào nitơ lỏng ở pha hơi ở nhiệt độ khoảng −150 đến −196 °C. Việc bảo quản ở −80 °C chỉ được chấp nhận như một bước trung gian ngắn hạn trước khi chuyển sang nitơ lỏng.

Shipping conditions

Các dòng tế bào được bảo quản bằng phương pháp đông lạnh được vận chuyển trên đá khô trong bao bì cách nhiệt đã được kiểm định, kèm theo lượng chất làm lạnh đủ để duy trì nhiệt độ khoảng −78 °C trong suốt quá trình vận chuyển. Khi nhận hàng, hãy kiểm tra ngay lập tức bao bì và chuyển các ống nghiệm sang nơi lưu trữ phù hợp mà không chậm trễ.

DONOR

Donor age	55 năm
Ethnicity	Người da trắng

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Khi lập kế hoạch lưu trữ ống cryovial trong nitơ lỏng để rã đông sau này, việc tuân thủ các biện pháp an toàn nghiêm ngặt là bắt buộc. Găng tay và quần áo bảo hộ phù hợp là điều cần thiết, và việc sử dụng khẩu trang hoặc kính bảo hộ là bắt buộc trong quá trình chuyển mẫu đông lạnh vào hoặc ra khỏi bể nitơ lỏng. Điều này nhằm giảm thiểu nguy cơ chấn thương do nổ ống cryovial khi lấy ra, có thể dẫn đến việc văng ra các mảnh vỡ sắc nhọn.

Warranty

Tại Cytion, chúng tôi cam kết về chất lượng và khả năng sống của các sản phẩm của mình.
Chúng tôi đảm bảo rằng các tế bào của chúng tôi sẽ có khả năng sống tại thời điểm bắt đầu nuôi cấy trong
60 ngày kể từ khi vận chuyển từ cơ sở của chúng tôi.
Chúng tôi cam kết rằng tất cả các vật liệu tuân thủ các thông số kỹ thuật được mô tả trong
Giấy chứng nhận phân tích và/hoặc Tài liệu sản phẩm.
Để biết chi tiết đầy đủ, vui lòng tham khảo
<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Tuyên bố Bảo hành.

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB